

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

194242

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 831 Société : Agence Rabat Sidi

Tél. 0666440493 Total des frais engagés : 329,60 DH Dhs

## Cadre réservé au Médecin



Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/01/24	C		150,00	

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/01/24	222,60

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient
		</	

# EFFIPRED®

(Prednisolone)

## PRESENTATIONS

Boîte de 30 comprimés effervescents à 5 mg  
Boîte de 20 comprimés effervescents à 20 mg

## COMPOSITION

- Comprimés effervescents à 5 mg	
Prednisolone (sous forme de métasulfobenzoate de sodium).....	5 mg
Excipient qsp.....	1 comprimé effervescent
- Comprimés effervescents à 20 mg	
Prednisolone (sous forme de métasulfobenzoate de sodium).....	20 mg
Excipient qsp.....	1 comprimé effervescent

## PROPRIETES

EFFIPRED® est un glucocorticoïde à usage systémique, utilisé principalement pour ses propriétés antiinflammatoire, antiallergique et immunodépressive.

## INDICATIONS

Affections rhumatologiques, respiratoires, ORL, ophtalmologiques, neurologiques, néphrologiques, néoplasiques, infectieuses, hématologiques, endocrinianes, digestives, dermatologiques, et dans les connectivites et collagénoses.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

- Se conformer strictement à la prescription du médecin.
- Prendre les comprimés dissous dans un verre d'eau au cours des repas, de préférence en une prise le matin.

## CONTRE-INDICATIONS

- Tout état infectieux non traité par antibiotiques ou antimycosiques.
- Certaines viroses en évolution (herpès, varicelle, zona, hépatite)
- États psychotiques encore non contrôlés par un traitement.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISE EN GARDE

### *En cas de traitement prolongé :*

- Observer un régime pauvre en sucres et enrichi en protéines et en calcium
- Réduire l'apport en sodium en tenant compte de la teneur en sodium du comprimé (43 mg de sodium par comprimé à 20 mg et 28,6 mg de sodium par comprimé à 5 mg).
- Ne jamais arrêter brutalement le traitement mais diminuer progressivement les doses en suivant la prescription de votre médecin.

# EFFIPRED® 20 mg

PPU 400H00  
EXP 04/2026  
LOT 32011 3

de toute autre maladie (hypertension artérielle, tif récent ou ancien, insuffisance rénale) ou en cas

ons médicamenteuses, signaler systématiquement le médecin et à votre pharmacien, en particulier:

l'aspirine, les anticoagulants, les antidiabétiques, hypokaliémiants, certains anti-épileptiques.

## Sport

Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopage.

## EFFECTS INDESIRABLES

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants ; ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Benzoate de sodium.

La teneur en sodium est de 43 mg de sodium par comprimé à 20 mg et 28,6 mg de sodium par comprimé à 5 mg.

## CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité,

---

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

---

## NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

---

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

F56240P071200

Quant à une éventuelle impression de fatigue, elle n'est pas due au traitement antibiotique, mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression, mais retarderait votre guérison.

Toute réaction anormale ou toute manifestation inhabituelle survenant au cours du traitement doivent être signalées au **médecin**.

3°) Si votre **médecin** ou votre **pharmacien** vous ont recommandé de prendre ce médicament à des moments précis, c'est pour en assurer la meilleure efficacité. Respectez donc les modalités des prises (par exemple, avant les repas).

4°) Enfin, vous ne devez pas associer cet antibiotique à un autre médicament sans avis de votre **médecin traitant**, car certaines associations doivent être évitées.

Votre **médecin**, votre **pharmacien** connaissent les médicaments qui vous sont prescrits. N'hésitez jamais à leur demander des précisions.

### **Précautions d'emploi**

Une surveillance hématologique doit être effectuée au cours du traitement.

### **Mode d'emploi et posologie**

Se conformer à la prescription médicale :

- Adultes : 1,5 g à 3 g / jour en 2 à 3 prises.
- Enfants : 30 mg à 100 mg / kg de poids corporel / jour, en 2 à 3 prises.

#### **De plus pour la forme comprimé :**

- **Blennorragies gonococciques aiguës, récentes, non compliquées, de l'homme** : possibilité d'une seule prise orale de 2,50 g soit 10 comprimés (traitement «minute»).

#### **- Autres cas de gonococcies :**

2,50 g (10 comprimés), le premier jour en une seule prise, puis 2 g par jour (8 comprimés) pendant les quatre jours suivants.

- Granulé pour suspension buvable : préparation de la suspension : introduire de l'eau bouillie refroidie ou minérale jusqu'au trait sur le flacon, fermer le flacon et secouer jusqu'à aspect homogène : la suspension est ainsi prête à l'emploi.

Agiter avant chaque emploi. A consommer jusqu'à la fin du flacon sans interruption.

La suspension une fois préparée, ne se conserve pas au-delà de 8 jours.

### **Condition de délivrance**

Ce médicament est inscrit en liste I (tableau A). Votre **pharmacien** ne pourra vous en renouveler la délivrance que si le **médecin** l'a expressément indiqué sur l'ordonnance, ou sur présentation d'une nouvelle ordonnance.

### **Respecter la date limite d'utilisation figurant sur l'emballage.**

**sanofi-aventis Maroc**

Route de Rabat - R.P.1 - Aïn Sebaâ  
20250 Casablanca

**43,80**

Prix à l'unité

ton de poudre lyophilisée à

- Comprimés enrobés dosés à 250 mg de thiampénicol : boîtes de 1 et 8.
- Comprimés dosés à 500 mg de thiampénicol : boîte de 24.
- Granulé pour suspension buvable dosée à 125 mg / 5 ml : flacon de 60 ml.
- Granulé pour suspension buvable dosée à 250 mg / 5 ml : flacon de 60 ml.

### **Propriétés**

Le THIOBACTIN est un antibiotique du groupe des phénicolés, sous-groupe du thiampénicol.

### **Indications**

Celles des phénicolés, sous-groupe du thiampénicol.

Elles seront limitées à :

- Certaines infections aiguës des voies respiratoires à germes résistants aux autres antibiotiques,
- Certaines infections digestives telles que typhoïde et autres salmonelloses,
- Certaines infections hépatobiliaires telles que cholécystite aiguë,
- Urétrites gonococciques,
- Urétrites non gonococciques à germes résistants aux autres antibiotiques,
- Méningites à haemophilus,
- Infections à germes anaérobies résistants aux autres antibiotiques.

### **Contre-indications**

Sujets présentant des antécédents d'insuffisance médullaire,

Nourrissons de moins de six mois,

Insuffisant rénal grave,

Allergie aux phénicolés.

### **Mises en garde**

Prévenir le médecin traitant en cas de :

- antécédents d'insuffisance médullaire,
- insuffisance rénale.

### **Recommandations**

Ce médicament appartient à la famille des antibiotiques. Il a pour rôle de combattre l'infection dont vous êtes atteint en détruisant les microbes qui en sont la cause.

1°) Votre médecin a choisi cet antibiotique et non un autre parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Vous ne devez donc pas l'utiliser à l'avenir sans l'avis de votre médecin pour combattre une maladie même semblable en apparence, - ni pour vous-même, ni pour quelqu'un d'autre.

2°) Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé. En effet, la disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que l'infection a disparu et que vous êtes complètement guéri. Si vous arrêtez le traitement avant son terme, une rechute pourrait se produire et votre guérison pourrait être retardée et devenir difficile; mais augmenter les doses prescrites ne l'accélérerait pas pour autant.

du sang). La prise concomitante de ce médicament (halothymol®) et d'organes). En cas de prise concomitante de ce médicament et de ce produit surveillez :

• la prise concomitante de ce médicament et de ce médicament.

• affecter le rythme cardiaque (voir la rubrique «

medicament après avoir mangé.

Si vous planifiez une grossesse, demandez conseil à

un professionnel de santé lorsqu'il est près pendant la grossesse, voire vous êtes enceinte.

Allez, votre médecin ne vous prescrira ce

ment sur l'aptitude à conduire de véhicules ou à

diagnostiquera une intolérance à certains sucres,

charge (5 ml de suspension contiennent 3,87 g de sucre).

Informations de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez

si les infections (sinusite, amygdale, pharyngite, que les infections odontostomatologiques : plus 3 jours consécutifs.

et par des souches sensibles de Chlamydia

déterminée en fonction du poids corporel. Les

utifs ou 30 mg/kg en une seule dose (voir aussi

administration et pendant 3 jours consécutifs mais

de 1 500 mg.

la légère ou modérée, le médecin pourra vous

livrer une dose unique quotidienne. Les

notamment avant de prendre le comprimé peut

à 9 ml)

al (correspondant à 200 mg pour une dose de 5

guge graduée (capacité de 5 ml) :

La seringue

ne être prise qu'en une seule administration. Pour

prendre la dose prescrite.

Les effets indésirables possibles seront les mêmes

que l'administration du médicament, ou à votre

avis indésirables, mais ils ne surviennent pas

suivants apparaissent chez vous ou votre enfant:

• réaction allergique sévère (shock anaphylactique)

• gonflement du visage, de la langue et de la gorge entraînant une incapacité à avaler et à respirer (angoisse d'œdème), sensibilité

accrue de la peau et des muqueuses

• inflammation grave de la dernière partie de l'intestin appelée le côlon, causée par la prolifération de bactéries appelées Clostridium difficile (colite pseudomembranosa)

• réactions graves de la peau associées à l'absorption de certains médicaments.

• réaction cutanée grave associée à un ou plusieurs organes, accompagnée par l'apparition de fièvre (DRESS) (fréquence très rare)

• éruption cutanée rouge et squameuse avec formation de pustules et de vésicules (urticaria exanthématique) (fréquence très rare)

• réactions d'hypersensibilité graves et aiguës au niveau de la peau et des muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson, névrose épidermique toxique, érythème polymorphe) (fréquence indéterminée)

• problèmes hépatiques graves (insuffisance hépatique), car ils sont susceptibles d'entrainer la mort

• mort subite et massive des cellules du foie (foite hépatique mortelle)

• mort subite et massive des cellules de l'intestin (mort de ses cellules)

• anémie due au dérangement des globules rouges

• perte de conscience soudaine (syncope)

• inflammation du pancréas (pancréatite)

Veuillez contacter votre médecin si l'un des effets indésirables ci-après apparaît chez vous ou votre enfant :

**Effets indésirables très fréquents** (peuvent affecter plus d'un patient sur 10) :

• diarrhée

**Effets indésirables fréquents** (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• maux de tête

• vomissements

• douleurs abdominales

• nausée

• diminution de la quantité de bicarbonate dans le sang

• diminution du nombre d'un type de globules blancs du sang appelés lymphocytes

• augmentation du nombre d'un type de globules blancs du sang appelés eosinophiles

• augmentation du nombre d'un type de globules blancs du sang appelés monocytes

• augmentation du nombre d'un type de globules blancs du sang appelés neutrophiles

**Effets indésirables peu fréquents** (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• infection vaginale attribuée à la Candida (un champignon)

• infection vaginale attribuée à des micro-organismes appelés « champignons »

• infection attribuée à des micro-organismes appelés « bactéries »

• troubles respiratoires

• pneumonie

• asthénie

• gêne respiratoire

• rhinite

• diminution du nombre de globules blancs du sang (leucopénie)

• diminution du nombre d'un type de globules blancs du sang appelés neutrophiles (neutropénie)

• diminution du nombre d'un type de globules blancs du sang appelés eosinophiles (eosinophilie)

• nervosité

• insomnie

• étourdissements

• altérations de la sensibilité dans les différentes parties du corps

• distension ou diminution de la capacité à sentir les odeurs

• troubles visuels

• troubles de l'oreille

• perception accrue du rythme cardiaque

• bouffées de chaleur

• difficultés respiratoires (dyspnée)

• saignement du nez (épistaxis)

• constipation

• production d'air dans l'intestin

• malais d'estomac

• gastrite

• difficultés ou déglutition douleuruse

• gonflement de l'abdomen

• bouche sèche

• éruptions

• aphtes

• augmentation de la production de salive

• éruptions cutanées

• dérangements

• urticaire

• dermatite

• rash cutané

• transpiration excessive

• arthrose

• douleurs musculaires

• douleurs au dos

• douleurs aux jambes

• douleurs en urinant

• douleurs aux reins

• perte de sang atypique, abondante et prolongée du vagin

• troubles des testicules

• érection

• faiblesses

• malaise

• fatigue

• gonflement du visage

• douleurs thoraciques

• fièvre

• douleurs

• gonflement des jambes et des pieds

• altération des tests de laboratoire afin d'évaluer le fonctionnement du foie

• augmentation de la quantité de bilirubine dans le sang (substance produite par le foie)

• augmentation de la quantité d'urée dans le sang (substance produite par le foie)

• augmentation de la quantité de créatinine dans le sang (substance produite par les muscles)

• variations de la quantité de potassium et de sodium dans le sang (sels minéraux)

• augmentation de la quantité de phosphore sérique dans le sang (substance produite dans divers tissus de l'organisme)

• augmentation de la quantité de cholestérol dans le sang (sel minéral)

• augmentation de la quantité de glucose (sucre) dans le sang

• augmentation du nombre de plaquettes dans le sang

• augmentation de la quantité de fibrine dans le sang

• augmentation de la quantité de bicarbonate dans le sang

• complications à l'issue d'interventions médicales ou chirurgicales

**Effets indésirables de fréquence rare (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :**

• agitation

• altération de la fonction du foie

• coloration jaunâtre de la peau des muqueuses (jaunisse)

• sensibilité accrue de la peau aux rayons de soleil (photosensibilité)

**Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :**

• diminution du nombre de plaquettes sanguines

• convulsions

• diminution de la sensibilité d'une zone corporelle à un stimulus

• agressivité

• anxiété

• délire

• hallucinations

• activité motrice excessive et agitation (agitation psychomotrice)

• perte totale ou partielle de la capacité à sentir les odeurs

• perte totale de la capacité à se sentir les saveurs

• faiblesse musculaire grave (myasthenia gravis)

• troubles auditifs

• surdité

• bourdonnements dans les oreilles

• augmentation de la fréquence cardiaque causée par une anomalie particulière du rythme cardiaque (arythmie) appelée « tachycardie

• trouble de la tension artérielle (hypertension)

• altération de la couleur de la langue

• douleur

• problèmes rénaux graves (insuffisance rénale aigüe, néphrite interstitielle)

**Déclaration des effets indésirables**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

Ceci n'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Il est alors recommandé à tous les utilisateurs de contribuer à favoriser davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. Comment conserver Zithromax**

Tenez ce médicament hors de la portée et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte, la flacon ou la plaquette apposée sur l'emballage ou la référence au dossier de ce médicament.

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

La solution reconstituée de Zithromax 200 mg peut être conservée jusqu'à 7 jours à température ambiante.

Ne jetez aucun médicament au tout-débit-jetoune ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments non utilisés plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**6. Contenu de l'emballage et autres informations**

Ce que contient Zithromax:

Zithromax 500 mg comprimés pelliculés

La substance active est l'azithromycine. Elle est présente sous forme de dihydrate d'azithromycine.

Chaque comprimé pelliculé contient 500 mg qui équivaut à 554,11 mg de dihydrate d'azithromycine.

Les autres composants sont : Amidon prégalatinisé, phosphate de calcium dihydrate anhydre, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, laurylulfat de sodium, eau déminéralisée.

Film de pelliclage : Zithromax 500 mg comprimés pelliculés contenant du lactose.

Zithromax 200 mg 50 mg pour suspension buvable.

Les autres composants sont : Triphosphate de sodium anhydre, hydroxypropylcellulose, gomme de xanthane, arôme artificiel de cerise, crème à la vanille, arôme de banane, sucre, saccharose (voir paragraphe « Zithromax 200 mg 5 ml pour suspension buvable contenu du saccharose »).

Aspects de l'emballage et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés de Zithromax sont disponibles dans des plaquettes thermoformées PVC/alu/alu

comportées de 500 mg.

La poudre pour suspension buvable de Zithromax est disponible dans un flacon en polyéthylène contenant une éprouvette

plastique, et une seringue graduée. Une fois reconstruit, la suspension buvable contient 200 mg/5 ml.

Thierry L'Oréal SAS, Paris

km 650, Route de Oualidia

BP 35, 24 000

El Jadida, Maroc

La dernière date à laquelle la notice a été révisée est en 10/2018.

#### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit. Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ainsi que ses bénéfices et ses risques.
- Ne pas arrêter de votre propre initiative un traitement prescrit.
- Ne pas reprendre le traitement sans avis médical.

**Ne jamais laisser jamais les médicaments à la portée des enfants**

اللبنانية

ويمورون بالقانون مع زيفرونيك، تجنب مرافقه

لـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ



## سيتاميل® 500 ملغ

باراسيتاول

الأشكل الفموية

أقراص فواره

أقراص تقوية

لأخذ هذه الدواء

أقراص فواره العلبة تحتوي على 20 قرصا.  
مسحوق فوري في لفافة العلبة تحتوي على 12 لفافة.



على ما تحتوي هذه النشرة

1. ما هو سيتاميل® 500 ملغ وما هي الحالات التي يستعمل فيها؟

2. ما هي المعلومات التي يجب عليك معرفتها قبل إستعمال سيتاميل® 500 ملغ؟

3. كم يجريع سيتاميل® 500 ملغ؟

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها؟

5. طريقة العطش؟

6. معلومات إضافية

ماهو سيتاميل® 500 ملغ، وعاهي الحالات التي يستعمل فيها؟

تأتي سيتاميل® 500 ملغ من باراسيتاول أو مسكن للألم والحرقان (مضخم للحرقان).

يستخدم سيتاميل® 500 ملغ في علاج المرض العصبي المزمن كما يمكن استخدامه عند المصابين بالقرحة المعدية.

جرع عرضي للألم الشيفيحة الحادة،即 إلى حددة معندة / أو حالت المنسى.

كم يجريع سيتاميل® 500 ملغ؟

تحسّن ساج الكبد المليء أو أمراض الكبد الجيسمية.

الطفيل الذي ورثه من الآباء أو العيادات عند المرضى.

سيتاميل® 500 ملغ أفراد لا يصح بهم لتناوله الذي سنه أقل من 6 سنوات بسبب مخاطر امالة الخطأ.

في حالة بيلة الفيروس كيتون، يرجى رؤي الكشف عند الولادة، سبب وجود الآباء.

لا جثائب حدوث المرض العصبي المزمن - راقوا عدم وجود باراسيتاول في تركيبة دوائية أخرى - إحترام الجرعة الموصى بها:

الجرعة الموصى بها:

الطفل الذي وزنه أقل من 40 كلغ: الجرعة الكلية من باراسيتاول يجب أن لا تتجاوز 80 ملغم/كلغ في اليوم;

البالغ والطفل الذي وزنه أكثر من 50 كلغ: الجرعة الكلية من باراسيتاول يجب أن لا تزيد عن 3 غرامات في اليوم;

عند الأطفال المتعافي من: 60 ملغم/كلغ في اليوم من باراسيتاول، الإشراك مع أحد مضادات الحمى غير مبرر إلا في حالة

التجاعيد.

في حالة اكتئاب ضيق الكبد الوبائي الحاد يحد إيقاف العلاج.

سوء امتصاص الكلاكتوز أو اللافلاكتوز، يتحملي الساكروز لا يصح بحسب انتظامه عند المرض المكتسب عدم إدخال الغريكون.

الضرس والضرس والفقمة: وضع في العصبان درجة الموربود من باراسيتاول أو إيزومالاز (مرض ولائي نادر).

ضرس 500 ملغ يحتوي على الكلاكتوز (مرض ولائي نادر).

امتصاص الكلاكتوز أو اللافلاكتوز (مرض ولائي نادر).

يتحملي سيتاميل® 500 ملغم فواره على الماء، يتحملي أفراد الأخصاص نقاط غازل صارم مشخص في الجهاز الهضمي (الإسهال)، كما يحتوي على

الموربود، يتحملي بعين الاعتبار الأخصاص نقاط غازل صارم مشخص في الماء.

في حالة القصور الكيدي الكلوي الطيفي، الإدمان على الكحول أو الإجفاف عند البالغ الذي يقل وزنه عن 50 كلغ، الجرعة

عند الإيذان استثنى وباراسيتاول أو المصيلاني.

سيتاميل® 500 ملغ هو دواء، لا يترك في متناول الأطفال.

الاطفال والراهقين: لا يوجد

التفاعل المعاول:

مخترفات كاباسيكا - من أولاً صالح - الدار

ENICA - Z.I. Ouled Salih - Casablanca - Maroc

الصرف: حر.

ما يحتمله أحد احتياطات عند الاستعمال:  
ما عن المخدرات الدموية المفعولة: إحتمال تزييد التاثير المانع للتغير الدموي الفموي والباراسيتاول بجرعات عالية (4) غرامات في اليوم) خلال 4 أيام على الأقل، مرافق متواترة R  
الإمداد للتغير الدموي خلال العلاج بالباراسيتاول بعد إيقافه.

إشارات شبه السريرية:  
تناول الباراسيتاول يمكنه تحريف معيار تحلون الدم بطريقة خمية الناسكس و الناسكس الأدمن

المترافق غير العادي،  
تناول الباراسيتاول يمكنه تحريف معيار حاضن الأوروك الدموي بطريقة حاضن الفسفور ت

الموجود الفلفلي والمشروميات، لا يوجد

التفاعل مع المنتجات العصبية أو العلاجات البديلة: لا يوجد

بالمراعات العلاجية الموجه بها، يرجى تجربة سيتاميل® 500 ملغ ممك خالد الرضاعة.

سيتاميل® 500 ملغ من الحالات العادلة لاستعمال يمكن تجربة خالد الرضاعة.

عن طريق سيتاميل® 500 ملغ؟

الافتراض: تبلغ كم هي مع شراب (مثلما، حليب، عصير فواكه).

التفاف: أسكبوا محتوى الفلفي في كأس ثم تضاف كمية قليلة من شراب غير غازي (ماء)

بعد المراج.

الاقرائص الفوارة: أتركوا الفرقون للذوبان بشكل تام في كأس من الماء، ويسرب فورا بعد ذلك

الأطفال 27 إلى 40 كلغ	الأطفال 41 إلى 50 كلغ
قرص واحد أو لفافة 500 ملغم	قرص واحد أو لفافة 500 ملغم
6 مرات في اليوم	6 مرات في اليوم

المدة المواصلة بين	النحوين متباين
6 ساعات	4 ساعات

شيطين الكسر هو فقط لتسهيل أخذ الفرق إذا واجهتهم صعوبة في بلعه كاملا.	تطلبهم في حالة إغفال جرعة غير جرعات:
إذا ثناهم تناول سيتاميل® 500 ملغم لا تأخذوا جرعات مخافضة لتعويض الجرعة اليس.	الغرافض والعلقانات في حالة الجرعة المفترطة.
إذا ثناهم تناول سيتاميل® 500 ملغم أكثر مما كان عليكم أخذة، في حالة الجرعة المفترطة أو	إذا ثناهم تناول سيتاميل® 500 ملغم أكثر مما كان عليكم أخذة، في حالة الجرعة المفترطة أو
نذر أذواق العلات حساسية.	نذر أذواق العلات حساسية.

استثنائياً قلة الصفرات.	وفي حالة ثناهم أخرى غير مذكورة في هذه النشرة، يجب توقيف العلاج واستئصاله
الخطوة الفنية?	الخطوة الفنية؟

سيتاميل® 500 ملغ أفراد	سيتاميل® 500 ملغ أفراد
سيتاميل® 500 ملغ	سيتاميل® 500 ملغ

باراسيتاول:	باراسيتاول:
سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم

سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم
سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم

سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم
سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم

سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم
سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم

سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم
سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم

سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم
سوالات: ..... ملغم	سوالات: ..... ملغم

Quant à une éventuelle impression de fatigue, elle n'est pas due au traitement antibiotique, mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression, mais retarderait votre guérison.

Toute réaction anormale ou toute manifestation inhabituelle survenant au cours du traitement doivent être signalées au médecin.

3°) Si votre médecin ou votre pharmacien vous ont recommandé de prendre ce médicament à des moments précis, c'est pour en assurer la meilleure efficacité. Respectez donc les modalités des prises (par exemple, avant les repas).

4°) Enfin, vous ne devez pas associer cet antibiotique à un autre médicament sans avis de votre médecin traitant, car certaines associations doivent être évitées.

Votre médecin, votre pharmacien connaissent les médicaments qui vous sont prescrits. N'hésitez jamais à leur demander des précisions.

### **Précautions d'emploi**

Une surveillance hématologique doit être effectuée au cours du traitement.

### **Mode d'emploi et posologie**

Se conformer à la prescription médicale :

• Adultes : 1,5 g à 3 g / jour en 2 à 3 prises.

• Enfants : 30 mg à 100 mg / kg de poids corporel / jour, en 2 à 3 prises.

#### **De plus pour la forme comprimé :**

- Blennorragies gonococciques aiguës, récentes, non compliquées, de l'homme : possibilité d'une seule prise orale de 2,50 g soit 10 comprimés (traitement «minute»).

#### **- Autres cas de gonococcies :**

2,50 g (10 comprimés), le premier jour en une seule prise, puis 2 g par jour (8 comprimés) pendant les quatre jours suivants.

• Granulé pour suspension buvable : préparation de la suspension : introduire de l'eau bouillie refroidie ou minérale jusqu'au trait sur le flacon, fermer le flacon et secouer jusqu'à aspect homogène : la suspension est ainsi prête à l'emploi.

Agiter avant chaque emploi. A consommer jusqu'à la fin du flacon sans interruption.

La suspension une fois préparée, ne se conserve pas au-delà de 8 jours.

### **Condition de délivrance**

Ce médicament est inscrit en liste I (tableau A). Votre pharmacien ne pourra vous en renouveler la délivrance que si le médecin l'a expressément indiqué sur l'ordonnance, ou sur présentation d'une nouvelle ordonnance.

**Respecter la date limite d'utilisation figurant sur l'emballage.**

# THIOBAC

## Thiamphénicol

### Formes et présentations

- Préparation pour usage par voie buccale : 750 mg de thiamphénicol, ampoule
- Comprimés enrobés dosés à 250 mg
- Comprimés dosés à 500 mg de thiamphénicol
- Granulé pour suspension buvable
- Granulé pour suspension buvable

43180  
THIOBACTIN  
thiamphénicol

### Propriétés

Le THIOBACTIN est un antibiotique du groupe des phénicolés, sous-groupe du thiamphénicol.

### Indications

Celles des phénicolés, sous-groupe du thiamphénicol.

Elles seront limitées à :

- Certaines infections aiguës des voies respiratoires à germes résistants aux autres antibiotiques,
- Certaines infections digestives telles que typhoïde et autres salmonelloses,
- Certaines infections hépatobiliaires telles que cholécystite aiguë,
- Urétrites gonococciques,
- Urétrites non gonococciques à germes résistants aux autres antibiotiques,
- Méningites à haemophilus,
- Infections à germes anaérobies résistants aux autres antibiotiques.

### Contre-indications

Sujets présentant des antécédents d'insuffisance médullaire,

Nourrissons de moins de six mois,

Insuffisant rénal grave,

Allergie aux phénicolés.

### Mises en garde

Prévenir le médecin traitant en cas de :

- antécédents d'insuffisance médullaire,
- insuffisance rénale.

### Recommandations

Ce médicament appartient à la famille des antibiotiques. Il a pour rôle de combattre l'infection dont vous êtes atteint en détruisant les microbes qui en sont la cause.

1<sup>o</sup>) Votre médecin a choisi cet antibiotique et non un autre parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Vous ne devez donc pas l'utiliser à l'avenir sans l'avis de votre médecin pour combattre une maladie même semblable en apparence, - ni pour vous-même, ni pour quelqu'un d'autre.

2<sup>o</sup>) Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé. En effet, la disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que l'infection a disparu et que vous êtes complètement guéri. Si vous arrêtez le traitement avant son terme, une rechute pourrait se produire et votre guérison pourrait être retardée et devenir difficile; mais augmenter les doses prescrites ne l'accélérerait pas pour autant.

Docteur M. QERMANE

Diplômé de la Faculté de Médecine  
et de la pharmacie de Marseille

Médecine Général - Homéopathie  
Expert Assementé



الدكتور محمد قرمان

خريج كلية الطب والصيدلة بمرسيليا

الطـب العام والطـب التـماـثـي  
خـبر مـحـلـف

Salé le : ..... 23/01/24 ..... سلا في :

Depos au lit.

Vie calme

79.20

2 Zithromax 180 mg

de 1j à 3jours

2x43.80

2 Srip Thibaut 250

2 ci uji 3ml j 2/2

40.00

3 Cortam cyl 20 mg (m) offprod  
Acj le mat an petit dejours

15.30

1 Cetamylep. 500

Acj

10-11-22

T= 222.60



Dr. QERMANE  
Médecin généraliste  
Homéopathie  
12 Lotis Faby, Av. Lalla Asmae, Salé Tabriquet, Tél: 05 37 86 17 17  
MOUAD  
N° 9  
Co 09 68  
lar Hay Av El Salé Tabriquet

12 تجزئة فابي شارع للأسماء - سلا تايريك الهاتف : 05 37 86 17 17

12 Lotis Faby, Av. Lalla Asmae - Salé Tabriquet - Tél : 05 37 86 17 17