

# CONDITIONS IMPORTANTES A LIRE POUR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## générales :

- L'adresse réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

195297

## Maladie

## Dentaire

## Optique

## Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7699

Société : R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

SAMALI. MOSTAFA

Date de naissance :

12-12-55

Adresse :

N° 1000 9 d'route

Tél. 06 74 88 84 84

Total des frais engagés : 1740.70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 07/02/2021

Nom et prénom du malade : SAMALI MOSTAFA Age : .....

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection respiratoire

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 05/02/2021 Le : .....

Signature de l'adhérent(e) : R. A. M

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07.02.24	C2	2500DH		<i>Dr. AMRANI HENRY SADA Pneumo-Phthisologue et Allergologue Résidence Firdaus, Casablanca RDC 2, Casablanca Tél : 05 22 89 02 02</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Dr. BENHABIB KARIM Pharmacien Ben Assalam 3200 Casablanca Ouifat Casablanca Tél : 05 22 93 22 31</i>	07.02.24	299,70

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
<i>Dr. AMRANI HENRY SADA Pneumo-Phthisologue et Allergologue Résidence Firdaus, Casablanca RDC 2, Casablanca Tél : 05 22 89 02 02</i>	07.02.24	RADIO THORAX	2000DH

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CŒFFICIENT DES TRAVAUX		
DEBUT D'EXECUTION				MONTANTS DES SOINS		
FIN D'EXECUTION						
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE				CŒFFICIENT DES TRAVAUX	
	H	25533412	21433552			
		00000000	00000000			
	D	00000000	00000000			
		35533411	11433553			
	B					
[Création, remont, adjonction]	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession					DATE DU DEVIS
	H	25533412	21433552			
		00000000	00000000			
	D	00000000	00000000			
		35533411	11433553			
	B					
DATE DE L'EXECUTION					VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتورة عمراني حنشي سعيدة

Docteur AMRANI HENCHI SAIDA



Pneumo - Phtisiologue  
Maladies Respiratoires et Allergiques  
Asthme, Rhinite, Tuberculose  
Billan Allergologique  
et explorations respiratoires

Adultes et Enfants

Ex Médecin au CHU Ibn Rochd  
Et Hôpital Moulay Youssef

اختصاصية  
في أمراض الجهاز التنفسى  
الضيق، داء السل  
تحليلات الحساسية و التنفس

كبار وأطفال

طبيبة سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد  
ومستشفى مولاي يوسف

Casablanca, le : 02-02-2021

Nom & Prénom : Dr. AMRANI HENCHI SAIDA

Dr. AMRANI HENCHI SAIDA  
Pneumo-physiologue et Allergologue  
Résidence Firdaous, GH25A  
RDC - CASABLANCA  
Télé: 05 22 89 02 02

**TELETHORAX**

## Interprétation :

- Pas d'anomalie Parenchymateuse
- Pas d'anomalie mediastinale si Squelettique
- Cul de sacs libres
- Silhouette cardiaque normale

synthèse homéostase  
normal to the eye **Honoraires : Z12**

Dr. AMRANI HENCHI SAIDA  
Pneumo-physiologue et Allergologue  
Résidence Firdaous, GH25A  
RDC - CASABLANCA  
Télé: 05 22 89 02 02

Docteur AMRANI HENCHI SAIDA

الدكتورة عمراني هنchi سعيدة

Pneumo - Phtisiologue

اختصاصية

Maladies Respiratoires et Allergiques

في أمراض الجهاز التنفسي

Asthme, Rhinite, Tuberculose

الصبيحة، داء السل

Adultes et Enfants


كبار وأطفال

Ex Médecin au CHU Ibn Rochd

طبيبة سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد

Et Hôpital Moulay Youssef

ومستشفى مولاي يوسف



Casablanca, le 07.02.2014 الدار البيضاء، في

## FACTURE

Nom & Prénom : SAHLALI MOSTAFA

Consultation : 250DH

Radio Thorax : 200DH

EF Resp :

Tests Cutanés :

Nébulisation :

Total : 450DH

Dr. AMRANI HENCHI SAIDA  
Pneumo-Phtisiologue et Allergologue  
Résidence FIRDAOUS, GH25A  
RDC CASABLANCA  
Tél : 05 22 89 02 02

شارع أم الربيع - إقامة الفردوس - مجموعة ه 25أ - الطابق السفلي - الدار البيضاء - الهاتف: 05 22 89 02 02

Boulevard Oum Rabii, Résidence FIRDAOUS, Groupe H25A, Rez de chaussée - Casablanca - Tel.: 05 22 89 02 02



الدار البيضاء، في ..... ٢٢٢٢٢٢٢٢ Casablanca, le

9. SAMLAJI Postopek  
248,00 serofide 250 Diskus  
① Foster  
S Sur avis medica:  
2800ff x 24,7 Mi  
51,70  
② Deut S

299703 Dr BEN HENCHI SAIDA  
Pharmacien et Allergologue  
32 Op. Hassan II Casablanca  
Tél. 0522 93 22 31  
BANI HENCHI SAIDA  
Pharmacien et Allergologue  
32 Op. Hassan II Casablanca  
Tél. 0522 93 22 31

Dr. AMRANI HENCHI SAIDA  
Pneumo-physiologue et Allergologue  
Résidence Firdaus - Casablanca - GH25A  
RDC - 05 22 89 02 02

Il n'y a pas d'interactions connues d'Aerius avec d'autres médicaments.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **Aerius avec des aliments, des boissons et de l'alcool**

Aerius peut être pris pendant ou en dehors des repas.

La plus grande prudence est recommandée si vous prenez de l'alcool en même temps que votre traitement par Aerius.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

La prise d'Aerius n'est pas recommandée si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

### **Fertilité**

Aucune donnée n'est disponible sur la fertilité chez l'humain.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

À la dose recommandée, il est peu probable que ce médicament affecte votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Bien que la plupart des personnes ne ressentent pas de somnolence, il est néanmoins recommandé de tester votre réponse à ce médicament avant d'accomplir des activités exigeant une vigilance, telles que conduire des véhicules ou utiliser des machines.

### **Aerius contient du lactose**

Les comprimés d'Aerius contiennent du lactose. Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

### **3. Comment prendre Aerius ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### **Adultes et adolescents de 12 ans et plus**

La dose recommandée est d'un comprimé une fois par jour avec de l'eau, au moment ou en dehors des repas.

Ce médicament est destiné à la voie orale.

Avez le comprimé en entier.

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera le type de rhinite allergique dont vous souffrez et déterminera la durée pendant laquelle vous devrez prendre Aerius.

Si votre rhinite allergique est intermittente (présence de symptômes sur une période de moins de 4 jours par semaine ou sur une période inférieure à 4 semaines), votre médecin vous recommandera ce traitement pour une durée qui dépendra de l'évaluation des antécédents de votre maladie.

Si votre rhinite allergique est persistante (présence de symptômes sur une période de 4 jours ou plus par semaine et pendant plus de 4 semaines), votre médecin peut vous recommander ce traitement pour une durée plus longue.

Concernant l'urticaire, la durée de traitement peut être variable d'un patient à l'autre et vous

disposerez d'au moins 1 mois supplémentaire. Concernant l'urticaire, la durée de la prise de ce produit, augmentation de la sensibilité de la peau au soleil, y compris en cas de soleil voilé, ainsi qu'au rayonnement ultraviolet (UV) par exemple aux lampes UV d'un solarium, modification du rythme des battements du cœur.

Anomalie du comportement, Agressivité, Prise de poids, augmentation de l'appétit.

### **Enfants**

Fréquence indéterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données

Disponibles : rythme lent des battements du cœur, modification du rythme des battements du cœur, Anomalie du comportement, Agressivité.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

### **5. Comment conserver Aerius**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette thermoformée après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C. À conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez un changement de l'aspect des comprimés.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

#### **Ce que contient Aerius**

- La substance active est la desloratadine 5 mg.

- Les autres composants du comprimé sont l'hydrogénophosphate de calcium dihydraté, la cellulose microcristalline, l'amidon de maïs, le talc. Le pelliculage du comprimé contient un film d'enrobage (contenant du lactose monohydraté, de l'hypromellose, du dioxyde de titane, du macrogol 400, de l'indigotine (E 132)), un enrobage clair (contenant de l'hypromellose, du macrogol 400), de la cire de carnauba, de la cire blanche.

#### **Qu'est-ce qu'Aerius et contient de l'emballage extérieur**

Aerius 5 mg comprimés pelliculés est conditionné en plaquettes thermoformées dans des étuis de 7, 15, 30 comprimés.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : Juin 2018

Filtre II.



**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine :**  
Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem Pays-Bas



**Fabriqué et distribué par :**  
LABORATOIRES PHARMACEUTICAL INSTITUTE  
BP 4491 – 12100 Ain El Aouda - MAROC  
**PHARMACIEN RESPONSABLE :** Maria SEDRATI


# Aerius® 5 mg comprimés pelliculés

Desloratadine



## Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez



## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius
3. Comment prendre Aerius
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aerius
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé ?

### Qu'est-ce que Aerius ?

Aerius contient de la desloratadine qui est un antihistaminique.

### Comment agit Aerius ?

Aerius est un médicament contre l'allergie qui ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

### Quand Aerius doit-il être utilisé ?

Aerius soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens) chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus. Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démarque, les démangeaisons du palais, les yeux qui démarquent, qui sont rouges ou larmoyants.

Aerius est aussi utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius ?

### Ne prenez jamais Aerius

- si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ou à la loratadine.

### Avertissemens et précautions

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre Aerius :

- si vous présentez une maladie des reins.
- si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de convulsions

### Utilisation chez les enfants et les adolescents

Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 12 ans.

### Autres médicaments et Aerius

Il n'existe pas d'interaction connue entre Aerius et d'autres médicaments.

s importantes pour vous.

nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre pharmacien.

Instructions de votre médecin.

**Si vous prenez Aerius que vous n'auriez pas dû :** Prenez Aerius uniquement comme il a été prescrit. Aucun problème sérieux n'est attendu lors d'un surdosage accidentel.

Cependant, si vous avez pris plus d'Aerius que vous n'auriez dû, prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

### Si vous oubliez de prendre Aerius

Si vous oubliez de prendre votre dose à temps, prenez-la dès que possible, puis continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### Si vous arrêtez de prendre Aerius

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

## 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Depuis la commercialisation d'Aerius, des cas de réactions allergiques sévères (difficulté à respirer, sifflements bronchiques, démangeaisons, urticaire et gonflements) ont été très rarement rapportés. Si vous ressentez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin.

Lors des essais cliniques chez les adultes, les effets indésirables étaient à peu près les mêmes que ceux observés avec un comprimé placebo. Cependant, la fatigue, la sécheresse de la bouche et le mal de tête ont été rapportés plus souvent qu'avec un comprimé placebo. Chez les adolescents, le mal de tête était l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté. Dans les essais cliniques avec Aerius, les effets indésirables suivants ont été rapportés :

Fréquent : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 : Fatigue, sécheresse de la bouche, mal de tête

### Adultes

Depuis la commercialisation d'Aerius, les effets indésirables suivants ont été rapportés : Très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000 : Réactions allergiques sévères, éruption cutanée, battements du cœur irréguliers ou plus intenses, battements du cœur rapides, douleur d'estomac, nausées, vomissements, pesanteur d'estomac, diarrhées, vertige, somnolence, insomnie, douleur musculaire, hallucinations, convulsions, agitation avec mouvements corporels

Augmentés, inflammation du foie, anomalies du bilan hépatique sanguin.

Fréquence indéterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données

## 1. Qu'est-ce que SERETIDE DISKUS et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Adrénergiques en association avec des corticoïdes ou d'autres médicaments, à l'exclusion des anticholinergiques, code ATC : R03AK06.

Seretide est un médicament contenant deux principes actifs, le salmétérol et le propionate de fluticasone :

- Le salmétérol est un bêta-2 mimétique bronchodilatateur de longue durée d'action. Les bronchodilatateurs aident à garder les bronches ouvertes. Cela permet de faciliter l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons. L'effet dure au moins 12 heures.
- Le propionate de fluticasone est un corticoïde qui diminue l'inflammation et l'irritation dans les poumons.

Votre médecin vous a prescrit ce médicament pour aider à prévenir certains troubles respiratoires tels que :

- Asthme,
- Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO). Seretide Diskus 500 microgrammes/50 microgrammes/dose réduit le risque d'épisodes d'exacerbations des symptômes de votre Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO).

Vous devez utiliser Seretide tous les jours comme indiqué par votre médecin. Cela permettra de contrôler correctement votre asthme ou votre BPCO.

Seretide permet d'éviter la survenue d'essoufflement et de sifflement. Cependant, Seretide ne doit pas être utilisé pour soulager une crise soudaine d'essoufflement ou de sifflement. Dans ces cas, vous devez utiliser votre médicament bronchodilatateur dit « de secours » d'action rapide et de courte durée, comme le salbutamol. Vous devez toujours avoir sur vous votre inhalateur dit « de secours » d'action rapide et de courte durée.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SERETIDE DISKUS ?

### N'utilisez jamais Seretide Diskus :

Si vous êtes allergique au salmétérol, au propionate de fluticasone ou à l'autre composant de ce médicament, le lactose monohydraté.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser Seretide si vous avez :

- une maladie du cœur, y compris un rythme cardiaque irrégulier ou trop rapide,
- une hyperactivité de la thyroïde,



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR


## SERETIDE DISKUS

100 microgrammes/50 microgrammes/dose,  
250 microgrammes/50 microgrammes/dose,  
500 microgrammes/50 microgrammes/dose,  
poudre pour inhalation en récipient unidose  
propionate de fluticasone/salmétérol

Ne prenez pas de  
brevet.

**SERETIDE** Diskus  
Fiktions- & Kulturredaktion

Papuane pour l'éducation en Papouasie



tentivement cette notice avant d'utiliser  
t car elle contient des informations  
pour vous.

notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si d'autres questions, interrogez votre pharmacien.

Si l'ent vous a été personnellement prescrit. Ne lez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur même si les signes de leur maladie sont aux vôtres.

Si l'entez un quelconque effet indésirable, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Ceci aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Seretide Diskus et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Seretide Diskus ?
  3. Comment utiliser Seretide Diskus ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver Seretide Diskus ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.