

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloger Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule 299

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom M. TASSIN

BRAHIM

Date de naissance 1941

Adresse ANDALOUS II Rue 6 N°3 case

Tél. 0663.072473

Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 05/05/2021

Nom et prénom du malade : BRAHIM, Age : .....

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNDP N° : A-A215 / 2019

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/02/2024			250DH	Dr. TANTALUU ELARAN ASTA Ophtalmologiste 203, Bd. Panoramique Rés. Panoramique II N°18 - Casa - Tél : 05.22.21.17.00

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ICE: 05360000005 INPE: 052045947 148 Avenue Nil Bloc 26 Casablanca OCEANIA SARL	05/02/24	733,10

### ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX	
					
MONTANTS DES SOINS					
DEBUT D'EXECUTION					
FIN D'EXECUTION					
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX	
	H	25533412 00000000 35533411	G		21433552 00000000 11433553
D	00000000	B	00000000		
	00000000		11433553		
MONTANTS DES SOINS					
DATE DU DEVIS					
DATE DE L'EXECUTION					
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS					
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION					

**Dr. TANTAOUI EL ARAKI Asmaa**  
spécialiste des maladies et chirurgie des yeux

**Ophthalmologiste**

Chirurgie de la cataracte - Glaucome  
Strabisme - Laser - Angiographie  
Lentilles de contact



**الدكتورة الطنطوي العراقي اسماء**

أخصائية في أمراض وجراحة العيون  
جراحة الجلالة - الزراق (طنسيون)  
الحول - الليزر - تخطيط أو عية الشبكية  
العدسات اللاصقة

Casablanca, le : ..... 05.02.2014.

**MOTASSIM BRAHIM.**

98,20 x 2



178,90 x 3



A : 733.10

N8

No St 1 galge

N5

PHARMACEUTICALS OCEANIA SARL  
146, 148 Avenue Nii Bloc 26  
ICE: 00310533600005  
INPE: 097045947

PHARMACEUTICALS OCEANIA SARL  
146, 148 Avenue Nii Bloc 26  
ICE: 00310533600005  
INPE: 097045947

الرقم 203، شارع المنظر، وشارع 2 مارس إقامة المنظر العام 2 الطابق الأول شقة رقم 18 - الدار البيضاء  
203, Bd. Panoramique (angle av. 2 Mars) Résidence Panoramique II, 1<sup>er</sup> étage, no 18 - Casablanca  
Tél./Fax : 05 22 21 17 00 - e-mail : ophta.panoramique@gamil.com

**TANTAOUI EL ARAKI Asmaa**  
Ophthalmologiste  
Rés. Panoramique II  
Tél. 05 22 21 17 00  
Casablanca

Monoprost 50 microgrammes/ml  
collyre en solution en récipient unidose  
PPV : 178.90 DH



6 118001 072583

Distribué par les laboratoires SOTHEMA,  
BP N°1, 27182 Bouskoura, Maroc

⇒ x 3 ced



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Xalatan™

latanoprost

50 microgrammes/ml collyre en solution



PAA122423  
038



Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Même si vous avez déjà utilisé dans le passé Xalatan ou un médicament similaire, nous vous conseillons de lire attentivement ce texte. L'information peut avoir été changée.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, le médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit ou a été prescrit à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, au médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan
3. Comment utiliser Xalatan
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Xalatan
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé ?

Xalatan fait partie d'un groupe de médicaments connus sous le nom d'analogues de prostaglandines. Xalatan favorise l'écoulement naturel du liquide contenu dans l'œil vers la circulation sanguine.

Xalatan est utilisé pour traiter des maladies connues sous les noms de **glaucome à angle ouvert** et d'**hypertension oculaire** chez les adultes. Ces deux maladies sont associées à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil et peuvent affecter votre vision.

Xalatan est aussi utilisé pour traiter l'augmentation de la pression oculaire et le glaucoma chez les enfants et les bébés de tous âges.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan ?

Xalatan peut être utilisé chez les hommes et femmes adultes (y compris les personnes âgées) et chez l'enfant, de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Xalatan n'a pas été étudié chez les nourrissons nés avant terme (âge gestational inférieur à 36 semaines).

#### N'utilisez jamais Xalatan :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au latanoprost ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes enceinte ou essayez de devenir enceinte.
- si vous allez.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, le médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien avant d'utiliser Xalatan ou avant de le donner à votre enfant, si certaines des situations ci-dessous correspondent à votre cas ou au cas de votre enfant:

- Si vous ou votre enfant devez subir ou avez subi une opération de l'œil (y compris une opération de la cataracte).
- Si vous ou votre enfant souffrez de problèmes aux yeux (comme une douleur, une irritation ou une inflammation des yeux, une vision trouble).
- Si vous ou votre enfant souffrez d'yeux secs.
- Si vous ou votre enfant avez de l'asthme sévère ou si l'asthme est mal contrôlé.
- Si vous ou votre enfant portez des lentilles. Vous pouvez toujours utiliser Xalatan, mais veuillez suivre les instructions pour porteurs de lentilles de contact mentionnées à la rubrique 3.
- Si vous avez souffert ou souffrez actuellement d'une infection virale de l'œil qui est causée par le virus herpès simplex (HSV).

#### Autres médicaments et Xalatan

Xalatan peut interagir avec d'autres médicaments. Informez votre médecin, le médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien si vous ou votre enfant utilisez, avez récemment utilisé ou pourrez utiliser tout autre médicament, y compris des médicaments (ou collyre en solution) obtenus sans ordonnance.

#### Grossesse et allaitement

**Vous ne devez pas utiliser Xalatan** si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.

Parlez-en immédiatement à votre médecin si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous voulez devenir enceinte.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez avoir pendant quelque temps une vision trouble quand vous utilisez Xalatan. Si ça vous arrive, **ne conduisez pas**. N'utilisez pas d'outils ou de machines jusqu'à ce que votre vision devienne à nouveau claire.

#### Xalatan contient du chlorure de benzalkonium

Xalatan contient un conservateur, appelé le chlorure de benzalkonium. Ce conservateur peut provoquer une fissure à la surface de l'œil. Le chlorure de benzalkonium peut être absorbé par les lentilles de contact et les lentilles souples. Evitez donc le contact avec des lentilles souples.

Si vous ou votre enfant portez des lentilles de contact, vous devez les retirer avant d'utiliser Xalatan. Après avoir utilisé Xalatan, vous devez attendre 15 minutes avant de remettre vos lentilles de contact. Veuillez lire les instructions stipulées dans la rubrique 3.

### 3. Comment utiliser Xalatan ?

Veuillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous avez des questions.

La dose habituelle pour adultes (y compris les personnes âgées) et enfants est de une goutte dans l'œil à chaque fois par jour. Le moment idéal pour le faire est le soir.

Vous ne devez pas utiliser Xalatan plus d'une fois par jour parce que l'efficacité du traitement peut être réduite et que cela peut être moins efficace.

Vous devez utiliser Xalatan comme prescrit par votre médecin ou le médecin traitant votre enfant jusqu'à ce que votre enfant dise d'arrêter.

#### Porteurs de lentilles de contact

Si vous ou votre enfant portez des lentilles de contact, vous devez les retirer avant d'utiliser Xalatan. Après avoir utilisé Xalatan, vous devez attendre 15 minutes avant de remettre vos lentilles de contact.

#### Mode d'emploi

1. Lavez-vous les mains et installez-vous confortablement.
2. Dévissez le capuchon extérieur (qui peut être jeté).





## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Xalatan™

latanoprost

50 microgrammes/ml collyre en solution



PAA122423  
038



Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Même si vous avez déjà utilisé dans le passé Xalatan ou un médicament similaire, nous vous conseillons de lire attentivement ce texte. L'information peut avoir été changée.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, le médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit ou a été prescrit à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, au médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan
3. Comment utiliser Xalatan
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Xalatan
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que Xalatan et dans quel cas est-il utilisé ?

Xalatan fait partie d'un groupe de médicaments connus sous le nom d'analogues de prostaglandines. Xalatan favorise l'écoulement naturel du liquide contenu dans l'œil vers la circulation sanguine.

Xalatan est utilisé pour traiter des maladies connues sous les noms de **glaucome à angle ouvert** et d'**hypertension oculaire** chez les adultes. Ces deux maladies sont associées à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil et peuvent affecter votre vision.

Xalatan est aussi utilisé pour traiter l'augmentation de la pression oculaire et le glaucoma chez les enfants et les bébés de tous âges.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xalatan ?

Xalatan peut être utilisé chez les hommes et femmes adultes (y compris les personnes âgées) et chez l'enfant, de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Xalatan n'a pas été étudié chez les nourrissons nés avant terme (âge gestational inférieur à 36 semaines).

#### N'utilisez jamais Xalatan :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au latanoprost ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes enceinte ou essayez de devenir enceinte.
- si vous allez.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, le médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien avant d'utiliser Xalatan ou avant de le donner à votre enfant, si certaines des situations ci-dessous correspondent à votre cas ou au cas de votre enfant:

- Si vous ou votre enfant devez subir ou avez subi une opération de l'œil (y compris une opération de la cataracte).
- Si vous ou votre enfant souffrez de problèmes aux yeux (comme une douleur, une irritation ou une inflammation des yeux, une vision trouble).
- Si vous ou votre enfant souffrez d'yeux secs.
- Si vous ou votre enfant avez de l'asthme sévère ou si l'asthme est mal contrôlé.
- Si vous ou votre enfant portez des lentilles. Vous pouvez toujours utiliser Xalatan, mais veuillez suivre les instructions pour porteurs de lentilles de contact mentionnées à la rubrique 3.
- Si vous avez souffert ou souffrez actuellement d'une infection virale de l'œil qui est causée par le virus herpès simplex (HSV).

#### Autres médicaments et Xalatan

Xalatan peut interagir avec d'autres médicaments. Informez votre médecin, le médecin traitant votre enfant ou votre pharmacien si vous ou votre enfant utilisez, avez récemment utilisé ou pourrez utiliser tout autre médicament, y compris des médicaments (ou collyre en solution) obtenus sans ordonnance.

#### Grossesse et allaitement

**Vous ne devez pas utiliser Xalatan** si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.

Parlez-en immédiatement à votre médecin si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous voulez devenir enceinte.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez avoir pendant quelque temps une vision trouble quand vous utilisez Xalatan. Si ça vous arrive, **ne conduisez pas**. N'utilisez pas d'outils ou de machines jusqu'à ce que votre vision devienne à nouveau claire.

#### Xalatan contient du chlorure de benzalkonium

Xalatan contient un conservateur, appelé le chlorure de benzalkonium. Ce conservateur peut provoquer une fissure à la surface de l'œil. Le chlorure de benzalkonium peut être absorbé par les lentilles de contact et les lentilles souples. Evitez donc le contact avec des lentilles souples.

Si vous ou votre enfant portez des lentilles de contact, vous devez les retirer avant d'utiliser Xalatan. Après avoir utilisé Xalatan, vous devez attendre 15 minutes avant de remettre vos lentilles de contact. Veuillez lire les instructions stipulées dans la rubrique 3.

### 3. Comment utiliser Xalatan ?

Veuillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous avez des questions.

La dose habituelle pour adultes (y compris les personnes âgées) et enfants est de une goutte dans l'œil à chaque fois par jour. Le moment idéal pour le faire est le soir.

Vous ne devez pas utiliser Xalatan plus d'une fois par jour parce que l'efficacité du traitement peut être réduite et que cela peut être moins efficace.

Vous devez utiliser Xalatan comme prescrit par votre médecin ou le médecin traitant votre enfant jusqu'à ce que votre enfant dise d'arrêter.

#### Porteurs de lentilles de contact

Si vous ou votre enfant portez des lentilles de contact, vous devez les retirer avant d'utiliser Xalatan. Après avoir utilisé Xalatan, vous devez attendre 15 minutes avant de remettre vos lentilles de contact.

#### Mode d'emploi

1. Lavez-vous les mains et installez-vous confortablement.
2. Dévissez le capuchon extérieur (qui peut être jeté).

