

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

W21-837080

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)
Matricule : 2170 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre
Nom & Prénom : KILLOU HASAN
Date de naissance : 07/04/1956
Adresse : Lot 50/Coma n°1345
Tél : 06 66 78 15 20 Total des frais engagés : 2000 DHS

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. AZIZ CHAFIK
Professeur Agrégé en Chirurgie Thoracique
et Pulmonaire Thyroïdienne (Général)
Av. Prince My. Abdellah, Résidence Bab Doukkala
Bloc C1 1ème Etage Appt N° 4 Marrakech
Tél/Fax: 05 24 43 45 66 GSM: 06 18 04 62 05
INP 071171367

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ☒ ALD ☐ ALC Pathologie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / / Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : /

PRAFR05/V2/20-10-2023

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25.01.24	cs		gratuit	

[illegible]

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 CABINET HAKKOU ANATOMIE ET DE CYTO-PATHOLOGIES Rue de la Liberté Guélliz Imm. Mamoun 2ème étage - Marrakech 303 - I.C.E. : 001639795000021	24	P9.9	10000



[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Montant des Honoraires	COEFFICIENT DES TRAVAUX
					
					MONTANTS DES SOINS
					DEBUT D'EXECUTION
					FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 00000000 35533411 B G 11433553				
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession Montant des Honoraires				MONTANTS DES SOINS
					DATE DU DEVIS
					DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION


**CABINET HAKKOU D'ANATOMIE
ET DE CYTO-PATHOLOGIES**

Docteur HAKKOU Mohamed

Médecin spécialiste en Anatomo-cytopathologie

Diplômé de la faculté de médecine de Toulouse

Ancien maître - assistant au CHU de Rabat



مختبر هكو للتشريح المرضي

الدكتور هكو محمد

طبيب اختصاصي في التشريح المرضي

خريج كلية الطب بتولوز

أستاذ مساعد سابق بالمستشفى الجامعي بالرباط

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES - IMMUNOPATHOLOGIE- PATHOLOGIE MOLÉCULAIRE

FACTURE

REF : 24/0225

Demande	H2387014 - 25/01/2024
Médecin traitant	PR CHAFIK AZIZ
Patient	AIT MANSOUR MINA - 026216
Date de facturation	25 / 01 / 2024

Liste des examens

THYROIDE

A Payer : 1 000,00 Dhs

coefficient : 909

Arrêtée la présente facture à la somme de : UN MILLIER DIRHAMS ET 00 CENTIMES

مختبر هكو للتشريح المرضي
CABINET HAKKOU
D'ANATOMIE ET DE CYTO-PATHOLOGIES
70, Rue de la Liberté Gueltz Imm. Mamoun
2ème étage - Marrakech
Tel. : 0524 44 95 83 - I.C.E : 001639795000021

70، زنقة الحرية جليل، عمارة مامون، الطابق الثاني، أمام فندق «الباشا» - مراكش - الهاتف : 08 08 50 71 29 - 05 24 44 95 83

Appt 7, 2^{ème} étage, Imm Mamoune, 70, Rue de la liberté, en face de l'Hôtel «Pacha» - Marrakech

E-mail : cabinethakkouacp@gmail.com - IF : 6500226 - RC 7303 - ICE : 001639795000021 - Patente : 45105529 - CNSS : 2228113

2- Résection de la partie plongeante :

Le nodule parenchymateux de la partie plongeante thyroïdienne est le siège d'un carcinome vésiculaire intra-thyroïdien, avec effraction de la capsule sans infiltration ni dépassement de la capsule thyroïdienne. Il est faite de vésicules de taille petite à moyenne, formée de cellules cubiques à noyaux ronds et hyperchromatiques et cernant un colloïde, par place, de faible abondance.

Présence d'embolies vasculaires. Les limites d'exérèse sont saines.


CONCLUSION

- Piece de thyroïdectomie totale avec la résection de la partie plongeante de la thyroïde, montrant :

- Un carcinome vésiculaire de la partie plongeante thyroïdienne de 1.5 cm de grand axe.
- Il est intra-thyroïdien avec embolies vasculaires et effraction de la capsule sans dépassement de la capsule thyroïdienne.
- Sur goitre multinodulaire de type colloïde.
- Les limites d'exérèse sont saines.
- pT1b Nx Mx (TNM 2017).

Dr. HAKKOU

Dr. HAKKOU Mohamed
CABINET HAKKOU
DIAGNOSTIC ET DE CYTO-PATHOLOGIES



Reçu le : 25/01/2024

Répondu le : 30/01/2024

Siège Prélèv. : THYROÏDE

Patient : AIT MANSOUR MINA

Médecin : PR CHAFIK AZIZ

Réf. : HH2387014

Réf. ant. : NON

R.C. : 60 ans. 1- Pièce de thyroïdectomie totale. 2- Résection de la partie plongeante.

COMPTE RENDU ANATOMO-PATHOLOGIQUE

I°/ Macroscopie :

1- Thyroïdectomie totale :

Il est reçu une pièce de thyroïdectomie totale pesant 70g et constituée par:

- Un lobe droit mesurant 5 x 5 x 3 cm.
- Un isthme mesurant 5 cm de hauteur.
- Un lobe gauche mesurant 5 x 2 x 2.5 cm.

A la coupe, le lobe droit est le siège d'un nodule colloïde mesurant 2.8x2cm, kystisé au centre avec capsule fine. Le reste du lobe est d'aspect homogène. L'isthme montre deux (2) nodules, dont le premier est colloïde, mesurant 1x1cm. Le deuxième est charnu, d'aspect blanc-grisâtre, mesurant 1.5x1cm. Le lobe gauche est d'aspect colloïde et diffus.

2- Résection de la partie plongeante :

Il est reçu un fragment multinodulaire, parvenu ouvert et mesurant 10x8x5cm, partiellement non encapsulé. A la coupe, l'aspect est colloïde et diffus avec remaniements hémorragiques et diffus. Présence d'un nodule parenchymateux de 1.5 cm de diamètre, mal limité, avec capsule irrégulière.

II°/ Microscopie :

1- Thyroïdectomie totale :

Du point de vue microscopique, il s'agit d'un parenchyme thyroïdien dystrophique, composé de nodules bien limités par une capsule mince. Ils sont formés avec des vésicules de grande taille renfermant un colloïde dense. Le revêtement épithélial est cubique ou aplati sans anomalies. Le colloïde est dense, homogène et éosinophile. Le tissu conjonctif est peu abondant, ponctué de cellules inflammatoires mononucléées et de sidérophages avec présence de vaisseaux congestifs à endothélium turgescents.

Il n'est pas observé de signes de malignité notamment un envahissement capsulaire ou d'embolies vasculaires tumoraux.

T.SVP

د. هكو محمد
مختبر هكو للتشريح المرضي
CABINET HAKKOU
D'ANATOMIE ET DE CYTO-PATHOLOGIES

Page 1/2

EVITAL®

GENSENG PLUS

vitamines et minéraux

Propriétés nutritionnelles:

Revitalise la puissance physique et mentale - contribue à l'amélioration des conditions de fatigue, d'épuisement et de dépression.

Contre les situations de stress physique et mental, perte de concentration, baisse de performance.

Comble efficacement les carences en vitamines, minéraux et oligo-éléments au cours de la convalescence et stress.

Adapté pour les diabétiques (sans sucre)

Dose journalière : une capsule à prendre une fois par jour avec le petit déjeuner ou comme recommandé par le professionnel de la santé.

Ce produit est un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Conserver à une température inférieure à 25 ° C, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Avant utilisation, lire la notice à l'intérieur.

CE N° 20201607559/MAV3/DMP/CA/18

FSCC000168AM23

GTIN: 18901296302726

Lot: RGM00422

Fab: OCT.2022

Exp: SEP.2025

S.N.: 2IKR470XR



Prix : 123DH25

capsule	%DJR*
	107.14 %
	100 %
RE	93.75 %
	90.90 %
	83.33 %
	75 %
	71.43 %
	62.5 %
	62.5 %
	41.67 %
capsule	%DJR*
	140.86 %
	66.67 %
	66.67 %
	25 %
	25 %
	9.38 %
	8.29 %
	0.8 %

Substances	Pour 1 Capsule
Extrait de ginseng	42.5 mg
Gallate de propyl	0.05 mg
Hydroxytoluène butylé	0.05 mg
Lécithine de soja	20,0 mg
Huile végétale hydrogénée	50.0 mg
Cire d'abeille blanche	10.0 mg
Huile de soja raffinée	385,672 mg

Capsules molles en gélatine

***DJR: dose journalière recommandée**

Propriétés nutritionnelles :

Ce produit est une combinaison équilibrée de ginseng, des multivitamines et de minéraux. Elle tonifie les fonctions métaboliques des cellules et procure ainsi un sentiment de bien-être, améliore la capacité du corps à combattre les infections et aide à réparer les tissus qui ont été endommagés par une blessure ou une maladie.

Imprimé, Boîte de 10.

ont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès. Durant le traitement par Sintrom, vous devrez éviter toute consommation excessive d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de Sintrom sur votre organisme. Interférence avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. En cas de bégnité, votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte, si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Seul cas très exceptionnel, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse OU DE L'ALLAITEMENT. IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE MÉDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN SPORT. Évitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

Sintrom® 4 mg
Acénocoumarol 10 comprimés

4297

سنتروم 4
أسينوكومارول

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

PPV :

Exp :

N° Lot :

6 118000 181187

51217DMP/21/NRQ

ont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès. Durant le traitement par Sintrom, vous devrez éviter toute consommation excessive d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de Sintrom sur votre organisme. Interférence avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. En cas de bégnité, votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte, si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Seul cas très exceptionnel, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse OU DE L'ALLAITEMENT. IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE MÉDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN SPORT. Évitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

Sintrom® 4 mg
Acénocoumarol 10 comprimés

4297

سنتروم 4
أسينوكومارول

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

PPV :

Exp :

N° Lot :

6 118000 181187

51217DMP/21/NRQ

Imprimé, Boîte de 10.

ont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès. Durant le traitement par Sintrom, vous devrez éviter toute consommation excessive d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de Sintrom sur votre organisme. Interférence avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. En cas de bégnité, votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte, si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Seul cas très exceptionnel, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse OU DE L'ALLAITEMENT. IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE MÉDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN SPORT. Évitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

Sintrom® 4 mg
Acénocoumarol 10 comprimés

4297

سنتروم 4
أسينوكومارول

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

PPV :

Exp :

N° Lot :

6 118000 181187

51217DMP/21/NRQ

ont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès. Durant le traitement par Sintrom, vous devrez éviter toute consommation excessive d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de Sintrom sur votre organisme. Interférence avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. En cas de bégnité, votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte, si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Seul cas très exceptionnel, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse OU DE L'ALLAITEMENT. IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE MÉDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN SPORT. Évitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

Sintrom® 4 mg
Acénocoumarol 10 comprimés

4297

سنتروم 4
أسينوكومارول

ET DANS QUELS CAS :

Ne pas s'appliquer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines : Gardez sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuels blessures. Le médecin traitant doit être informé de la prise de traitement anticoagulant. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé ?

Posologie, mode et/ou voies d'administration, fréquence d'administration :

Posologie : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Mises en garde spéciales : Respectez strictement la prescription médicale et reportez-vous à la rubrique « Mises en garde spéciales ».

Puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR, pour ajuster votre traitement. Les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, si possible après votre traitement. Mode d'administration : VOLE ORALE : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : 1 comprimé par jour, à jeun, avec un verre d'eau.

La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau. La prise médicamenteuse doit être effectuée à la même heure, à jeun, avec un verre d'eau.

PPV :

Exp :

N° Lot :

6 118000 181187

51217DMP/21/NRQ

AUGMENTIN 1 g/125 mg ○
16 sachets



PPV : 168,20 DH
LOT : 652427
PER : 05/25

inactivation.

AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections,
- infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, ne prenez pas AUGMENTIN.

Ne prenez jamais AUGMENTIN :

- si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique ou à d'autres antibiotiques, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la notice.
- si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'origine allergique). Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement de la face, des lèvres, de la gorge ou de la langue, ou un gonflement de la peau lors de la prise d'un antibiotique.
- si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé une jaunisse.

→ **Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus.**

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets indésirables, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une insuffisance rénale. Lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller certains effets indésirables. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière ».

Tests sanguins et urinaux

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges, fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), informez le médecin ou l'infirmière(ier) que vous prenez AUGMENTIN. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Autres médicaments et AUGMENTIN :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez pris ou devez prendre tout autre médicament.

Si vous prenez de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, la réaction cutanée allergique est plus élevée.

CABINET HAKKOU D'ANATOMIE**ET DE CYTO-PATHOLOGIE****Docteur HAKKOU Mohamed**

Médecin spécialiste en Anatomico-cytopathologie
Diplômé de la faculté de médecine de Toulouse
Ancien maître - assistant au CHU de Rabat

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE**HH2387014****AIT MANSOUR MINA****25/01/2024****مختبر هكو للتشريح****الدكتور هكو محمد**

طبيب اختصاصي في التشريح المرضي

خريج كلية الطب بتولوز

أستاذ مساعد سابق بالمستشفى الجامعي بـ

IMMUNOPATHOLOGIE - PATHOLOGIE MOLÉCULAIRE**DEMANDE D'EXAMENS HISTO-CYTOPATHOLOGIQUES**

De la part du Dr /Pr :

A. T. Mansour Mina

Mr, Mme, Mlle, Enft :

Age : Date du prélèvement :

Téléphone : Domicile :

HISTOLOGIE :☐ Biopsie☐ Pièce opératoire☐ Autre :

Organe :

Nombre de prélèvements :

CYTOLOGIE :


Frottis Cervico-Vaginal :

☐ Couche-mince☐ Conventionnel

Autres cytologies :

☐ Bronches☐ Plèvre☐ Urine☐ Sein☐ Autre**RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET EXAMENS ANTÉCÉDENTS :**

مختبر هكو
للتشريح المرضي
CABINET HAKKOU D'ANATOMIE
ET DE CYTO-PATHOLOGIES

**1** Pièce de Thyroïde**2** Resection de la

partie pléurale

Dr. H. Hakkou

70, Zouqat el-Haririyya, Emdara Mamoun, الطابق الثاني، أمام فندق «الباشا» - مراكش - الهاتف : 08 08 50 71 29 - 05 24 44 95 83

Appt 7, 2^{ème} étage, Imm Mamoune, 70, Rue de la Liberté, en face de l'Hôtel «Pacha» - Marrakech

E-mail : cabinethakkouacp@gmail.com - IF : 6500226 - RC 7303 - ICE : 001639795000021 - Patente : 45105529 - CNSS : 2228113

Dr Aziz Chafik

Professeur Agrégé de Chirurgie Thoracique

- Spécialiste de la Chirurgie des Maladies des Poumons
- Diplômé en Pneumologie Interventionnelle et Thoracoscopie (Paris)
- Chirurgie Thyroïdienne (Goitre), Cancerologie Thoracique
- Enseignant à la Faculté Privée de Médecine de Marrakech
- Ex. Chef de Service de Chirurgie Thoracique de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech
- Ex. Spécialiste des Hôpitaux Militaires
- Ex. Enseignant à la Faculté de Médecine de Marrakech
- Lauréat des Facultés de Médecine de Rabat et de Paris



الدكتور عزيز شفيق

أستاذ مبرمج في جراحة الصدر والرئة

- أخصائي في جراحة أمراض الصدر والرئة
- أخصائي أمراض الرئة التدخلية وجراحة الصدر بالمنظار (باريس)
- جراحة الغدة الدرقية، سرطان الرئة
- أستاذ بالجامعة الخاصة للطب بمراكش
- رئيس مصلحة جراحة الصدر بالمستشفى العسكري ابن سناء سابقاً
- طبيب باق بالمستشفيات العسكرية
- أستاذ جامعي بكلية الطب بمراكش (سابقاً)
- خريج كليات الطب بالرياض وباريس

Professeur Agrégé de Chirurgie Thoracique
et Pulmonaire
Av. Prince My Abdellah, Résidence Bab Doukkala
Bloc C1 1ème Etage Appt N° 4 - Marrakech
Tél/Fax: 05 24 43 45 66 - GSM: 06 18 04 62 05
INP 071171367



Marrakech, Le :

921/1124

Dr. Aziz Chafik

A l'hôpital de

cf Suivi par

Dr. Aziz CHAFIK
Professeur Agrégé de Chirurgie Thoracique
et Pulmonaire
Av. Prince My Abdellah, Résidence Bab Doukkala
Bloc C1 1ème Etage Appt N° 4 - Marrakech
Tél/Fax: 05 24 43 45 66 - GSM: 06 18 04 62 05
INP 071171367

شارع الأمير مولاي عبد الله، إقامة باب دكالة، بلوك س 1، الطابق الأول، الشقة رقم 4 - مراكش
Av. Prince My Abdellah, Résidence Bab Doukkala, Bloc C1, 1^{er} Etage Appt. N° 4 - Marrakech

Tél : 05 24 43 45 66 - GSM : 06 18 04 62 05 - E-mail : chafikaziz@yahoo.fr - Patente : 45109700 - IF : 15230495

1 CP	MATIN
1/2 CP	A JEUN

Respecter les doses prescrites
Liste II - Uniquement sur ordonnance



6 118901 102020
Levothyrox® 100 µg.
Comprimés sécables B/30
PPV: 24,40 DH

7882181342

GlaxoSmithKline Maroc
Ain El Aouda
Région de Rabat

PPV: 218,00 DH

ID: 650645
6 118001 141876

Lot
EXP
PPV

X H 8 M
0 4 2 0 2 5
4 2 , 2 0 D H


PPV: 168,20 DH
LOT: 652734
PER: 05/25



LOT

16J22078
09/2022

Cipla Maroc
BP 4491-11850
Oum Azza, Ain Aouda
PPC : 149,50 DH



مصحة الجنوب



POLYCLINIQUE DU SUD

مركز صحي وجراحي

وتصفية الكلوتين

Centre médico-Chirurgical
Hémodialyse

Marrakech, le : 25/1/2024

Dr. : R. Chafik

Ait Mansour Muna

Augmentin 1g cp

1g x 3 1/2 10/

Neopred 20mg 3 cp 1/2 10/

Aflamizone 1cp x 2 1/2 10/

Cedrol cp 1cp x 3 1/2 10/

Levothyrox 100 1cp 1/2 10/

Calcibid 125 1g x 3 1/2 10/

Seretide 250 spray 1/2 x 2 1/2 10/

05 24 42 14 87 : الفاكس - 05 24 44 79 99 : الهاتف - 40000 مراكش - جليل

2, Rue Yougoslavie, 40000 Marrakech - Gueliz - Tél : 05 24 44 79 99 - Fax : 05 24 42 14 87

Ventoline 100 mcg
Aérosol, 200 doses



Aflamick
20 Compri
Deva Pharmacie
ique
6 118000 410522

15 هـ

أفلاميك

میلوگسیکام

LOT: M1124
PER: 08/2025
PPV: 78,00DH

مضاد للإلتهاب

149.50

Chambre d'inhalation
Zerostat



06.07.07 = 1010.90

ARMACIE IBN ROCHD
36, Zineb Aicha, Guelliz Marrakech
البراق : 0016072830000092
24 44 62 93

LOT 2300.7
PER NOV 27
PPV 61DH60

22.00

80913
ستندیک
22.00