

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

195296

M23- N° 0040228

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7690 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : SAMALI MOSTAFA

Date de naissance : 12.12.55

Adresse : Avenue address

Tél. : 0674888484

Total des frais engagés : 230,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr FAHMI Asmaa  
Pneumologue  
Med Zetral. Abra Office Center 8  
1er Etage N° 5 Anassi - Casablanca  
Tél : 06 63 01 16 30

Date de consultation : 10/01/2024

Nom et prénom du malade : Samali Mostafa Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 06/02/2024

Signature de l'adhérent(e) : J.M.

15 FEB 2024

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/01/1984	CS		67	

et signature du Ma-  
tient le Paiement des

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 	12/12/24		330.81

8d. *lere* T

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

#### **BELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important:**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	G
25533412 00000000	21433552 00000000
D	
00000000 35533411	00000000 11433553

#### **[Création, remont, adjonction]**

	<p>D 00000000 35533411</p> <p>B 00000000 11433553</p> <p><b>B</b></p>	<p><b>MONTANTS DES SOINS</b></p>
<p><b>[Création, remont, adjonction]</b></p> <p>Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>		<p><b>DATE DU DEVIS</b></p>



AKDITAL

Hôpital Privé Casablanca Ain Sebaa  
المستشفى الخاص الدار البيضاء عين السبع

Casablanca, le..... 10.11.2024

Souhaite Mostafa.

16.11.2024

1/ Tiore gelule . + Rendizer  
gelule à : abler li leustu x o gnois.

60cc

2/ Doceva

1cp à sacer x 1

230.8c



Dr. FAHMI Asmaa  
Pneumologue  
Bd. Med Zerzai Abrai Office Center 8  
1er Etage N°5 Casablanca  
Tél: 06 63 01 16 30



AKDITAL

Hôpital Privé Casablanca Ain Sébaa  
المستشفى الخاص الدار البيضاء عين السبع

Casablanca, le....., 10/10/2024

Saouli Hafida

- Examen cytobactériologique des expectorations
- gencives expectoratives

DR FAHIMA SIMA  
Pneumologiste  
Bd. Med Zerzai, Abraim Office Center B  
1er Etage N° 5 Anfa - Casablanca  
Tél: 06 63 01 16 30

# DociVox®

comprimé à sucer

UX EXTRAITS DE PROPOLIS ET DE PLANTES

(Eucalyptus - Propolis - Echinacea - Gingembre)

Maux de gorge  
Enrouements passagers

LOT : 230087  
DLUO : 01/2026  
69,00 DH

Miel - citron

voies respiratoires  
en cas de toux  
s'urelles



Deva

Laboratoires Pharmaceutique  
J.OUAJDI Pharmacien Responsable

à angle fermé, qui est une maladie touchant les yeux. Une douleur ou une gêne oculaire, vision trouble, apparition de halos ou d'images colorées en association à des yeux rouges peuvent être des signes de crise aiguë du glaucome à angle fermé. Des symptômes oculaires peuvent être accompagnés par des céphalées, nausées ou vomissements. Vous devez alors utiliser Tiova Rotacaps 18 µg et consulter immédiatement votre médecin, de préférence un spécialiste des yeux, à l'apparition des symptômes du glaucome à angle fermé.

- Une sécheresse de la bouche, ayant été observée avec le traitement anticholinergique, peut être associée à long terme aux caries dentaires. Par conséquent, rappellez-vous d'accorder une attention particulière à l'hygiène buccodentaire.
- Si vous avez subi un infarctus du myocarde au cours des 6 derniers mois ou une arythmie cardiaque instable ou dangereuse ou une insuffisance cardiaque sévère au cours de l'année passée, veuillez en informer votre médecin. Ceci est important pour décider si Tiova Rotacaps 18 µg est le médicament qui vous convient.
- Ne prenez pas Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule plus d'une fois par jour.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

#### Enfants et adolescents

Tiova Rotacaps 18 µg n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans.

#### Interactions avec d'autres médicaments :

#### Autres médicaments et Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, ou avez récemment pris tout autre médicament, même s'il a été obtenu sans ordonnance. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez/avez pris des médicaments similaires pour votre maladie pulmonaire (BPCO), tels que l'ipratropium ou l'oxitropium. On n'a pas rapporté d'effets indésirables spécifiques lorsqu'un Tiova Rotacaps 18 µg a été pris avec d'autres médicaments pour traiter la BPCO comme les médicaments par voie inhalée destinés à soulager les symptômes, par exemple du salbutamol, méthylxanthines, par exemple la théophylline et/ou les stéroïdes oraux et inhalés par exemple la prédnisolone.

#### Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

#### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

#### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

#### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou pensez être enceinte, ou si vous allaitez, consultez votre médecin. Vous ne devez utiliser ce médicament que s'il a été spécifiquement recommandé par votre médecin.

#### Sportifs

Sans objet.

#### Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des

## machines

### Conduite et utilisation des machines

L'apparition de l'étourdissement, de vision trouble ou de céphalées peut influencer votre capacité à conduire et à utiliser des machines.

#### Mentions relatives aux excipients à effets notoires :

Ce médicament contient du lactose monohydraté, si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule

#### Instruction pour un bon usage

Suivez les instructions de votre médecin concernant le moment et le mode d'emploi de votre médicament. En cas de doute, demandez à votre médecin ou pharmacien.

#### Posologie, mode et/ou voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

La dose recommandée est d'inhaler 18 microgrammes (1 gélule) de Tiotropium une fois par jour. Ne dépassez pas la dose recommandée. Tiova Rotacaps 18 µg n'est pas recommandé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Vous devez essayer de prendre la gélule à la même heure chaque jour. Ceci est important car Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule agit pendant 24 heures.

Les gélules sont prises uniquement par voie d'inhalation et non par voie orale. N'avalez pas les gélules.

L'appareil Revolizer, où vous devez insérer la gélule de Bromure de Tiotropium, perfure la gélule et vous permet de respirer la poudre.

Assurez-vous d'avoir l'appareil Revolizer et d'utiliser correctement.

#### Instructions d'utilisation

- Votre médecin, infirmier ou pharmacien doit vous montrer comment utiliser votre appareil. Ils doivent vérifier comment vous l'utilisez de temps à autre.

#### Emploi du Revolizer

- Embout buccal
- Chambre à gélules Rotacaps
- Base



#### L'utilisation du Revolizer

- 1 : Pour ouvrir, tenir le revolizer à la base par une main, et retirer l'embout buccal comme démontré jusqu'à ce que les deux flèches se joignent



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule, Pilulier de 15 gélules

Tiotropium

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtre.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir rubrique (4) Quels sont les effets indésirables éventuels.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Tiova Rotacaps 18 µg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
3. Comment prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Tiova Rotacaps 18 µg ?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmaco-thérapeutique ou mode d'action

Tiova Rotacaps appartient à la classe des médicaments anticholinergiques. C'est un bronchodilatateur (il augmente le calibre des bronches pour favoriser le passage de l'air dans les poumons) à longue durée d'action qui s'administre par voie inhalée et sa durée d'action est de 24 heures.

### Indications thérapeutiques

Tiova Rotacaps 18 µg permet aux patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de respirer plus facilement. La BPCO est une maladie pulmonaire chronique qui provoque l'essoufflement et la toux. Le terme BPCO est associé à la bronchite chronique et à l'emphysème. La BPCO étant une maladie chronique et vous devez donc utiliser Tiova Rotacaps 18 µg de façon régulière quotidienne et non pas seulement quand vous ressentez une gêne respiratoire ou d'autres symptômes de BPCO.

Tiova Rotacaps 18 µg est un bronchodilatateur à longue durée d'action qui aide à ouvrir vos voies respiratoires et facilite l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons. L'utilisation régulière de Tiova Rotacaps 18 µg peut aussi vous aider lorsqu'une toux ou essoufflement continu lié à votre maladie et vous permettra de minimiser les effets de la maladie sur votre vie



PPV : 161 DH 80

LOT B 31455  
EXP 11/2024

- Êtes-vous allergique au tiotropium, à l'atropine ou à des médicaments similaires tels que l'ipratropium ou l'oxitropium ou aux protéines de lait?
- Prenez-vous tout autre médicament contenant de l'ipratropium ou l'oxitropium ?
- Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte ou allez-vous souffrir du glaucome à angle fermé, de problèmes de prostate ou de difficultés à uriner ?
- Avez-vous des problèmes rénaux ?
- Avez-vous subi un infarctus du myocarde au cours des 6 derniers mois ou d'arythmie cardiaque instable ou dangereuse d'insuffisance cardiaque sévère au cours l'année passée ?

Ne prenez jamais Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au tiotropium, à sa substance active ou au lactose monohydraté qui contient des protéines de lait
- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'atropine ou à des substances similaires, par ex. l'ipratropium ou l'oxitropium.

### Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

- Prévenez votre médecin si vous souffrez de glaucome à angle fermé, de problèmes de prostate ou avez des difficultés à uriner.
- Si vous avez des problèmes rénaux, veuillez consulter votre médecin.
- Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule est indiqué pour le traitement d'entretien de votre bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), il ne faut pas l'utiliser pour traiter une soudaine d'essoufflement ou de respiration sifflante.
- Des réactions allergiques immédiates telles qu'une éruption cutanée, œdème, démangeaisons, sifflement ou essoufflement peuvent survenir suite à l'administration de Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Les médicaments par inhalation comme Tiova Rotacaps 18 µg peuvent entraîner une oppression à la poitrine, toux, sifflement ou essoufflement immédiatement après l'inhalation. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Veuillez à ne pas laisser la poudre en inhalation toucher votre œil, pouvant provoquer une précipitation ou une aggravation du glaucome.