

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 12851

Société : RAM 096413

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : LAHLOU Zaineb

Date de naissance : 08/10/1988

Adresse : 1 Rue de l'Argane Maaf Cassi

Tél. : 0661216029

Total des frais engagés : 1590,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation : 18/02/23

Nom et prénom du malade : ALLA ZAINEB Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : AF gyneco

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 23/02/2024

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin assistante FIKRI Jamal Gynécologue Inane - Rabat 1. Rue Abou Inane - Rabat Docteur FIKRI Jamal Gynécologie 100065837 6. Rue Abou Inane - Rabat Tél.: 05 37 72 88 48 INP : 101065837
11/12/23	vn		600,00	
11/12/23	Hyst		600,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie LES TERRASSES MARAIS SARL Route AZEMOUR Ben Terrasses Marais Dar Bouazza - Casablanca Tél: 05 22 29 14 87	11/12/23	590,00

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX



O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
H	25533412	G	21433552
D	00000000	B	00000000
	00000000		00000000
	35533411		11433553



(Création, remont, adjonction)
 Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX			
MONTANTS DES SOINS			
DATE DU DEVIS			
DATE DE L'EXECUTION			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Jamel FIKRI

Professeur Agrégé

- Gynécologie - Obstétrique

- Stérilité - Cœliochirurgie

- Colposcopie - Hystéroskopie

Echographie 4D - Fécondation in Vitro

الدكتور جمال فكري

أستاذ مبرز

النوليد أمراض النساء

العمق

الجراحة التنظيرية

المساعدة الطبية على الانجاب

Rabat, le

الرباط، في

Rabat le :

11/12/2023

Docteur FIKRI Jamal
Gynécologie - Obstétrique
6, Rue Abou Inane - Rabat
Tél.: 05 37 72 88 48
INP : 101065837

Mme LAHLOU. Zaineb

CONSULTATION + ECHO +HYSTERO 1000.00 DH

**AREETER LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE
MILLE DIRHAMS.**

Docteur FIKRI Jamal
Gynécologie - Obstétrique
6, Rue Abou Inane - Rabat
Tél.: 05 37 72 88 48
INP : 101065837

Docteur Jamal FIKRI
Professeur Agrégé
Gynécologie - Obstétrique
Stérilité - Cœliochirurgie
Colposcopie - Hystéroskopie
Echographie 4D - Fécondation in Vitro

الدكتور جمال فكري
أستاذ مبرز
النوليد أمراض النساء
العمق
الجراحة التنظيرية
المعايدة الطبية على الإنجاب

Rabat, le الرباط، في

11/12/2023

Mme LAHLOU ZAINEB Ep MIKOU

ECHOGRAPHIE PELVIENNE:

- UTERUS DE TAILLE ET ECHOSTRUCTURE NORMALES**
- ENDOMETRE FIN ET REGULIER PROLIFERATIF**
- DISCRETE NICHE**
- OVAIRES NORMAUX 1 FOLLICULE DE 18 MM**
- PAS DE MASSE PELVIENNE**

CONCLUSION:ECHOGRAPHIE NORMALE

*Docteur FIKRI Jamal
Gynécologie - Obstétrique
6, Rue Abou Inane - Rabat
Tél : 05 37 72 88 48
05 37 72 88 40
05 37 20 60 95/96*

Docteur Jamal FIKRI
Professeur Agrégé
Gynécologie - Obstétrique
Stérilité - Cœliochirurgie
Colposcopie - Hystéroskopie
Echographie 4D - Fécondation in Vitro

الدكتور جمال فكري
أستاذ مبرز
النوليد أمراض النساء
العقم
الجراحة التلطيرية
المساعدة الطبية على الإنجاب

Rabat, le الرباط، في

11/12/2023

Mme LAHLOU ZAINEB Ep MIKOU

HYSEROSCOPIE DIAGNOSTIC:

- CANAL CERVICAL NORMAL
- FRANCHISSEMENT AISE DE L'ORIFICE ENDOCERVICAL
- CAVITE UTERINE DE DIMENSIONS NORMALES
TAPISSEE PAR UN ENDOMETRE FIN ROSE CHAMOISE AVEC
PROTRUSION DES ORIFICES GLANDULAIRES ET UNE
VASCULARISATION SOUS ENDOMETRIALE REGULIERE
- QUELQUES SPOTS CONGESTIFS
- ORIFICES TUBAIRES LIBRES
- PAS DE RETENTION AU NIVEAU DE LA NICHE

Dr Docteur FIKRI Jamal
Gynécologie - Obstétrique
6, Rue Abou Inane - Rabat
Tél.: 05 37 72 88 48
Fax: 05 37 72 88 48

Docteur Jamal FIKRI

Professeur Agrégé

Gynécologie - Obstétrique

Stérilité - Cœlio-chirurgie

Colposcopie - Hystéroskopie

Echographie 4D - Fécondation in Vitro

الدكتور جمال فكري

أستاذ مبرز

النوليد أمراض النساء

العقم

الجراحة التنظيرية

المساعدة الطبية على الإنجاب

Rabat, le الرباط، في

11/12/2023

Mme LAHLOU ZAINEB Ep MIKOU

OVITRELLE

1 AMPOULE EN SOUS CUTANE 1/12/2023

YOFOLVIT

1 COMPRIME / JOUR X 2 MOIS

VIBRA 200

1 CP / JOUR X 16 JOURS

Diflucan 100

1 gél

Dar netti

S.V.

S.V.

S.V.

900.00

21.00

89.00

53.70

81.30

= 59.00

Dr. FIKRI, Jamal
Gynécologie - Obstétrique
Rue Abou Inane - Rabat
Tél: 05 37 72 88 48

Pharmacie LES TERRASSES MARINES SARL AU
1029 AZEMOUR Rés Terrasses Marins
Dar Bouazza - Casablanca
Tél: 05 22 29 10 87

Dermofix® crème
Sertaconazole

PROMOPHARM S.A.



6 118000 240259

DERMOFIX® Crème Sertaconazole

2 g

100 g

Composition :

Sertaconazole nit.

Excipients (dont E)

Propriétés :

Le Sertaconazole

- levures pathogènes,
- dermatopigments (Trichophyton, C. tropicalis, C. spp., Pityrosporum orbiculaires)
- champignons opportunistes filamentés (Aspergillus)
- germes résistants à d'autres anti-mycosiques
- bactéries gram⁺ (Staphylocoques et Streptocoques)

Indications thérapeutiques :

Traitements topiques des mycoses superficielles de la peau telles que dermatophytoses : Tinea pedis (pied d'athlète), Tinea cruris (Eczéma marginé de Hebra), Tinea corporis (Herpès circiné), Tinea barbae (Sycosis), et Tinea manus, Candidoses (Minilliote) et Pityriasis versicolore (Pityrosporum orbiculare).

Effets indésirables :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications n'entraînant jamais la suspension du traitement.

Conditions particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophtalmique.

Après l'application dermique de grandes quantités, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez le nouveau-né et chez la femme enceinte ou allaitante.

Posologie usuelle, voie et mode d'administration :

Voie topique.

Appliquer la crème une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone infectée.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique de l'infection.

En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinico-microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récidive, cette guérison clinico-microbiologique entre deux et quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytose : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

Formes et autres présentations :

Dermofix® crème 2% tube de 30 g

Dermofix® poudre flacon de 30 g

Dermofix® Solution 2% flacon de 30 ml

Dermofix® Gel 2% flacon de 50 g

Dermofix® Gel 2% flacon de 100 g

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

Liste I (Tableau A)

PROMOPHARM S.A.

Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc

S/L FERRER INTERNATIONAL



Vibramycine® 100 mg

Vibra® 200 mg

Comprimé sécable
Doxycycline monohydrate

NOTICE

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament.

Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Vibramycine/Vibra et quand est-il utilisé?

Vibramycine/Vibra est un antibiotique du groupe des tétracyclines qui agit contre des agents pathogènes, des bactéries qui provoquent des infections.

Vibramycine/Vibra est utilisé pour le traitement d'infections telles que :

- les infections des voies respiratoires
- les infections du nez, de la gorge et des oreilles (infections ORL ou oto-rhino-laryngologiques)
- les infections des voies urinaires
- les infections des organes génitaux
- les infections de la peau et des tissus mous
- les infections gastro-intestinales
- les infections obstétricales et gynécologiques
- les infections de la bouche (infections buccales)
- les infections des yeux (infections oculaires)
- certaines infections transmises par les tiques

Vibramycine/Vibra est indiqué pour la prévention des infections suivantes :

- diarrhée des voyageurs
- paludisme dans certaines régions du globe.

Vibramycine/Vibra ne peut être pris que sur prescription médicale. De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

N'oubliez pas que ce médicament vous a été prescrit par votre médecin en traitement de la maladie dont vous souffrez actuellement. Il ne doit pas être utilisé pour soigner d'autres affections ou d'autres personnes.

L'antibiotique que contient Vibramycine/Vibra n'est pas efficace contre tous les micro-organismes à l'origine de maladies infectieuses. La prise d'un antibiotique mal choisi ou mal dosé peut entraîner des complications. Ne l'utilisez par conséquent pas de votre propre initiative pour traiter d'autres maladies ou d'autres personnes. En cas de nouvelle infection ultérieure, vous ne devrez pas non plus utiliser Vibramycine/Vibra sans une nouvelle prescription médicale.

Quand Vibramycine/Vibra ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devez pas prendre Vibramycine/Vibra si vous êtes allergique au principe actif de Vibramycine/Vibra, la doxycycline, à un autre composant du médicament ou à d'autres antibiotiques de la famille des tétracyclines. Prévenez votre médecin si vous avez déjà connu des effets secondaires avec des antibiotiques ou si vous n'avez pas bien supporté un traitement antérieur par Vibramycine/Vibra.

Une hypersensibilité se manifeste notamment par une dyspnée, une difficulté à respirer (asthme), des problèmes de circulation, des tuméfactions, des enflures ou un gonflement de la peau (par ex. urticaire) et des muqueuses, des démangeaisons ou des éruptions cutanées.

Vibramycine/Vibra ne doit pas être pris en cas de maladies hépatiques graves.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Vibramycine/Vibra ?

L'administration de tétracyclines à des femmes enceintes de plus de quatre mois (au cours de la deuxième moitié de la grossesse), à des petits enfants et à des enfants de moins de 12 ans, peut entraîner une coloration (jaune-gris-brun) permanente des dents ou une formation imparfaite de l'émail dentaire (hypoplasie de l'émail). Ces patientes et patients ne prendront donc Vibramycine/Vibra que si le médecin l'ordonne expressément.

Si vous souffrez d'une affection hépatique, vous ne devriez prendre Vibramycine/Vibra que si votre médecin vous l'a prescrit expressément et si vous restez sous strict contrôle médical.

En cas d'apparition d'une réaction de la peau (telle qu'une éruption cutanée ou des démangeaisons), vous devrez arrêter de

prendre le médicament et en informer immédiatement votre médecin.

aux rayons ultraviolets, c'est-à-dire les réactions d'hypersensibilité au soleil ou aux rayons ultraviolets, les éruptions cutanées, vous devrez consulter le médecin.

tation ou d'un ulcère, il faut arrêter les comprimés et boire de l'eau et les avaler avec.

enir lors de la prise de certains médicaments, troubles gastro-intestinaux et de diarrhée, vous devrez arrêter immédiatement.

Vibra® 200 mg

8 comprimés sécables



6 118000 250449

ces médicaments qui inhibent le péristaltisme intestinal (mouvements de l'intestin) ne doivent pas être pris en cas de diarrhée.

Les patients qui utilisent des médicaments antiacides ou des médicaments à base de bismuth en raison de troubles gastriques, ou les patients qui prennent des préparations contenant du fer, ne devraient pas prendre ces médicaments en même temps que Vibramycine/Vibra car ils ont un effet défavorable sur la résorption de Vibramycine/Vibra (c'est-à-dire sur son passage dans le sang). Ceci est également valable pour le charbon activé et les médicaments à base de colestyratine. C'est pourquoi il faut prendre Vibramycine/Vibra soit 2 heures avant, soit 4 heures après la prise de ces préparations.

Combinaisons d'antibiotiques : la prise d'un autre antibiotique en plus de Vibramycine/Vibra ne devra se faire que si le médecin le prescrit expressément.

Si vous prenez un anticoagulant (médicament pour liquéfier le sang), un antidiabétique oral (médicament pour abaisser la glycémie, c'est à dire le taux de sucre dans le sang), un médicament pour réduire la fréquence des crises d'épilepsie (anti-convulsivant), un somnifère ou un contraceptif oral (pilule contraceptive), vous devez en informer votre médecin. Si vous prenez un contraceptif oral (pilule contraceptive), notez que son efficacité peut être réduite pendant un traitement par des antibiotiques. Votre médecin ou votre pharmacien peut alors vous conseiller d'autres méthodes de contraception.

Informez votre médecin si vous devez prochainement subir une intervention chirurgicale. En effet, l'utilisation simultanée d'un anesthésique particulier (le méthoxyflurane) peut entraîner une lésion rénale fatale.

Ne consommez pas d'alcool pendant un traitement par Vibramycine/Vibra.

L'utilisation concomitante de doxycycline et de ciclosporine A peut augmenter l'effet toxique de l'immunosuppresseur (la ciclosporine A).

L'utilisation concomitante de théophylline et de tétracyclines peut augmenter le risque d'effets indésirables au niveau du système gastro-intestinal.

L'utilisation de tétracyclines, y compris la doxycycline, peut entraîner une augmentation bénigne de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne qui est normalement réversible. On a toutefois rapporté des cas de céphalgie permanente survenus suite à une augmentation de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne sous traitement avec des tétracyclines, y compris la doxycycline. Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous constatez l'apparition de troubles de la vue au cours du traitement. Il est établi que l'isotretinoïne, un principe actif utilisé dans le traitement de l'acné, peut elle aussi entraîner, dans de rares cas, une augmentation bénigne de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne; il convient donc d'éviter toute utilisation concomitante d'isotretinoïne et de doxycycline.

La concentration de méthotrexate peut être augmentée par l'administration simultanée de méthotrexate et de doxycycline. Si vous contrôlez vous-même votre taux de sucre dans les urines (glycosurie), veuillez en informer votre médecin.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite automobile et la capacité à utiliser des outils ou des machines. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie (comme p. ex. une maladie d'acné)
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou en utilisez déjà en



Vibramycine® 100 mg

Vibra® 200 mg

Comprimé sécable
Doxycycline monohydrate

NOTICE

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament.

Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Vibramycine/Vibra et quand est-il utilisé?

Vibramycine/Vibra est un antibiotique du groupe des tétracyclines qui agit contre des agents pathogènes, des bactéries qui provoquent des infections.

Vibramycine/Vibra est utilisé pour le traitement d'infections telles que :

- les infections des voies respiratoires
- les infections du nez, de la gorge et des oreilles (infections ORL ou oto-rhino-laryngologiques)
- les infections des voies urinaires
- les infections des organes génitaux
- les infections de la peau et des tissus mous
- les infections gastro-intestinales
- les infections obstétricales et gynécologiques
- les infections de la bouche (infections buccales)
- les infections des yeux (infections oculaires)
- certaines infections transmises par les tiques

Vibramycine/Vibra est indiqué pour la prévention des infections suivantes :

- diarrhée des voyageurs
- paludisme dans certaines régions du globe.

Vibramycine/Vibra ne peut être pris que sur prescription médicale.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

N'oubliez pas que ce médicament vous a été prescrit par votre médecin en traitement de la maladie dont vous souffrez actuellement. Il ne doit pas être utilisé pour soigner d'autres affections ou d'autres personnes.

L'antibiotique que contient Vibramycine/Vibra n'est pas efficace contre tous les micro-organismes à l'origine de maladies infectieuses. La prise d'un antibiotique mal choisi ou mal dosé peut entraîner des complications. Ne l'utilisez par conséquent pas de votre propre initiative pour traiter d'autres maladies ou d'autres personnes. En cas de nouvelle infection ultérieure, vous ne devrez pas non plus utiliser Vibramycine/Vibra sans une nouvelle prescription médicale.

Quand Vibramycine/Vibra ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devez pas prendre Vibramycine/Vibra si vous êtes allergique au principe actif de Vibramycine/Vibra, la doxycycline, à un autre composant du médicament ou à d'autres antibiotiques de la famille des tétracyclines. Prévenez votre médecin si vous avez déjà connu des effets secondaires avec des antibiotiques ou si vous n'avez pas bien supporté un traitement antérieur par Vibramycine/Vibra.

Une hypersensibilité se manifeste notamment par une dyspnée, une difficulté à respirer (asthme), des problèmes de circulation, des tuméfactions, des enflures ou un gonflement de la peau (par ex. urticaire) et des muqueuses, des démangeaisons ou des éruptions cutanées.

Vibramycine/Vibra ne doit pas être pris en cas de maladies hépatiques graves.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Vibramycine/Vibra ?

L'administration de tétracyclines à des femmes enceintes de plus de quatre mois (au cours de la deuxième moitié de la grossesse), à des petits enfants et à des enfants de moins de 12 ans, peut entraîner une coloration (jaune-gris-brun) permanente des dents ou une formation imparfaite de l'émail dentaire (hypoplasie de l'émail). Ces patientes et patients ne prendront donc Vibramycine/Vibra que si le médecin l'ordonne expressément.

Si vous souffrez d'une affection hépatique, vous ne devriez prendre Vibramycine/Vibra que si votre médecin vous l'a prescrit expressément et si vous restez sous strict contrôle médical.

En cas d'apparition d'une réaction de la peau (telle qu'une éruption cutanée ou des démangeaisons), vous devrez arrêter de

prendre le médicament et en informer immédiatement votre médecin.

aux rayons ultraviolets, c'est-à-dire les réactions d'hypersensibilité au soleil ou aux rayons ultraviolets, les éruptions cutanées, vous devrez consulter le médecin.

tation ou d'un ulcère, il faut prendre les comprimés sécables avec de l'eau et les avaler avec.

enir lors de la prise de médicaments, troubles gastro-intestinaux et de diarrhée, vous devrez informer immédiatement votre médecin.

Vibra® 200 mg

8 comprimés sécables



6 118000 250449

Les médicaments qui inhibent le péristaltisme intestinal (mouvements de l'intestin) ne doivent pas être pris en cas de diarrhée.

Les patients qui utilisent des médicaments antiacides ou des médicaments à base de bismuth en raison de troubles gastriques, ou les patients qui prennent des préparations contenant du fer, ne devraient pas prendre ces médicaments en même temps que Vibramycine/Vibra car ils ont un effet défavorable sur la résorption de Vibramycine/Vibra (c'est-à-dire sur son passage dans le sang). Ceci est également valable pour le charbon activé et les médicaments à base de colestyratine. C'est pourquoi il faut prendre Vibramycine/Vibra soit 2 heures avant, soit 4 heures après la prise de ces préparations.

Combinaisons d'antibiotiques : la prise d'un autre antibiotique en plus de Vibramycine/Vibra ne devra se faire que si le médecin le prescrit expressément.

Si vous prenez un anticoagulant (médicament pour liquéfier le sang), un antidiabétique oral (médicament pour abaisser la glycémie, c'est à dire le taux de sucre dans le sang), un médicament pour réduire la fréquence des crises d'épilepsie (anti-convulsivant), un somnifère ou un contraceptif oral (pilule contraceptive), vous devez en informer votre médecin. Si vous prenez un contraceptif oral (pilule contraceptive), notez que son efficacité peut être réduite pendant un traitement par des antibiotiques. Votre médecin ou votre pharmacien peut alors vous conseiller d'autres méthodes de contraception.

Informez votre médecin si vous devez prochainement subir une intervention chirurgicale. En effet, l'utilisation simultanée d'un anesthésique particulier (le méthoxyflurane) peut entraîner une lésion rénale fatale.

Ne consommez pas d'alcool pendant un traitement par Vibramycine/Vibra.

L'utilisation concomitante de doxycycline et de ciclosporine A peut augmenter l'effet toxique de l'immunosupresseur (la ciclosporine A).

L'utilisation concomitante de théophylline et de tétracyclines peut augmenter le risque d'effets indésirables au niveau du système gastro-intestinal.

L'utilisation de tétracyclines, y compris la doxycycline, peut entraîner une augmentation bénigne de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne qui est normalement réversible. On a toutefois rapporté des cas de céphalgie permanente survenus suite à une augmentation de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne sous traitement avec des tétracyclines, y compris la doxycycline. Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous constatez l'apparition de troubles de la vue au cours du traitement. Il est établi que l'isotrétiïnone, un principe actif utilisé dans le traitement de l'acné, peut elle aussi entraîner, dans de rares cas, une augmentation bénigne de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne; il convient donc d'éviter toute utilisation concomitante d'isotrétiïnone et de doxycycline.

La concentration de méthotrexate peut être augmentée par l'administration simultanée de méthotrexate et de doxycycline. Si vous contrôlez vous-même votre taux de sucre dans les urines (glycosurie), veuillez en informer votre médecin.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite automobile et la capacité à utiliser des outils ou des machines. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie (comme p. ex. une maladie d'acné)
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou en utilisez déjà en

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**Difflucan 50 mg gélules****Difflucan 150 mg gélules**

fluconazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne figure pas dans la rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Difflucan et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Difflucan
3. Comment prendre Difflucan
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Difflucan

6. Contenu de l'emballage et autres informations**1. Qu'est-ce que Difflucan et dans quel cas est-il utilisé ?**

Difflucan fait partie d'un groupe de médicaments appelés "antifongiques". Difflucan est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons qui empêchent de contracter une infection à *Candida*. La cause la plus courante est *Candida albicans*.

Adultes

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Meningite à cryptococcose - infection fongique du cerveau
- Coccidioidomycoses - une maladie du système bronchopulmonaire
- Infections à *Candida*, retrouvées dans le sang, des organes (p.ex. cœur, poumons) ou les voies urinaires.
- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire
- Mycose génitale - infection du vagin ou du pénis.
- Infections cutanées - p.ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczéma marginé de Hebra, infection des ongles

Vous pourrez aussi recevoir du Difflucan pour :

- Éviter la récidive d'une méningite à cryptococcose
- éviter la récidive d'une mycose de la muqueuse
- diminuer le risque de récidive de mycose vaginale

éviter de contracter une infection à *Candida* (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)

Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :

- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge
- Infections à *Candida*, retrouvées dans le sang, des organes (p.ex. cœur, poumons) ou les voies urinaires.
- Meningite à cryptococcose - infection fongique du cerveau

Vous pourrez aussi recevoir du Difflucan pour :

- vous empêcher de contracter une infection à *Candida* (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).

- éviter la récidive d'une méningite à cryptococcose

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Difflucan ?**Ne prenez jamais Difflucan :**

- si vous êtes allergique au fluconazole, aux autres médicaments que vous avez pris pour traiter des infections fongiques ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Les symptômes peuvent être de type démangeaisons, rougeur de la peau ou difficultés à respirer.
- si vous prenez de l'astémizole, de la terfénadine (médicaments antihistaminiques utilisés pour traiter les allergies).
- si vous prenez du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac).
- si vous prenez du pimozide (utilisé pour traiter des troubles mentaux).
- si vous prenez de la quinidine (utilisée pour traiter les troubles du rythme cardiaque).
- si vous prenez de l'érythromycine (antibiotique pour traiter les infections).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Difflucan :

- si vous avez des problèmes de foie ou de rein,
- si vous souffrez d'une maladie du cœur, y compris des troubles du rythme cardiaque,
- si vous avez des taux anormaux de potassium, de calcium ou de magnésium dans le sang,
- si vous développez des réactions cutanées graves (démangeaisons, rougeurs de la peau ou des difficultés à respirer),
- si vous développez des signes d'insuffisance surrenale, un trouble dans lequel les glandes surrenales produisent des quantités insuffisantes de certaines hormones stéroïdiennes comme le cortisol (fatigue chronique ou prolongée, faiblesse musculaire, perte d'appétit, perte de poids, douleurs abdominales).

Autres médicaments et Difflucan

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Prévenez immédiatement votre médecin si vous prenez de l'astémizole, de la terfénadine (un antihistaminique pour traiter les allergies) ou du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac) ou du pimozide (utilisé pour traiter les troubles mentaux) ou de la quinidine (utilisée pour traiter les arythmies cardiaques) ou de l'érythromycine (un antibiotique pour traiter les infections).

DIFLUCAN® 150 mg**1 GÉLULE**

6 118000 250159

15

6 118001 260416

O (PPV: 200.00 DH)



N54G5802D

Notice : Information de l'utilisateur

MERCK

OVITRELLE® 250 microgrammes/0,5 mL solution injectable en seringue préremplie

Choriogonadotropine alfa
Voie Sous cutanée

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Ovitrelle et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ovitrelle
3. Comment utiliser Ovitrelle

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Ovitrelle
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Ovitrelle et dans quels cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Ovitrelle ?

Ovitrelle contient un médicament appelé « choriogonadotropine alfa » fabriqué en laboratoire selon les techniques de l'ADN recombinant. La choriogonadotropine alfa est similaire à une hormone naturellement présente dans votre corps, appelée « gonadotropine chorionique », qui est impliquée dans la procréation et la fertilité.

Dans quels cas Ovitrelle est-il utilisé ?

Ovitrelle est utilisé en association avec d'autres médicaments :

- pour aider au développement et à la maturation de plusieurs follicules (chacun contenant un ovule) chez les femmes ayant recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation.