

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

19/07/23

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0621 Société : Retraite

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL ZZAHIDI Brahim

Date de naissance : 01/07/1941

Adresse : Avenue des Pleiades route 59 N°59 HERMITAGE Casablanca

Tél. : 0669 5845 39 Total des frais engagés : 610,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

الدكتور ابراهيم زهاد
عن النفس الذهنية
المسنون وانفع في
شارع 131
0522 24 22 22

Date de consultation : 23/01/2024

Nom et prénom du malade : 0522 24 22 22 21000 Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Balycanthus changes -

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 28/01/2024

Signature de l'adhérent(e) : SM

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/10/24	44

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient												
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>											
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>											
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>											
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>											
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE														
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> </table>		H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000		35533411	11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
H	25533412	21433552													
D	00000000	00000000													
B	00000000	00000000													
	35533411	11433553													
	<p style="text-align: center;">[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>											
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>											
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>											

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur HADDANE Driss

Médecine Générale
 Diplômé Universitaire de psychologie
 Clinique et Traitement Comportementale
 Conseiller éducatif et familiale
 (Casablanca Maroc)
 Diplômé Universitaire
 et Diabète et Nutrition (Bordeaux France)
 Diplômé Universitaire
 'Echographie Générale (Montpellier France)
 Diplômé Universitaire de Gynécologie
 infertilité et suivi de
 Grossesse (Bordeaux France)
 Diplômé Universitaire
 Médecin du Sport (Rennes France)
 Diplômé Universitaire de Gériatrie
 Gérontologie (Bordeaux France)
 Agrée pour la visite Médicale Spéciale
 aux permis de conduire



الدكتور إدريس هدان

الطب العام
 دبلوم جامعي علم النفس
 الإكلينيكي والعلاج السلوكي
 مستشار في التربية والعلاقات الأسرية
 (الدار البيضاء بالمغرب)
 دبلوم جامعي
 أمراض السكري والتغذية (بوردو بفرنسا)
 دبلوم جامعي
 الفحص بالإيكوغرافي مونبولي بفرنسا
 دبلوم جامعي أمراض النساء والعقم
 (وتتبع الحمل بوردو بفرنسا)
 دبلوم جامعي
 الطب الرياضي (رانس بفرنسا)
 دبلوم جامعي علم وطب الشيخوخة
 (بوردو بفرنسا)
 قبول للفحص الطبي الخاص برخصة السيارة

Rabat, le: 23/01/2024 الرباط، في:

CHANTECH - 8H00R

$$\frac{45,80 \times 3}{137,40}$$

1) entangle le mat app

2) entangle syn

3 - 0 - 0

2 - 0 - 0

M

M 1 - 0 - 0

x 10 ✓

x 10 ✓

x 10 ✓

75,00

119,00

79,50

3) Ruler 20 cm (6m)

1 - 0 - 0

cm

4) stercare ✓

0 - 1 - 0 - 0 ✓

5) fabffel ✓

✓

x 10 m m (0 2 m) - 1 -

~~Dr. HADDANE
 135, bis, Avenue HAY RAJA
 Casablanca - Tél. 0525 860525
 Docteur HADDANE
 CHANTECH - 8H00R
 Pharmacie RAJA
 Casablanca - Tél. 0525 860525
 Dr. HADDANE
 135, bis, Avenue HAY RAJA
 Casablanca - Tél. 0525 860525~~

~~Dr. HADDANE
 135, bis, Avenue HAY RAJA
 Casablanca - Tél. 0525 860525
 Dr. HADDANE
 135, bis, Avenue HAY RAJA
 Casablanca - Tél. 0525 860525~~

العمارة ١٣ الشقة ٧ الطابق الأول شارع الحسن الثاني وزاوية زنقة المامونية فوق السি ويكيكي (قرب باب الأحد) - الرباط

المستعجلات محمول: 05 37 70 66 22 - الثابت: 06 57 34 25 42 Urgence : 05 37 70 66 22

410,90

Que faire si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler les gélules

Si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler vos gélules :

- Ouvrir la gélule et avaler le contenu directement avec un demi-verre d'eau ou mettre le contenu dans un verre d'eau non gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme)

• Toujours remuer juste homogène). Puis boire le

- Pour s'assurer que vous ne pas les mâcher ni les cracher dans la compote ou pomme ;

Si vous avez pris plus de n'auriez dû

Consultez immédiatement

Si vous oubliez de prendre

Si vous oubliez de prendre

Cependant, si vous êtes

prenez pas la dose que

Ne prenez pas de dose d'

prendre.

Si vous arrêtez de prendre KALEST 20 mg, gélule

N'arrêtez pas de prendre KALEST sans avis au préalable de votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre KALEST et contactez immédiatement un médecin :

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves) ;

• Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique ;

• Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- Maux de tête ;
- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence ;

• Nausées ou vomissements.

• Polypes bénins dans l'estomac.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- Gonflement des pieds et des chevilles ;
- Troubles du sommeil (insomnie) ;
- Étourdissements, fourmillements, somnolence ;
- Vertiges ;
- Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie ;
- Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons ;
- Malaise général, manque d'énergie.

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

• Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses ou faciliter la survenue d'infections ;

• Réactions allergiques, parfois très graves incluant le gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, de la fièvre, une respiration sifflante ;

• Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes ;

• Agitation, confusion ou dépression ;

• Troubles du goût ;

• Troubles de la vue, tels que vision trouble ;

• Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme) ;

• Sécheresse buccale ;

• Inflammation de l'intérieur de la bouche ;

• Infection appelée « muguet » qui peut être causée par un champignon ;

• Troubles hépatiques incluant la jaunisse en jaune, des urines sombres et de la fatigue

• Perte de cheveux (alopecie) ;

• Eruption cutanée lors d'une exposition à des substances irritantes (arthralgie) ou sévères (nephrite interstitielle) ou la sueur.

• Rares (peuvent affecter un très petit nombre de cellules du corps).

LOT 220654
EXP 11/2024
PPV 75.00DH

visuelles, sensorielles ou auditives sévères entraînant une affection du cerveau ;
• Urticaire d'éruptions cutanées sur la peau pouvant être associées à des symptômes aigus (érythème polymorphe, syndrome de Steven's Johnson, syndrome toxicodermique) ;

• Gonflement des sinus chez l'homme.

Effets indésirables de fréquence indéterminée sur la base des données disponibles).

• Inflammation de l'intestin (entrant dans la catégorie des effets indésirables courants) ;

• Si vous prenez KALEST pendant plus de deux mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. Des symptômes peuvent apparaître et se traduire par une fatigue, des contractures, une désoxygénation, des convulsions, des sensations d'angoisse et des troubles du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, informez immédiatement votre médecin. Des symptômes peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium dans le sang. Votre médecin pourra décider de faire des examens réguliers pour surveiller votre taux de potassium dans le sang.

• Eruption cutanée, éventuellement avec des symptômes de choc. Ces effets indésirables sont rares. KALEST peut dans de très rares cas affecter les défenses immunitaires. Vous devez consulter votre médecin si vous avez une infection avec des symptômes de fatigue générale très importante, ou de la fièvre, ou de la douleur dans la tête ou la poitrine, ou de la difficulté à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit immunitaire peut être éliminé par un test sanguin. Il existe des informations sur vos médicaments dans ce document.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, informez immédiatement votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique à tous les effets indésirables, même si ce n'est pas mentionné dans cette notice. Les effets indésirables directement liés à KALEST peuvent être signalés au Réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER KALEST

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'emballage.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments obsolètes. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET

Ce que contient KALEST 20 mg, gélule

La substance active est :

Oméprazole.

Pour une gélule gastro-résistante.

Les autres composants sont :

Carbonate de magnésium léger, hydroxypropylcellulose, amidon de maïs, sucre granulé 850 µ, eudragit L100 55, dioxyde de titane, silice colloïdale anhydre, pellets d'hydroxyde de calcium.

Cortancyl® 20 mg

Prednisone

Comprimé sécable



Veuillez lire attentivement les informations importantes pour ce médicament.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, parlez-en à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être donné pas à d'autres personnes, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

45,80

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.

- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...). Nez l'enfant de moins de 6 ans car il peut valer de travers le comprimé et s'étouffer.
- Précautions et précautions**
Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale. Avant le traitement, prévenez votre médecin :
 - Si vous avez été vacciné récemment.
 - Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin.
 - Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée.
 - Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose).
 - Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement.
 - Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).
 - Si vous avez séjourné dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire,
 - Si vous avez une maladie des glandes surrénales appelée Syndrome de Cushing.
 - Si vous avez des problèmes rénaux ou un taux élevé d'acide urique dans votre sang avant de commencer le traitement par CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable. Vous devez informer votre médecin si vous présentez des symptômes du syndrome de lyse tumorale tels que crampes musculaires, faiblesse musculaire, confusion, perte de vision ou troubles visuels, essoufflement, convulsions, rythme cardiaque irrégulier ou insuffisance rénale (diminution de la quantité d'urine ou assombrissement de l'urine) au cas où vous souffririez d'une tumeur maligne hématologique (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels »).
- Adressez-vous à votre médecin avant de prendre CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable si vous souffrez de :
- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale.

Cortancyl® 20 mg

Prednisone

Comprimé sécable



Veuillez lire att

ce médicamen
importantes p

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des symptômes ou votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être donné à d'autres personnes, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

45,80

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.

- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...). Nez l'enfant de moins de 6 ans car il peut valer de travers le comprimé et s'étouffer.
- **Précautions et précautions**
Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale. Avant le traitement, prévenez votre médecin : si vous avez été vacciné récemment, si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin, si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée, si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose), si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement, si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire), si vous avez séjourné dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire, si vous avez une maladie des glandes surrénales appelée Syndrome de Cushing, si vous avez des problèmes rénaux ou un taux élevé d'acide urique dans votre sang avant de commencer le traitement par CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable. Vous devez informer votre médecin si vous présentez des symptômes du syndrome de lyse tumorale tels que crampes musculaires, faiblesse musculaire, confusion, perte de vision ou troubles visuels, essoufflement, convulsions, rythme cardiaque irrégulier ou insuffisance rénale (diminution de la quantité d'urine ou assombrissement de l'urine) au cas où vous souffririez d'une tumeur maligne hématologique (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels »). Adressez-vous à votre médecin avant de prendre CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable si vous souffrez de :
 - Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale

Cortancyl® 20 mg

Prednisone

Comprimé sécable



Veuillez lire att

ce médicamen
importantes p

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des symptômes ou votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être donné à d'autres personnes, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

45,80

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.

- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...). Nez l'enfant de moins de 6 ans car il peut valer de travers le comprimé et s'étouffer.
- **Précautions et précautions**
Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale. Avant le traitement, prévenez votre médecin : si vous avez été vacciné récemment, si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin, si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée, si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose), si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement, si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire), si vous avez séjourné dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire, si vous avez une maladie des glandes surrénales appelée Syndrome de Cushing, si vous avez des problèmes rénaux ou un taux élevé d'acide urique dans votre sang avant de commencer le traitement par CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable. Vous devez informer votre médecin si vous présentez des symptômes du syndrome de lyse tumorale tels que crampes musculaires, faiblesse musculaire, confusion, perte de vision ou troubles visuels, essoufflement, convulsions, rythme cardiaque irrégulier ou insuffisance rénale (diminution de la quantité d'urine ou assombrissement de l'urine) au cas où vous souffririez d'une tumeur maligne hématologique (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels »). Adressez-vous à votre médecin avant de prendre CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable si vous souffrez de :
 - Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale