

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

296677

M23- N° 0031340

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 50049

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Dr. KHAIDOUR

ABOU OBIADA

Date de naissance : 01/01/1934

Adresse : DR. KHAIDOUR 501 n° 376

Hau HASSANI

Tél. : 06341599821

Total des frais engagés : 1229,26 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : ... Age : ...

Lien de parenté :  Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : ...

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie : ...

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : ...

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ...

Le : ... / ... / ...

Signature de l'adhérent(e) : ...

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant la réalisation des Actes
14/02/24	cr	9	510,00 Av 2 Mars Hadjeb Casablanca - Tél. 022 21 012 50.13.50 - Fax: 022 21	Dr. Khalid DAAUDI Anesthésiste - Réanimateur Clinique AIR Chock
15/02/24	cr	6	322,22 88 / 02 21 Avenue 2 Mars Hadjeb Casablanca - Tél. 022 21 012 50.13.50 - Fax: 022 21	Dr. Khalid DAAUDI Anesthésiste - Réanimateur Clinique AIR Chock

EXECUTION DES ORDONNANCES 13.50 - Fax: 102 21.64.68

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<b>PHARMACIE AL BOUTANE</b> Hassan BELHOUTANE 580, Bd Ibn Sina Derb El Wida Hay Hassani - CASABLANCA Tél <b>092004413</b>	<b>09/02/2021</b> <b>55</b> <b>16 0522 212188</b> <b>Fat 022 110408</b>	<b>573,20</b>

## ANALYSES - RADIOPHARMACEUTICALS

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>RDC Hamm, 828 01-05-22 8:22 21</i> <i>LABORATORY</i>	<i>31/04/24</i>	<i>B 140</i>	<i>178,00</i>
	<i>31/04/24</i>	<i>B350</i>	<i>478,00</i>

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412   21433552 00000000   00000000 D 00000000   00000000 B 35533411   11433553	G	MONTANTS DES SOINS
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



# Clinique Ain Chock

## CLINIQUE AIN CHOCH

### ORDONNANCE

Abdo OB/GYN  
Lamaze

Casablanca, le

29/02/2004

$$143,30 \times 4 = 573,20.$$

No 4 x 200  
♂

143.30

Aug x 21

Après Dimanche

---

$$T = 573,20.$$

  
PHARMACIE AL BOUSTANE  
Honora HELIOCINE  
580, Bd Ibn Sina Derb El Wida  
Hay Hassani - CASABLANCA  
Tel: 05 22 50 13 50

CLINIQUE AIN CHOCH  
510, Avenue 2 Mars Haddaouia  
Tél: 0522 212188 / 0522 216468  
Fax: 0522 216468 Casablanca

Docteur Khalid DAGUDI  
Anesthésiste - Réanimateur  
510, AV 2 Mars Haddaouia II  
Casablanca - Tél: 022 212188  
022 50.13.50 - Fax: 022 212188

الحمد لله رب العالمين

وأنزل الإبرة مرتين في الرؤم

الحمد لله رب العالمين

# Novex®

## Solution injectable. Enoxaparine sodique

Veuillez lire attentivement l'intégralité d'informations importantes pour vous. Gardez cette notice, vous pourriez avoir une autre question, demander à votre pharmacien ou à votre infirmière. Ceci s'applique à tout effet.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Novex 2000 UI anti-Xa/0,2 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, utilisés ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

3. Comment utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Novex 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie et dans quels sont-ils utilisés ?

### Classe pharmacothérapeutique

ANTI-THROMBOTIQUES, groupe de l'héparine - code ATC : B01AB05

NOVEX contient une substance active appelée énoxaparine sodique qui est une héparine de bas poids moléculaire (HBPM).

NOVEX agit de deux façons.

1) En empêchant les caillots sanguins existants de grossir. Cela permet à votre organisme de les désagréger de les empêcher de vous nuire.

2) En empêchant la formation de nouveaux caillots sanguins dans votre sang.

NOVEX peut être utilisé pour :

- Traiter les caillots sanguins dans votre sang ;
- Empêcher la formation de caillots sanguins dans votre sang dans les cas suivants :
  - Avant et après une intervention chirurgicale ;
  - Lorsque vous êtes atteint(e) d'une maladie aigüe et que vous êtes en période de mobilité réduite ;
  - Lorsque vous présentez un angor instable (dans lequel votre cœur reçoit une quantité insuffisante de sang) après un infarctus du myocarde ;
  - Empêcher la formation de caillots sanguins dans les circuits de l'appareil pour dialyse (utilisée pour personnes atteintes d'une maladie rénale grave).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

N'utilisez jamais NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à :
  - l'énoxaparine sodique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans rubrique 6),
  - l'héparine ou d'autres héparines de bas poids moléculaire, telles que la nadroparine, la tinzaparine ou dalteparine.

Les signes de réaction allergique comprennent : éruption cutanée, difficulté à respirer ou à avaler, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la gorge ou de la langue.

- si vous avez eu une réaction à l'héparine ayant entraîné une diminution importante du nombre de vos cellules de la coagulation (plaquettes) – cette réaction est appelée thrombocytopénie induite par l'héparine - au cours des 100 derniers jours,

- si vous présentez des anticorps dirigés contre l'énoxaparine dans votre sang,

- si vous saignez abondamment ou vous êtes atteint(e) d'une affection associée à un risque élevé de saignement tel que :

- un ulcère de l'estomac, une chirurgie récente du cerveau ou des yeux ou un accident vasculaire cérébral hémorragique récent.

- vous utilisez NOVEX pour traiter des caillots sanguins et devez faire l'objet dans les 24 heures :

- d'une ponction spinale ou lombaire.

- d'une intervention chirurgicale avec une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale.

N'utilisez pas NOVEX si l'un ou l'autre des cas ci-dessus vous concerne. Si vous n'êtes pas sûr(e), parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NOVEX.

### Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

NOVEX ne doit pas être remplacé par d'autres médicaments appartenant au groupe des HBPM. Cela est dû au fait que les HBPM ne sont pas exactement identiques et n'ont pas la même activité, ni les mêmes instructions d'utilisation.

Consultez votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NOVEX si :

- Vous avez déjà eu une réaction à l'héparine ayant causé une diminution importante du nombre de plaquettes.

- Vous allez recevoir une anesthésie rachidienne ou péridurale ou une ponction lombaire (voir "interventions chirurgicales et anesthésique") : un délai doit être respecté entre l'utilisation de NOVEX et cette intervention.

2000 UI Anti-Xa/0,2 ml,  
6 ml,  
4 ml,

Novex®

6000 UI anti-Xa/0,6 ml  
2 seringues pré-remplies de solution injectable  
AMM N° : 24/2020/DMP/21/INRQDNM

6 118000 021919

143,30

# Novex®

## Solution injectable. Enoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement l'intégralité informations importantes pour vous

Gardez cette notice, vous pourriez avoir  
Si vous avez toute autre question, demandez  
Ce médicament vous a été personnellement  
symptômes identiques, cela pourrait lui  
Si vous ressentez un quelconque effet  
infirmier. Ceci s'applique à tout effet.

2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 6 ml, 4 ml,  
Novex® Remboursable AMO  
6000 UI anti-Xa/0,6 ml 2 seringues pré-remplies de solution injectable  
AMM N° : 24/2020/DMP/21/INRQDNM

6 118000 021919

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Novex 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, utilisés ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

3. Comment utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Novex 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie et dans quels sont-ils utilisés ?

### Classe pharmacothérapeutique

ANTI-THROMBOTIQUES, groupe de l'héparine – code ATC : B01AB05

NOVEX contient une substance active appelée énoxaparine sodique qui est une héparine de bas poids moléculaire (HBPM).

NOVEX agit de deux façons.

1) En empêchant les caillots sanguins existants de grossir. Cela permet à votre organisme de les désagréger de les empêcher de vous nuire.

2) En empêchant la formation de nouveaux caillots sanguins dans votre sang.

NOVEX peut être utilisé pour :

- Traiter les caillots sanguins dans votre sang ;
- Empêcher la formation de caillots sanguins dans votre sang dans les cas suivants :
  - Avant et après une intervention chirurgicale ;
  - Lorsque vous êtes atteint(e) d'une maladie aigüe et que vous êtes en période de mobilité réduite ;
  - Lorsque vous présentez un angor instable (dans lequel votre cœur reçoit une quantité insuffisante de sang) après un infarctus du myocarde ;
  - Empêcher la formation de caillots sanguins dans les circuits de l'appareil pour dialyse (utilisée pour personnes atteintes d'une maladie rénale grave).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

N'utilisez jamais NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à :
  - l'énoxaparine sodique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans rubrique 6),
  - l'héparine ou d'autres héparines de bas poids moléculaire, telles que la nadroparine, la tinzaparine ou dalteparine.

Les signes de réaction allergique comprennent : éruption cutanée, difficulté à respirer ou à avaler, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la gorge ou de la langue.

- si vous avez eu une réaction à l'héparine ayant entraîné une diminution importante du nombre de vos cellules de la coagulation (plaquettes) – cette réaction est appelée thrombocytopénie induite par l'héparine - au cours des 100 derniers jours,

- si vous présentez des anticorps dirigés contre l'énoxaparine dans votre sang,

- si vous saignez abondamment ou vous êtes atteint(e) d'une affection associée à un risque élevé de saignement tel que :

- un ulcère de l'estomac, une chirurgie récente du cerveau ou des yeux ou un accident vasculaire cérébral hémorragique récent.

- vous utilisez NOVEX pour traiter des caillots sanguins et devez faire l'objet dans les 24 heures :

- d'une ponction spinale ou lombaire,

- d'une intervention chirurgicale avec une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale.

N'utilisez pas NOVEX si l'un ou l'autre des cas ci-dessus vous concerne. Si vous n'êtes pas sûr(e), parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NOVEX.

### Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

NOVEX ne doit pas être remplacé par d'autres médicaments appartenant au groupe des HBPM. Cela est dû au fait que les HBPM ne sont pas exactement identiques et n'ont pas la même activité, ni les mêmes instructions d'utilisation.

Consultez votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NOVEX si :

- Vous avez déjà eu une réaction à l'héparine ayant causé une diminution importante du nombre de plaquettes.
- Vous allez recevoir une anesthésie rachidienne ou péridurale ou une ponction lombaire (voir "interventions chirurgicales et anesthésique") : un délai doit être respecté entre l'utilisation de NOVEX et cette intervention.

# Novex®

## Solution injectable. Enoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement l'intégralité informations importantes pour vous

Gardez cette notice, vous pourriez avoir  
Si vous avez toute autre question, demandez  
Ce médicament vous a été personnellement  
symptômes identiques, cela pourrait lui  
Si vous ressentez un quelconque effet  
infirmier. Ceci s'applique à tout effet.

2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 6 ml, 4 ml,  
Novex® Remboursable AMO  
6000 UI anti-Xa/0,6 ml 2 seringues pré-remplies de solution injectable  
AMM N° : 24/2020/DMP/21/INRQDNM

6 118000 021919

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Novex 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, utilisés ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

3. Comment utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Novex 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie et dans quels sont-ils utilisés ?

### Classe pharmacothérapeutique

ANTI-THROMBOTIQUES, groupe de l'héparine – code ATC : B01AB05

NOVEX contient une substance active appelée énoxaparine sodique qui est une héparine de bas poids moléculaire (HBPM).

NOVEX agit de deux façons.

1) En empêchant les caillots sanguins existants de grossir. Cela permet à votre organisme de les désagréger de les empêcher de vous nuire.

2) En empêchant la formation de nouveaux caillots sanguins dans votre sang.

NOVEX peut être utilisé pour :

- Traiter les caillots sanguins dans votre sang ;
- Empêcher la formation de caillots sanguins dans votre sang dans les cas suivants :
  - Avant et après une intervention chirurgicale ;
  - Lorsque vous êtes atteint(e) d'une maladie aigüe et que vous êtes en période de mobilité réduite ;
  - Lorsque vous présentez un angor instable (dans lequel votre cœur reçoit une quantité insuffisante de sang) après un infarctus du myocarde ;
  - Empêcher la formation de caillots sanguins dans les circuits de l'appareil pour dialyse (utilisée pour personnes atteintes d'une maladie rénale grave).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

N'utilisez jamais NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à :
  - l'énoxaparine sodique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans rubrique 6),
  - l'héparine ou d'autres héparines de bas poids moléculaire, telles que la nadroparine, la tinzaparine ou dalteparine.

Les signes de réaction allergique comprennent : éruption cutanée, difficulté à respirer ou à avaler, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la gorge ou de la langue.

- si vous avez eu une réaction à l'héparine ayant entraîné une diminution importante du nombre de vos cellules de la coagulation (plaquettes) – cette réaction est appelée thrombocytopénie induite par l'héparine - au cours des 100 derniers jours,

- si vous présentez des anticorps dirigés contre l'énoxaparine dans votre sang,

- si vous saignez abondamment ou vous êtes atteint(e) d'une affection associée à un risque élevé de saignement tel que :
  - un ulcère de l'estomac, une chirurgie récente du cerveau ou des yeux ou un accident vasculaire cérébral hémorragique récent,

- vous utilisez NOVEX pour traiter des caillots sanguins et devez faire l'objet dans les 24 heures :
  - une ponction spinale ou lombaire,

- d'une intervention chirurgicale avec une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale.

N'utilisez pas NOVEX si l'un ou l'autre des cas ci-dessus vous concerne. Si vous n'êtes pas sûr(e), parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NOVEX.

### Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

NOVEX ne doit pas être remplacé par d'autres médicaments appartenant au groupe des HBPM. Cela est dû au fait que les HBPM ne sont pas exactement identiques et n'ont pas la même activité, ni les mêmes instructions d'utilisation.

Consultez votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NOVEX si :

- Vous avez déjà eu une réaction à l'héparine ayant causé une diminution importante du nombre de plaquettes.
- Vous allez recevoir une anesthésie rachidienne ou péridurale ou une ponction lombaire (voir "interventions chirurgicales et anesthésique") : un délai doit être respecté entre l'utilisation de NOVEX et cette intervention.

# Novex®

## Solution injectable. Enoxaparine sodique

### Veuillez lire attentivement l'intégralité informations importantes pour vous

Gardez cette notice, vous pourriez avoir  
Si vous avez toute autre question, demandez  
Ce médicament vous a été personnellement  
symptômes identiques, cela pourrait lui  
Si vous ressentez un quelconque effet  
infirmier. Ceci s'applique à tout effet.

2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 6 ml, 4 ml,  
Novex® Remboursable AMO  
6000 UI anti-Xa/0,6 ml 2 seringues pré-remplies de solution injectable  
AMM N° : 24/2020/DMP/21/INRQDNM

6 118000 021919

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Novex 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, utilisés ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

3. Comment utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Novex 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie et dans quels sont-ils utilisés ?

### Classe pharmacothérapeutique

ANTI-THROMBOTIQUES, groupe de l'héparine – code ATC : B01AB05

NOVEX contient une substance active appelée énoxaparine sodique qui est une héparine de bas poids moléculaire (HBPM).

NOVEX agit de deux façons.

1) En empêchant les caillots sanguins existants de grossir. Cela permet à votre organisme de les désagréger de les empêcher de vous nuire.

2) En empêchant la formation de nouveaux caillots sanguins dans votre sang.

NOVEX peut être utilisé pour :

- Traiter les caillots sanguins dans votre sang ;
- Empêcher la formation de caillots sanguins dans votre sang dans les cas suivants :
  - Avant et après une intervention chirurgicale ;
  - Lorsque vous êtes atteint(e) d'une maladie aigüe et que vous êtes en période de mobilité réduite ;
  - Lorsque vous présentez un angor instable (dans lequel votre cœur reçoit une quantité insuffisante de sang) après un infarctus du myocarde ;
  - Empêcher la formation de caillots sanguins dans les circuits de l'appareil pour dialyse (utilisée pour personnes atteintes d'une maladie rénale grave).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie ?

N'utilisez jamais NOVEX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, 8000 UI anti-Xa/0,8 ml et 10000 UI anti-Xa/1 ml, solutions injectables en seringue préremplie dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à :
  - l'énoxaparine sodique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans rubrique 6),
  - l'héparine ou d'autres héparines de bas poids moléculaire, telles que la nadroparine, la tinzaparine ou dalteparine.

Les signes de réaction allergique comprennent : éruption cutanée, difficulté à respirer ou à avaler, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la gorge ou de la langue.

- si vous avez eu une réaction à l'héparine ayant entraîné une diminution importante du nombre de vos cellules de la coagulation (plaquettes) – cette réaction est appelée thrombocytopénie induite par l'héparine - au cours des 100 derniers jours,

- si vous présentez des anticorps dirigés contre l'énoxaparine dans votre sang,

- si vous saignez abondamment ou vous êtes atteint(e) d'une affection associée à un risque élevé de saignement tel que :

- un ulcère de l'estomac, une chirurgie récente du cerveau ou des yeux ou un accident vasculaire cérébral hémorragique récent.

- vous utilisez NOVEX pour traiter des caillots sanguins et devez faire l'objet dans les 24 heures :

- d'une ponction spinale ou lombaire,

- d'une intervention chirurgicale avec une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale.

N'utilisez pas NOVEX si l'un ou l'autre des cas ci-dessus vous concerne. Si vous n'êtes pas sûr(e), parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NOVEX.

### Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

NOVEX ne doit pas être remplacé par d'autres médicaments appartenant au groupe des HBPM. Cela est dû au fait que les HBPM ne sont pas exactement identiques et n'ont pas la même activité, ni les mêmes instructions d'utilisation.

Consultez votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NOVEX si :

- Vous avez déjà eu une réaction à l'héparine ayant causé une diminution importante du nombre de plaquettes.

- Vous allez recevoir une anesthésie rachidienne ou péridurale ou une ponction lombaire (voir "interventions chirurgicales et anesthésique") : un délai doit être respecté entre l'utilisation de NOVEX et cette intervention.



مصحة عين الصقور  
CLINIQUE AIN CHOCK

Abou o bida

14/24/24

ORDONNANCE

Casablanca, le


14/24/24

BB. TNR

TAC LABORATOIRE HAY HASSANI  
Dr. Samira BENBRAHIM  
Biologiste

RDC Imme 828 Bd. Ibn Sina Hay Hassani  
Tél: 05 289 69 87 - 05 22 93 32 21  
Fax: 05 22 99 69 88

gras pycn



Docteur Khalid DAGUDE  
Anesthésiste - Réanimateur  
510, Av 2 Mars Haddaouia  
Casablanca - Tél: 022 21 21 88  
022 50.13.50 - Fax: 022 21 51 32



Dr. Samira BENBRAHIM  
 Pharmacien Biologiste  
 Diplôme Université Paris Descartes  
 DU Assurance de la qualité en biologie médicale  
 DU Audit qualité en biologie médicale

**مختبر التحاليل الطبية**  
**الحي الحسني**

Casablanca, le : 14/02/2024

Dossier N° : 140224-035



**Nom : Mme ABOU OBIDA Khaddouj**

**Code Patient : 18-02359 Prélèvement du: 14/02/2024 09:39:**

**Demandé par Dr : CLINIQUE AIN CHOCK**

## Compte rendu d'analyses

Page : 1 / 1

### ANALYSES D'HEMATOLOGIE

**Valeurs Usuelles**

#### GROUPAGE SANGUIN ABO ET RHESUS

Attention: Ce résultat de groupe et rhésus, ne doit pas être considéré comme définitif qu'après une deuxième détermination effectuée sur un **second** prélèvement

Groupe Sanguin ABO : O  
 Rhésus (D) : Positif

### ANALYSES D'HEMOSTASE-COAGULATION

**Valeurs Usuelles**

#### SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DES TRAITEMENTS PAR LES AVK

Taux de prothrombine : 100 %  
 INR : 1,0

##### Indications

##### TP

##### INR

-Prévention et traitement des thromboses Veineuses et des embolies pulmonaires.  
 -Prévention des embolies systémiques.

- Valve cardiaque mécanique  
 - Embolies systémiques récidivantes.

#### TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN

Témoin : 28,90 sec.  
 Patient : 31,10 sec. (+ / - 10 s)

*LABORATOIRE HAY HASSANI  
 Dr. Samira BENBRAHIM  
 Biologiste  
 RUE 228 Bd. Ibn Sina Hay Hassani  
 Casablanca 20969 87 / 05 22 93 32 21  
 Tél. : 05 22 89 69 88 / 05 22 89 69 88  
 Fax : 05 22 89 69 88*

Immeuble B28, RDC N° 1, Boulevard Ibn Sina, Hay Hassani - Casablanca ( à coté dar El Hamra)  
 Tél. : 05 22 89 69 87 / 05 22 93 32 21 - Fax : 05 22 89 69 88

# LABORATOIRE HAY HASSANI

D'analyses Médicales et Biologiques

Immeuble B28, RDC N° 1, Bd. Ibn Sina - Hay Hassani - Casablanca

## Facture

Facture N°: 2024-001112

Date 14/02/2024

Patient Mme ABOU OBIDA Khaddouj

Date Prélèvement : 14/02/2024

Analyses	Valeur en B	Montant
Surveillance biologique des traitements sous AVK	40	48,00
TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN	40	48,00
GROUPAGE SANGUIN ABO ET RHESUS	60	72,00
<b>Total B</b>	140	168,00
<b>APB</b>	1,0	10,00
<b>Majoration de garde</b>		
<b>Total</b>		178,00

Note d'honoraire: Cent soixante-dix-huit dirhams\*\*\*

Dr. Samira BENBRAHIM  
Biologiste  
RDC Imm. 828 Bd. Ibn Sina Hay Hassani  
Tel : 05 22 89 69 87 / 05 22 93 32 21  
Fax : 05 22 89 69 87