

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

Nº P19-0041780

197488

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 10000 802

Société :

Actif

Pensionné[e]

Autre :

Nom & Prénom : Hajji Aïcha

Dech'hur Bouazza

Date de naissance :

Adresse : 01/01/2041

Tél. : 06.30.44.2.589

Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

13/02/2021

Nom et prénom du malade :

Hajji Aïcha

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :


arthrose

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :



Le : 13/02/2021

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/02/2021			CS 15.000	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Hay JAHAL SANTÉ Mohammed Derby Adil Casablanca	13.02.2020	836.60

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	14/02/2014	B604	90,40

## AUXILIAIRES MEDICAUX

#### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

#### **[Création, remont, adjonction]**



**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# ORDONNANCE

Fait le 13/02/2024

PHARMACIE SAINTE  
193 Avenue Derb Adel  
Hay Monachem  
Casablanca  
Tunisie  
Tunisie  
Tunisie  
Tunisie  
Tunisie

Hajji Aïda

113,70

+ Flanciphex 2as 1000 pdt les S.V.

+ hydrocortisone

58,50 x 3 a poser chaque S.V.

PHARMACIE FOUARAT SAINTE  
193 Avenue Derb Adel  
Hay Monachem  
Casablanca

pdt 1 semai

puis 1 apos 2 fois/ semain pdt 3ms

22,00

+ C'del Soas S.V. le lundi le soir

le m le jeudi le soir

149,50

+ Artiflex 2as pdt les

39,98 x 2

+ Natriodam

1,5 / 5mg S.V. 100 pdt 3ms

133.60

+ Diovenor 600

1 q + 3 1/2

82.50

+ Venoxyl crème

1 app + 3 1/2

836.60



PHARMACIE FOUARAT SANTÉ  
193 avenue Derb Adil  
Hay Mohammadi  
Casablanca

DR LAMRACH S.  
Médecin Généraliste  
Hay Adil, Rue 78, N° 14 - Hay Mohammadi  
Casablanca

# Bilan Biologique

Nom / Prénom : Hajji Aïcha

Age: .....

13/02/2024

Sexe:  H  F

## Bilan Hématologie

- NFS
- Plaquettes
- Hémoculture
- VS
- CRP

## Bilan Martial

- Fer Sérique
- CTF
- Ferritine

## Bilan Hémostase

- Temps de prothrombine
- TCK
- Fibrinogéne
- INR

## Groupage Sanguin

- Groupage + RHS

## Glucose

- Glycémie à jeun
- Hyperglycémie post-p
- Hémoglobine glyquée

## Bilan Lipidique

- Cholestérol Total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Tryglycérides

## Ionogramme Sanguin

- NA+
- Cl-
- K+
- Ca++
- Mg++
- Acide urique
- Phosphorémie
- Urée
- Créatinine

## Sérologie Immunologie

- VDRL-TPHA Qualitatif
- AgHBS
- B-HCG Plasmatique
- Sérologie Toxoplasmose
- Sérologie Chlamydia
- Sérologie Mycoplasme
- ALSO
- Facteur rhumatoide
- (Latex, Waaler Rose)
- Anticorps Anti-Nucléaires
- Anticorps Anti-DNA Natif
- Anticorps Anti-Sp
- Anticorps Anti-RNP
- Anticorps Anti-SCL 70
- Anticorps Anti-Ro (SSA)
- Dosage du complément
- CH50, C3, C4

## Examen des Urines

- ECBU
- Protéinurie de 24h
- Microalbuminurie
- Antibiogrammes
- Compte d'addis

## Ionogramme Urinaire

- Ca++
- Phosphore
- Urée
- Créatinine

## Fonction Hépatique et Enzymologie

- Bilirubine Libre et conjuguée
- Phosphatases Alcalines
- Transaminases ASAT ALAT
- Gamma -GT
- Lactate Désphydrogénase LDH
- CPK (creatine phosphokinase)
- Troponine
- Electrophorèse des protéines EPP
- Immo électro-phorèse des protéines

## Bilan Hormonal

- TSHs
- Ac Anti Thyroperoxydase
- Ac Anti Thyroglobuline
- Prolactinémie
- FSH / LH
- Testostérone Libre
- 17 OH Progestérone
- Delta 4 androstendione
- SDHAE

Autres : .....



# مختبر التحاليل الطبية لحزام الْكَبِير

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES GRANDE CEINTURE

للدكتور مرسلي عبد للطيف  
أخصائي في التحاليل الطبية

Dr. MOURSALI Abdellatif

Biologiste

Casablanca

Examen du : 14/02/2024

Heure Pvt : 9:16:00 Edité le : 14/02/2024

Mme HAJJI Aicha

Code Patient : 22-04636

Réf : 140224-039

### Compte rendu d'analyses

140224-039

Page : 1 / 1

#### HEMATOLOGIE

##### VITESSE DE SEDIMENTATION

Première heure : 36 mm

Valeurs Usuelles

Antériorité

21 (12/10/22)

##### Interprétation :

Selon la formule de Miller

Le seuil de la VS est :

\* Chez l'homme âge/2

\* Chez la femme (âge+10)/2

#### BIOCHIMIE

Créatinine

: 7,39 mg/l  
65,03  $\mu$ mol/l

Valeurs Usuelles  
( 5 - 11 )  
( 44 - 96,81 )

Antériorité  
7,44 (06/04/22)

### Dossier complet

Merci de votre confiance

*Le Biologi*

L.A. M. DR. M. GRANDE CEINTURE  
DR. ABDELLATIF MOURSALI  
Pharmacien Biologiste  
Res. Al Khair Etage 1 N° 118  
La Grande Ceinture A.M. Casablanca

Boulevard La grande Ceinture, Résidence El Khair, N° 118, 1ère Etage  
Hay El Mohammadi- Casablanca Tél : 05.22.63.86.22 - Fax : 05.22.63.86.22

## Facture

N° facture 2024-03434

Patient : Mme HAJJI Aicha

Date prélèvement : 14/02/2024

Analyses	Valeur en B	Montant
VITESSE DE SEDIMENTATION	30	40,20
Créatinine	30	40,20
	<b>Total B</b>	60,00
	<b>Total</b>	90,40

Arrêtée la présente facture à la somme de : QUATRE-VINGT-DIX DIRHAMS ET 40 CENTIMES \*\*\*

L.A.M. GRANDE CEINTURE  
DR. Abdellatif MOURBALI  
Pharmacien Biologiste  
Res. Al Khair Etage 1 N°118 Bd  
la Grande ceinture H. M. Casablanca

# hydroxo 5000

(Hydroxocobalamine base)

## FORMULE

Hydroxocobalamine base ..... 5000 µg  
pour une ampoule injectable de 2 ml.

L'Hydroxocobalamine, d'action intense et prolongée, permet d'obtenir imprégnation et stockage tissulaire.

D'autre part, l'emploi de doses massives s'est révélé actif dans le traitement de la plupart des syndromes algiques sévères.

## INDICATIONS

Algies : névralgies faciales, algies radiculaires, algies cervico-brachiales, etc.

et d'une façon générale les syndromes algiques intenses.

## POSOLOGIE

En moyenne : une ampoule par jour ou tous

Cette posologie peut être portée à deux am

sur indication du médecin traitant.

PPV: 113 DH 70

## PRÉSENTATION

Boîte de 4 ampoules de 2 ml.

Voie parentérale I.M.

**hydroxo**

HYDROXOCOBALAMINE BASE

PPV 580H50

**hydroxo**

HYDROXOCOBALAMINE BASE

PPV 580H50

**hydroxo**

HYDROXOCOBALAMINE BASE

PPV 580H50

# Cédol®

PARACETAMOL + CODEINE

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### COMPOSITION

Paracétamol .....	400,00 mg
Phosphate de codéine hémihydratée .....	20,00 mg
(Quantité correspondante en codéine base) .....	14,8 mg
Excipients q.s.p. .....	un comprimé.

### FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 20.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Système nerveux central)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:

- allergie connue au paracétamol ou à la codéine
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- Allaitement

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine  
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable.  
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

~~INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS~~

~~R~~ACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

~~ol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Assurer les doses maximales conseillées (cf. posologie).~~

~~22,00~~

# ARTIFLEX®

## 1. Pack size & presentation :

- Pack size of 45 capsules
- Pack size of 30 capsules

## 2. Composition :

Glucosamin (Extract of crustacean shells, Chondroitin (Extract of fish shells), root powder Harpagophytum, Medowsweet, Horsetail, vitamin B12, essangel (ginger,inulin), capsule cover : hydroxyl-propyl-methyl-cellulose.  
Vegetal capsules.

## Composition :

Ingredients	Active	dosage/2 capsules	D.R.A*/2 capsules
Extract of crustacean shells	Glucosamin	500 mg	-
Extract of fish shells	Chondroitin	150 mg	-
Harpagophytum	-	150 mg	-
Medowsweet powder	-	90 mg	-
Horsetail powder	-	90 mg	-
Vitamin B12	Cyanocobalamin	0,66 µg	66,6%

\* Daily Recommended Allowance

## 3. Proprieties :

ARTIFLEX® is a formulation that provides a balanced and powerful combination of these nutritional supplements :

- Glucosamin and Chondroitin are recognized as the leading supplements for maintenance of healthy joints.
- Harpagophytum and medowsweet are added for their inflammatory and analgesic properties.
- Horsetail allows natural mineralising property.
- Vitamin B12 is recognized for its arthritic and osteoporosis properties.

ARTIFLEX® improves joint flexibility and mobility.

## 4. Advice of usage :

Follow medical prescription.

Preferable during meals.

## 5. Cautions :

Do not use in case of allergy to

Do not use by pregnant or lact

Manufactured for FCV Laborato

Distributed by RAMO-PHARM

Dietary product is not a medici



# **VENOXYL**

## **GEL**

### **COMPOSITION :**

- Aqua
- Alcohol denat
- Carbomer
- Arachis Hypogaea
- Menthol
- Triethanolamine
- Benzophénone 4
- Cl 42090-
- Cl 19140

### **PROPRIETES :**

**VENOXYL GEL**, grâce à l'originalité de ses actions synergiques, lutte efficacement contre :

- \* lourdeur et pesanteur des jambes
- \* Sensation de chaleur des jambes
- \* Mauvaise circulation

**VENOXYL GEL** par son action décongestionnante apporte aux jambes fatiguées une sensation immédiate de fraîcheur, hydrate et redonne élasticité à la peau.

### **CONSEILS D'UTILISATION :**

- Prendre une noix de **VENOXYL GEL** pour chaque jambe dans le creux de votre main
- Étaler **VENOXYL GEL** en remontant de la cheville à la cuisse jusqu'à absorption complète du produit
- Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'appliquer **VENOXYL GEL** 2 fois par jour
- Convient à tous les types de peaux
- Ne tâche pas.

### **PRECAUTION D'EMPLOI :**

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois.

### **PRESENTATION :**

Tube de 40 ml

### **USAGE EXTERNE**

VF76 0526 **KYL**  
LOT PER

Prix

82.50

**ORATOIRES CARILENE**  
RUE du CHANT DES OISEAUX  
78360 MONTESSEN  
FRANCE

l'amlopipine.

L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. L'amlopipine est un inhibiteur calcique (appartenant à une classe thérapeutique appelée dihydropyridines), et agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement.

Chacun de ces deux principes actifs réduit la pression artérielle.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE NATRIXAM, COMPRIMÉ À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais NATRIXAM, comprimé à libération modifiée :

- si vous êtes allergique à l'indapamide ou à tout autre sulfamide (classe thérapeutique utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle), ou à l'amlopipine ou tout autre inhibiteur calcique (classe thérapeutique utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des rougeurs de la peau ou des difficultés à respirer.
- si vous avez une pression artérielle très basse (hypotension),
- si vous avez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable de fournir assez de sang à l'organisme),
- si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque,
- si vous avez
- si vous avez une encéphalopathie ou une pathologie h
- si vous avez

### Avertissement

Adressez-vous à votre pharmacien si vous avez l'une des conditions suivantes :

- si vous avez une insuffisance cardiaque, si elle est causée par un

14011124



6 118001 130184  
NATRIXAM 1,5 mg / 5 mg  
30 comprimés à libération modifiée  
PPV : 79.90 DH



se cardiaque,  
suffrez d'une  
née par une

le prendre  
ou avez eu  
du rythme  
e du cœur  
cœur),

- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde,
- si vous avez été sujet à des réactions de photosensibilité.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium, ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concerné par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

### Enfants et adolescents

NATRIXAM ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent.

**Autres médicaments et NATRIXAM, comprimé à libération modifiée**  
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### Évitez de prendre NATRIXAM :

- avec du lithium (utilisé pour traiter les troubles mentaux comme l'accès maniaque, la maladie maniaco-dépressive et la dépression récurrente) en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang,
- avec du dantrolène (perfusion pour les augmentations sévères de la température corporelle).

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- autres médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle,
- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex. : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, bretylium),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex. : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques (tels que amisulpride, sulpiride, sultopride, tiapride, halopéridol, dropéridol)),
- bêpridil (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphénanil (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- vincamine IV (utilisé dans le traitement des troubles cognitifs symptomatiques chez les personnes âgées, dont la perte de mémoire),

l'amlopipine.

L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. L'amlopipine est un inhibiteur calcique (appartenant à une classe thérapeutique appelée dihydropyridines), et agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement.

Chacun de ces deux principes actifs réduit la pression artérielle.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE NATRIXAM, COMPRIMÉ À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais NATRIXAM, comprimé à libération modifiée :

- si vous êtes allergique à l'indapamide ou à tout autre sulfamide (classe thérapeutique utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle), ou à l'amlopipine ou tout autre inhibiteur calcique (classe thérapeutique utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des rougeurs de la peau ou des difficultés à respirer.
- si vous avez une pression artérielle très basse (hypotension),
- si vous avez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable de fournir assez de sang à l'organisme),
- si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque,
- si vous avez
- si vous avez une encéphalopathie ou une pathologie h
- si vous avez

### Avertissement

Adressez-vous à votre pharmacien si vous avez l'une des conditions suivantes :

- si vous avez une insuffisance cardiaque, si elle est causée par un

14011124



6 118001 130184  
NATRIXAM 1,5 mg / 5 mg  
30 comprimés à libération modifiée  
PPV : 79.90 DH



se cardiaque,  
suffrez d'une  
née par une

le prendre  
ou avez eu  
du rythme  
e du cœur  
cœur),

- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde,
- si vous avez été sujet à des réactions de photosensibilité.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium, ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concerné par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

### Enfants et adolescents

NATRIXAM ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent.

### Autres médicaments et NATRIXAM, comprimé à libération modifiée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### Évitez de prendre NATRIXAM :

- avec du lithium (utilisé pour traiter les troubles mentaux comme l'accès maniaque, la maladie maniaco-dépressive et la dépression récurrente) en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang,
- avec du dantrolène (perfusion pour les augmentations sévères de la température corporelle).

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- autres médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle,
- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex. : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, bretylium),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex. : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques (tels que amisulpride, sulpiride, sultopride, tiapride, halopéridol, dropéridol)),
- bêpridil (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphénanil (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- vincamine IV (utilisé dans le traitement des troubles cognitifs symptomatiques chez les personnes âgées, dont la perte de mémoire),

# DIOVENOR® 600 mg

DIOSMINE

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

## **COMPOSITION**

### **Principe actif :**

Diosmine (quantité exprimée en diosmine anhydre et pure) ..... 600 mg

**Excipients :** talc, silice colloïdale anhydre, acide stéarique micronisé, hypromellose, cellulose microcristalline, stéarate de macrogol 400, propyléneglycol, dioxyde de titane, laque aluminique de rouge cochenille A, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, cire de carnauba, cire d'abeille, gomme laque, alcool éthylique à 95°. Pour un comprimé pelliculé.

## **FORME PHARMACEUTIQUE**

Comprimé pelliculé (boîte de 30)

## **CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE**

VASCULOPROTECTEUR / MÉDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES (système cardiovasculaire).

## **DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT**

Ce médicament est un veinotonique (*il augmente la tonicité des parois veineuses*) et un vasculoprotecteur (*il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins*).

Il est préconisé dans :

- les troubles de la circulation veineuse (*jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites impatiences lors du coucher*)
- la crise hémorroïdaire.

## **ATTENTION !**

## **DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT**

Ce médicament est généralement déconseillé pendant l'allaitement.

Allergie connue à l'un des composants.

## **MISES EN GARDE SPÉCIALES**

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux ne diminuent pas en 15 jours, consultez votre médecin.

Si les troubles hémorroïdaires persistent après quelques jours de traitement, il est indispensable de consulter votre médecin.

## **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Il est associé à une bonne hygiène de vie, station debout prolongée, l'excès de poids. Port de bas adaptés favorisent la circulation

## **ET AUTRES INTERACTIONS**

INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS  
TIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT

133,60

40000261-01