

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- 0040138

197412

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : Société : Royal Air Maroc

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : BACHARI Soud

Date de naissance : 26-12-1961

Adresse : NR 31 Rue Sidi Msahel Chouaïb El Meïdah

Settat

Tél. : 0696075447 Total des frais engagés : 767,20 - Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin: Dr. Mostafa NANINE Médecin ECHIOGRAPHISTE INPE 061073680

Date de consultation : 22/02/2024

Nom et prénom du malade : BACHARI Soud Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Hematurie + Systole aigüe

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 04/03/2024

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22.02.2024	C	1	150000	LE NINH PHISTE

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie PAM El Settafa BOUDLAL Rue My Slimane - Hay Pam Tel : 05 23 40 35 58 - Settat Inpe : 062048079	22/02/24 062048079	Tel : 05 23 40 35 58 - Settat 37, Rue My Slimane - Hay Pam EMOSMATE BOUDLAL Pharmacie PAM 267,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
IRF. ZATM Unasys Médicales & Scientifiques 14000 Paris	22/02/23	8.300	4105€

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE $ \begin{array}{r} H \qquad \qquad \qquad 21433552 \\ 25533412 \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ \hline D \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ 00000000 \qquad \qquad \qquad 35533411 \\ \hline B \qquad \qquad \qquad 11433553 \end{array} $ <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>		Coefficient des travaux
				
				Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution

Docteur Mostafa HANINE

الدكتور المصطفى حنين

Diplômé de la Faculté Montpellier 1

Faculté de Médecine

Ultrasonographie

ECHOGRAPHIE GENERALE

ABDOMEN

GYNECO OBSTETRIQUE

CARDIO VASCULAIRE

TISSUS SUPERFICIELS

Médecin Expert près des Tribunaux

خريج جامعة مونبولي 1

كلية الطب

الفحص بالتموجات الصوتية

الأمراض الباطنية

أمراض النساء والولادة

أمراض القلب والأوعية الدموية

أمراض الأنسجة العليا

خبير مقبول لدى المحاكم

Settat, le 26.02.2024 سطات، في

Mr BACHIRI SADI

74,80

131 RUE MY SLIMANE - HAY PAM
Tél : 05 23 40 35 58 - Settat
Inpc : 062040079

26,50

12 Catex 50ml 10
1.1.1 emulsion
drogue 250

1.1.1
30 ml
abc
lyparin

T = 26,50
macie PAM
37, Rue My Slimane - Hay Pam
Tél : 05 23 40 35 58 - Settat
Inpc : 062040079

LABORATOIRE PASTEUR

ANALYSES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES

مختبر باستور للتحليلات الطبية و العلمية

Prélèvement à domicile, Ouverture de 07h30 à 19h30



Dr. Bachir HATIM

Médecin Biogiste

- Biochimie, Hématologie
- Virologie, Bactériologie
- Parasitologie, Mycologie
- Immunologie, Hormonologie
- Toxicologie
- Biologie de la reproduction

Docteur Mostafa HANINE

Dossier ouvert le : 22/02/24

Edition du : 22/02/24

Prélèvement effectué à 11:21 le 22 février 2024

Né (e) le : 26-12-1961

Monsieur BACHARI SAID

Réf. : 24B2425

Page : 1/1

MARQUEURS

PSA Total -----: 42,99 ng/ml

(Tech. Chimiluminescence COBAS 6000)

Le toucher rectal, le massage prostatique, une cystoscopie, une échographie transrectale, une biopsie, augmentent transitoirement le taux de PSA.

Valeurs Usuelles en ng/ml:

Age (ans)

<40	: <1,4
40-50	: <2,0
50-60	: <3,1
60-70	: <4,1
>70	: <4,4

LABORATOIRE PASTEUR
SETTAT
Analyses Médicales et Scientifiques
Dr. Bachir HATIM
Médecin Biogiste

Urgences - 7J/7

Patente n°: 40100296. IF (IGR) n°: 40467516. CNSS n°: 9366487.

ICE n°: 001626532000095. INPE: 063060800

LABORATOIRE PASTEUR
ANALYSES MEDICALES & SCIENTIFIQUES

Docteur B. HATIM
Médecin Spécialiste en Analyses Médicales



20, Boulevard Hassan II - SETTAT
Tél.: 05 23 40 27 27 / Email: labo.pasteur@yahoo.fr

Biochimie, Hématologie, Immunologie, Hormonologie, Bactériologie, Virologie, Parasitologie et Mycologie.

Settat le 22 février 2024

Monsieur BACHARI SAID

FACTURE N°	87795	
Analyses :		
PSA totale -----	B 300	Total : B 300
Prélèvements :		
Sang-----	Pc 1,5	
TOTAL DOSSIER		350,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Trois Cent Cinquante Dirhams

Dr B. HATIM
Analyses Médicales & Scientifiques
LABORATOIRE PASTEUR
Settat

- Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament;
- Si vous prenez de la tizandine.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec CATEX :

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre CATEX®, comprimés pelliculés.

Avant de prendre les comprimés, parlez-en à votre médecin dans les cas suivants :

- si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;
- si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;
- si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que CATEX ;
- si vous êtes diabétique car vous pourriez risquer de présenter une hypoglycémie avec la ciprofloxacine ;
- si vous souffrez de myopathie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) car les symptômes peuvent être exacerbés ;
- si vous avez des problèmes cardiaques. La ciprofloxacine doit être utilisée avec précaution si vous êtes né (e) avec ou si vous avez des antécédents familiaux d'allongement de l'intervalle QT (observé sur un tracé ECG, enregistrement du tracé électrique du cœur), si vous avez un déséquilibre électrolytique dans le sang (notamment un taux faible de potassium ou de magnésium dans le sang), si vous avez un rythme cardiaque très lent (appelé « bradycardie »), si vous avez un cœur affaibli (insuffisance cardiaque), si vous avez déjà eu une crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous avez déjà eu une crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme ou une personne âgée ou si vous prenez d'autres médicaments qui peuvent entraîner certaines anomalies de l'ECG.
- Si vous ou un membre de votre famille êtes atteint(e) d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car vous pourriez alors risquer de présenter une anémie avec la ciprofloxacine.
- Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de « rembrûnement » d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;
- Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;
- Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du sang conjoint comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, ou des troubles vasculaires connus comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behcet, l'hypertension artérielle ou une athérosclérose connue).
- Si vous ressentez une douleur soudaine et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, rendez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

Pour le traitement de certaines infections de l'appareil génital, votre médecin peut vous prescrire un autre antibiotique en association à CATEX. Si aucune amélioration des symptômes n'est observée après 3 jours de traitement, veuillez consulter votre médecin.

Pendant la prise de CATEX, comprimés pelliculés :

Prévenez immédiatement votre médecin si

- Réaction allergique sévère et immédiate (troubles cutanés) se produit pendant le traitement (par CATEX). Votre médecin déterminera si le traitement par CATEX doit être arrêté, se manifestant par la mort (réaction anaphylactique, œdème de Quincke). Dès la première dose, il existe un risque faible de survenue d'une réaction allergique sévère, pouvant se manifester par des symptômes d'oppression dans la poitrine, sensations vertigineuses, sensation de malaise ou de faiblesse, ou sensations vertigineuses lors du passage en dessous. Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre CATEX et contactez immédiatement votre médecin.
- Des douleurs ou gonflements des articulations. Une inflammation (une ou des tendinites) peuvent survenir occasionnellement, en particulier si vous êtes âgé(e) et si vous êtes également traité(e) par des médicaments. Une inflammation (une ou des tendinites) peuvent survenir occasionnellement, en particulier si vous êtes âgé(e) et si vous êtes également traité(e) par des médicaments. Une inflammation (une ou des tendinites) peuvent survenir dès les premières 48 heures de traitement et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt du traitement par CATEX. Au moindre signe de douleur ou d'inflammation des articulations ou des tendons, arrêtez de prendre ce médicament, contactez votre médecin et mettez la zone douloureuse au repos. Évitez tout effort musculaire car cela pourrait augmenter le risque de rupture des tendons.
- Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre maladie neurologique telle qu'une ischémie cérébrale ou un accident vasculaire cérébral, des effets indésirables neurologiques (crises convulsives) pourraient se produire. Si des crises convulsives surviennent, arrêtez CATEX et contactez immédiatement votre médecin.
- Vous pourrez présenter des symptômes évocateurs d'une neuropathie, tels que des douleurs, des brûlures, des picotements, un engourdissement et/ou une faiblesse musculaire. Si de tels symptômes surviennent, arrêtez ce médicament et contactez immédiatement votre médecin.
- Des réactions psychiatriques peuvent survenir dès la première prise de CATEX. Si vous souffrez de dépression ou de psychose, vos symptômes pourraient s'aggraver lors du traitement par ce médicament. Dans de rares cas, une dépression ou une psychose peut évoluer vers des pensées suicidaires, des tentatives de suicide ou un suicide. Si de telles réactions surviennent, contactez immédiatement votre médecin.
- Des cas d'hypoglycémie ont été rapportés le plus souvent chez des patients diabétiques, principalement dans la population âgée. Si cet effet indésirable survient, contactez immédiatement votre médecin.
- Une diarrhée peut se produire pendant la prise d'antibiotiques, y compris avec ce médicament, et même plusieurs semaines après la fin du traitement. Si la diarrhée devient sévère ou persiste ou si vous remarquez la présence de sang ou de mucus dans vos selles, arrêtez immédiatement de prendre CATEX et contactez immédiatement votre médecin, car votre vie pourrait être mise en danger. Ne prenez pas de médicaments destinés à bloquer ou ralentir le transit intestinal.
- Si votre vue se dégrade ou si vous ressentez un quelconque effet au niveau des yeux, consultez immédiatement un ophtalmologiste.
- Votre peau devient très sensible au soleil et aux rayons ultraviolets (UV) lorsque vous prenez CATEX. Évitez toute exposition prolongée au soleil ou aux rayons UV artificiels comme

- inflammation des intestins (colite) liée à l'utilisation d'antibiotiques (pouvant être fatale dans de très rares cas) ;
- réactions allergiques graves susceptibles de se manifester sous forme de :
 - réaction anaphylactique (pouvant se manifester par l'apparition d'une éruption cutanée, un angio-œdème, des difficultés à respirer) ;
 - choc anaphylactique (pouvant se manifester par l'apparition soudaine d'une respiration sifflante, un gonflement des lèvres, de la langue et de l'ensemble du corps, un évanouissement, des difficultés à avaler) ;
 - maladie sérique (pouvant se manifester par une fièvre, un gonflement, une éruption cutanée et une augmentation de volume des ganglions lymphatiques) ;
- troubles psychiatriques (réactions psychotiques pouvant conduire à des pensées suicidaires, à des tentatives de suicide ou à un suicide) ;
- pancréatite (inflammation du pancréas) à l'origine d'intenses douleurs dans le haut de l'estomac, souvent accompagnée de nausées et vomissements ;
- maladie du foie, y compris inflammation du foie (hépatite), destruction des cellules du foie (nécrose hépatique) aboutissant de façon très rare à une insuffisance hépatique pouvant mettre en jeu la vie du patient ;
- éruptions cutanées étendu caractérisée par des vésicules et un décollement de la peau autour de la bouche, du nez, des yeux, des organes génitaux ou sur l'ensemble du corps (par exemple, syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell qui sont potentiellement fataux) ;
- douleurs et/ou faiblesse musculaire, inflammation des articulations et douleurs articulaires, augmentation du tonus musculaire et crampes, inflammation ou rupture des tendons - en particulier de gros tendon situé à l'arrière de la cheville (tendon d'Achille); troubles associés au système nerveux tels que douleurs, brûlures, picotements, engourdissement et/ou faiblesse musculaire au niveau des extrémités;
- rythme cardiaque anormalement rapide, rythme cardiaque irrégulier mettant la vie en danger, rythme cardiaque modifié (appelé « allongement de l'intervalle QT », observé sur un ECG, enregistrement du tracé électrique du cœur) ;
- éruption cutanée caractérisée par des vésicules et une rougeur, s'accompagnant parfois de fièvre (pustulose exanthématique aigue généralisée) ;
- troubles de la vision incluant troubles de la vision des couleurs, une vision trouble ou vision double.

Veuillez informer votre médecin ou pharmacien si l'un des effets indésirables suivants devient grave ou persiste au-delà de quelques jours :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- nausées, diarrhée ;
- douleurs des articulations chez l'enfant.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- surinfections longiques (dûs à des champignons) ;
- concentration élevée des éosinophiles (une sorte de globules blancs) ;
- perte d'appétit (anorexie) ;
- hyperactivité, agitation ;
- maux de tête, étourdissements, troubles du sommeil, troubles du goût ;
- vomissements, douleurs abdominales, problèmes digestifs tels que des problèmes d'estomac (digestion/brûlures d'estomac) ou flatulences ;
- augmentation de la quantité de certaines substances dans le sang (transaminases et/ou bilirubine) ;
- éruption cutanée, démangeaisons, urticaire ;
- douleurs dans les muscles et les os, douleurs des articulations chez l'adulte ;
- altération de la fonction rénale ;
- sensation de fatigue générale (asthénie), fièvre ;
- élévation du taux de phosphatases alcalines sanguines (une substance présente dans le sang).

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

- modification du nombre des globules rouges ou de certains globules blancs (leucopénie, leucocytose, neutropénie, anémie), augmentation ou diminution des cellules présentes dans le sang servant à la coagulation sanguine (plaquettes) ;
- augmentation du taux de sucre dans le sang (hyperglycémie) ;
- confusion, désorientation, réactions d'anxiété, rêves étranges, hallucinations ;
- fourmillements, sensibilité inhabituelle, diminution de sensibilité de la peau, tremblements, crises convulsives, vertiges ;
- bourdonnements d'oreilles, troubles ou perte de l'audition ;
- accélération des battements cardiaques (tachycardie) ;
- dilatation des vaisseaux sanguins (vasodilatation), baisse de la pression artérielle, évanouissement ;
- essoufflement, y compris symptômes asthmatiques ;
- troubles hépatiques, jaunisse (ictère cholestastique), hépatite ;
- sensibilité à la lumière ;
- douleurs musculaires, inflammation des articulations, augmentation du tonus musculaire et crampes ;
- insuffisance rénale, présence de sels ou de cristaux dans les urines, inflammation des voies urinaires.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, contactez votre médecin.

Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que CATEX® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CATEX® ?
- 3- Comment prendre CATEX® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver CATEX® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE CATEX® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

CATEX® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoro-souches spécifiques de bactéries.

Indications thérapeutiques :

Chez l'adulte

CATEX® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires aiguës et bactériennes.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections de l'appareil urinaire chez l'homme et chez la femme.

- Infections urinaires aiguës et infections intra-abdominales.
- Infections gastro-intestinales.

- Infections de la peau et des tissus mous.

- Infections des os et des articulations.

- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.

- Exposition à la maladie du charbon.

CATEX® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (leucopénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique supplémentaire pourra vous être prescrit en complément de ce médicament.

Chez l'enfant et l'adolescent

CATEX® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyelonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

Ce médicament peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CATEX® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :



Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allez l'être, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Il est préférable d'éviter d'utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Ne prenez pas ce médicament pendant l'allaitement car la ciprofloxacine passe dans le lait maternel et pourrait nuire à la santé de votre enfant. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

Ce médicament peut abaisser votre niveau de vigilance. Des effets indésirables neurologiques peuvent se produire. Par conséquent, assurez-vous de savoir comment réagir à la conduite d'un véhicule ou à l'utilisation d'une machine. En cas de doute, parlez-en avec votre médecin.

Menées relatives aux excipients à effet notable

Sans objet.

3- COMMENT PRENDRE CATEX® ?

Instruction pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode d'emploi(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Votre médecin vous expliquera précisément quelle quantité de ce médicament vous devez prendre, à quelle fréquence et pendant combien de temps. Ceci dépendra du type d'infection et de sa sévérité.

Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux car la dose de médicament à prendre devra éventuellement être adaptée.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d'infection sévère. Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Vérifiez avec votre

médecin ou votre pharmacien si vous avez des doutes sur le nombre de comprimés de CATEX® à prendre ou la façon de les prendre.

a. Ayez les comprimés avec une grande quantité de boisson. Ne croquez pas les comprimés car ils ont mauvais goût.

b. Essayez de prendre les comprimés à peu près à la même heure chaque jour.

c. Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou en dehors des repas. Le calcium présent dans un repas n'a pas d'incidence grave sur l'effet du médicament. Cependant, ne prenez pas les comprimés de CATEX® avec des produits laitiers de type lait ou yaourt ou des jus de fruit enrichis (par ex. jus d'orange enrichi en calcium).

Pensez à boire abondamment pendant le traitement par ce médicament.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CATEX® que vous n'auriez dû :

Si vous avez dépassé la dose prescrite, consultez immédiatement votre médecin. Si possible, emportez les comprimés restants ou la boîte avec vous pour les montrer au médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre CATEX®

Prenez la dose oubliée dès que possible, puis continuez le traitement normalement.

Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée et continuez le traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la

dose que vous avez oublié de prendre. Veillez à suivre votre traitement jusqu'à la fin.

Attention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de suravage

Si vous arrêtez de prendre CATEX®

Il est important que vous suiviez le traitement jusqu'à la fin même si vous commencez à vous sentir mieux après quelques jours. Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, votre infection pourra ne pas être complètement guérie et les symptômes de l'infection pourraient réapparaître ou s'aggraver. Vous pourriez également développer une résistance bactérienne à ce médicament.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- D'QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Catezat® peut prendre ce médicament et contacter immédiatement votre médecin si vous présentez un des effets suivants. La fréquence de ces effets peut être rare (susceptible d'affecter jusqu'à 1 personne sur 1000), très rare (susceptible d'affecter jusqu'à 1 personne sur 10000) ou indéterminée (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- réaction allergique, accumulation de liquide dans l'organisme due à une réaction allergique profondément (éthème allergique), rapide gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la tête et des yeux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Dicynone®, comprimé ?

Ne prenez jamais Dicynone®, comprimé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'etamsylate) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé en raison de la présence d'amidon de blé.

Avertissements et précautions

- Ce médicament peut être administré en cas de maladie coeliaque. L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace. et est donc considéré comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie coeliaque.
- Ce médicament contient du « sulfite » et peut provoquer des réactions allergiques sévères et une gêne respiratoire.
- Si vous avez de la fièvre ou une réaction au niveau de la peau, arrêtez de prendre ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.
- Ce médicament est généralement déconseillé en cas de maladie du sang touchant l'hémoglobine (porphyrine aigüe).
- Analyses de sang : prévenez votre médecin si vous prenez Dicynone® et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les résultats de votre taux de créatinine dans le sang en donnant des valeurs plus basses.
- Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous allez subir des examens médicaux : pendant le traitement avec l'etamsylate, le prélèvement d'échantillon (par exemple une prise de sang) requis pour les tests de laboratoire doit être fait avant la première administration quotidienne du médicament afin de minimiser toute interaction potentielle d'etamsylate avec les tests de laboratoire.

Si la gêne ne diminue pas en quinze jours, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si la gêne augmente, si la fragilité des vaisseaux (les bleus et les ecchymoses) s'étend, consultez immédiatement votre médecin.

Ce traitement sera plus efficace si vous respectez les recommandations d'hygiène de vie suivantes :

- Evitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.
- Privilégiez la marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés ; cela favorise la circulation sanguine.

Autres médicaments et Dicynone®, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

maux de tête,

- diminution sévère du nombre de globules blancs (agranulocytose)
- diminution du nombre de globules blancs (neutropénie)
- réactions allergiques, allant de l'éruption de boutons et/ou plaques sur la peau jusqu'à une réaction plus grave (choc anaphylactique) avec malaise et baisse importante de la pression artérielle et/ou gêne respiratoire (bronchospasme).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER DICYNONE®, comprimé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N'utilisez pas ce médicament hors de son emballage.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Dicynone®, comprimé

La substance active est :

Etamsylate 250 mg

Etamsylate 500 mg

Pour un comprimé.

Les autres composants excipients sont : Sulfite de sodium, acide stéarique, amidon de blé, cellulose

microcristalline, gomme, dihydrogénocitrate de sodium.

FORME ET PRÉSENTATION

Comprimés Boîte de 20

CONDITIONS DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à prescription médicale.

Date de la notice : Mai 2018

Fabriqué et distribué par Zenith pharma
96, Zone Industrielle Tassilia, Inezgane - Agadir
Sous licence Vifor France
Dr M. EL BOUHMADI Pharmacien Responsable

A01R 08/18
C50486-01

Dicynone® 250 mg, Comprimé Boîte de 20

Dicynone® 500 mg, Comprimé Boîte de 20

Etats-Unis

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette flacon. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Dicynone®, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dicynone®, comprimé ?
3. Comment prendre Dicynone®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Dicynone®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que DICYNONE® et dans quel cas est-il utilisé ?

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

AUTRE HEMOSTATIQUE SYSTEMIQUE - code ATC : B02BX01

Dicynone® 250 mg :

Ce médicament est un antihémorragique et un vasculoprotecteur.

Il est proposé :

- dans le traitement des saignements par fragilité des petits vaisseaux sanguins et dans les saignements gynécologiques.
- en cas d'intervention chirurgicale pour diminuer les pertes sanguines.

Dicynone® 500 mg :

- Utilisé dans les manifestations fonctionnelles de l'insuffisance veineuse lymphatique (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-débutus).
- Utilisé dans le traitement symptomatique des troubles fonctionnels de la fragilité capillaire.

Il est recommandé d'effectuer des épreuves fonctionnelles après bilan étiologique.

Dicynone®, comprimé avec des aliments et boissons



LOT: 210150
PER: 05/2028
PPV: 34,30 DH



ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Dicynone® 250 mg

Adultes : moyenne 2 comprimés 3 fois par jour.

Utilisation chez les enfants

Enfants : moyenne 1 comprimé 3 fois par jour.

Dicynone® 500 mg

En moyenne 3 comprimés par jour.

Mode d'administration

Voi orale.

Si vous avez pris plus de Dicynone®, comprimé que vous n'auriez dû : Sans objet.

Si vous oubliez de prendre Dicynone®, comprimé : Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre Dicynone®, comprimé : Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde :

- nausées, vomissements, diarrhée,
- éruptions de boutons et/ou plaques sur la peau,

fonctions du rein),

- Si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux,
- Si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie),
- Si vous avez moins de 15 ans.

Mise en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITAMINE C®.

- Ce médicament contient du sodium (composant principal du sel de cuisine/table). A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

- Si votre fatigue s'accroît ou persiste après 1 mois de traitement ou si elle s'accompagne de manifestations inhabituelles, prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

- En raison d'un effet légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la vitamine C en fin de journée.

- Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus d'autres sources, comme les médicaments, les aliments enrichis et les compléments alimentaires (risque de surdosage).

- La vitamine C augmente l'absorption du fer par votre organisme. En cas d'hémochromatose (maladie héréditaire se caractérisant par une surcharge en fer), adressez-vous à votre médecin car l'utilisation de ce médicament doit faire l'objet de précautions strictes.

- La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées en vitamine C (supérieure à 1 gramme par jour) favorisent le risque d'apparition d'une anémie hémolytique (destruction des globules rouges).

- La vitamine C peut fausser les résultats de certaines analyses biologiques, notamment de tests de contrôle du glucose sanguin et urinaire, avertissez votre médecin si des tests sont prévus.

Enfants et adolescents : Sans objet.

Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament contient de la vitamine C. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux, issus des aliments enrichis et des compléments alimentaires.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER VITAMINE C® ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Que contient VITAMINE C® ?

La substance active est :

Par unité de prise

Acide ascorbique 1000 mg

Pour un comprimé effervescent

Les autres composants du comprimé sont :

Acide citrique anhydre, cyclamate de sodium, bicarbonate de sodium anhydre, carbonate de sodium, jaune orangé S, huile de vaseline, saccharose, saccharine sodique, arôme orange poudre.

Qu'est-ce que VITAMINE C®, et contenu de l'emballage extérieur :

Ce médicament se présente sous la forme de comprimés effervescents.

Tube de 10 comprimés en boîte de 1 ou 2 tubes.

Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM MAROC : Laboratoires pharmaceutique GALENICA, N 13, G 5 - Z.I. Ouled Saleh - Bouskoura - 20180 - Casablanca - Maroc

Nom et adresse du fabricant (quand celui-ci n'est pas titulaire de l'AMM)

: Néant

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : Janvier 2020

Conditions de prescription et de délivrance : Médicament non sumis à prescription médicale.

Informations réservées aux professionnels de santé : Sans objet.

VITAMINE C® GALENICA 1g

Acide ascorbique

Comprimé effervescent, Boîte de 10 et de 20

Boîte de 20 comprimés effervescents
VITAMINE C 1g
RPV. : 26,50 DH



cette notice avant de prendre ce
les informations importantes pour vous.
médicament en suivant scrupuleusement
ette notice ou par votre médecin ou votre

ez avoir besoin de la relire.
ien pour tout conseil ou information.
que effet indésirable, parlez-en à votre
ci s'applique aussi à tout effet indésirable
ette notice.
re médecin si vous ne ressentez aucune
ez moins bien après 1 mois de traitement

tient cette notice :

VITAMINE C®, ET DANS QUELS CAS

**QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE
AVANT DE PRENDRE VITAMINE C® ?**

3. COMMENT PRENDRE VITAMINE C® ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VITAMINE C® ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE VITAMINE C® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique :

ACIDE ASCORBIQUE (VIT C)

Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient de la vitamine C. Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE C® ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications :

Ne prenez jamais VITAMINE C® :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des

planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse : Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de VITAMINE C®, pendant la grossesse.

Allaitement : La vitamine C passe dans le lait maternel. Il n'existe pas de données suffisantes sur les effets de la vitamine C chez les nouveau-nés/nourrissons. Par conséquent, il est préférable d'éviter l'utilisation de VITAMINE C® pendant l'allaitement

Fertilité : Il n'existe pas de données relatives aux effets de VITAMINE C® sur la fertilité humaine.

Sportifs : Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines : VITAMINE C® n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

Liste des excipients à effet notable :

VITAMINE C, comprimé effervescent contient jaune orangé S (E110), sodium, saccharose.

3. COMMENT PRENDRE VITAMINE C® ?

VEILLEZ à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

La dose recommandée est de 1 comprimé par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Le comprimé doit être dissous dans un verre d'eau.

Durée du traitement :

La durée du traitement est limitée à 1 mois.

Si vous avez pris plus de VITAMINE C® que vous n'auriez dû :

Les symptômes généraux d'un surdosage en vitamine C peuvent inclure des troubles gastro-intestinaux tels que des diarrhées, des nausées et des vomissements.

La consommation chronique de doses élevées d'acide ascorbique (> 500 mg / jour) peut aggraver une surcharge en fer et peut mener à des lésions tissulaires chez les patients atteints d'hémochromatose.

À doses supérieures à 1 g/jour en vitamine C, peuvent survenir des troubles digestifs (brûlures gastriques, diarrhée) ; troubles rénaux et urinaires (calculs rénaux, insuffisance rénale, nécrose tubulaire aiguë) ; hémolyse (désintégration des globules rouges) chez les sujets déficients en glucose-6-phosphate déshydrogénase (enzyme spécifique des globules rouges).

Si ces symptômes apparaissent, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre VITAMINE C® :

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre VITAMINE C® : Sans objet.

ORDONNANCE

Le 22.02.2024

Dr BACHARI SAID

Medecin :
P.S.A

Medecin Biologiste
Dr B. HATTI
Lyon 6^e Medecin 2^{me} semestre
1^{re} et 2^{me} cycle

