

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie Dentaire Optique Autre

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : **13.9.2.6**

Société : **RAAM**

Actif

Pensionné[e]

Autre :

Nom & Prénom :

Benhmid Abdellah A 98263

Date de naissance :

31/01/91

Adresse :

Parc de KS11, Imr, Casab

Tél : **0613663717**

Total des frais engagés :

866,86

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

23/01/2014

Nom et prénom du malade :

Belkacem Aicha

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Jaunisse + cithophenii

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Carçon**

Signature de l'adhérent[e] :

Le : **23/01/2014**

VOLET ANTI

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
23/02/2024	CS		300 Dh	DR. AHMED BELLA HADJ DIA Spécialiste Gastro-Entérologie Médico-Chirurgicale Tél : 06.16.17.01.40

305.1

	Cachet et signature du Médecin attestant le Délivrance des Actes
	<p>Dr. AIT BELLA HADJER Spécialiste gastro - Entérologie Hépatologie Médico - Chirurgie Tél : 06 16 17 01 40</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	28.10.12	578,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'OD.



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553
	R



(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Naima Ait Bella
Spécialiste en Hépato-Gastro
Entérologie

الدكتورة نعيمة آيت بلال
أخصائية في أمراض الكبد
و الجهاز المخمر



- Ex Médecin interne au CHU ibno Rochd Casablanca
- Membre de la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie.

- Hépatologie
- Maladies de l'estomac et de l'intestin
- Proctologie Médico - Chirurgicale
- Endoscopie Digestive
- Echographie Abdominale

- طبية داخلية سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء
- عضو بالجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز المخمر

- أمراض الكبد
- أمراض المعدة والأمعاء
- أمراض وجراحة الشرج والبواسير
- الفحص بالميطار
- الفحص بالصدري

Casablanca, le :

23/11/24

دار البيضاء في:

Bejjan Aicha

1) Raciper 40 mg
1 fl x 2 fls

37

1 fl x 2 fls p ab 140
pri 160 fls p ab 1 month

2) Carboglu 5
1 fl x 2 fls p ab 100mls

37

3) Augotabli 54,00
200 mg gelat
1 gel x 2 fls p ab 100mls

37

4) Relax 300 mg gelat
1 gel fls p ab 100mls

37

Angle Bd Ahmed Mekouar et Rue de la Plage (Place Nas Ifak)
Imm Best Business Center 1^{er} Etage App N°9 Ain Sebaa - Casablanca
05 22 67 20 98 - Cabinet.naitbella@gmail.com

PHARMACIE CASABLANCA
Rés. Al Badr GH, 17 Immeuble 05
N° 2, All Loughlam Sidi Bernoussi
Casablanca - Tel: 05 22 76 66 46



Gélule
Voie orale

Relaxium B6

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin 260 mg
équivalent en Magnésium 150 mg
Vitamine B6 1 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin 520 mg
équivalent en Magnésium 300 mg
Vitamine B6 2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin 650 mg
équivalent en Magnésium 375 mg
Vitamine B6 2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec.

Relaxium B6 150 / Autorisation

Relaxium B6 300 / Autorisation

Relaxium B6 375 / Autorisation

LOT : 230507

DLUD : 06/2026

87,00DH

20181805321DMP/20UCAVI

20181805322DMP/20UCAVI

20191812093DMP/20UCAVI

Deva Pharmaceutique
Di Pharmacien Responsable

MCI
Médicaments et Cosmétiques

- براز أسود مولن بالبلم**
عذ وصف عذ - عذ المطلب حسب احتياجاته، يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا ألمك أو ألمت به
أعراض أخرى.
- إن تناول مثيل مختبطة البروتون مثل راسبيبر 20 مل و 40 مل، أعراض مقاومة لمحضنة المعدة، خاصة خلال مدة تدفق الماء، من شأنه زيادة طفقة من خطر كسر الورك والر斛 أو العود الفقري. أخفي طبيبك إذا ظهرت أعراض من هشاشة العظام أو تناول السيروروبات (التي يمكن أن يزيد من خطر ترقق العظام).
- سواغ ذو تأثير معروف :** السكارازور. بسبب احتوائه على السكاروز، لا يصح استخدامه الداء لدى المرضى الذين يعانون من حساسية الفركوز، سوء امتصاص الجلوكوز والجلكتوز أو نفس السكاراز (إيزومالتوز) (مرض روثي ناد).
- ### 8. النقاصلات
- استعمال أدوية أخرى:**
إذا كنت تتناول أو قد تتناول مذكرة دواء آخر بما في ذلك دواء مستعمل بدون وصفة طبية، أخفي طبيبك أو الصيدلي، يمكن راسبيبر 20 مل و 40 مل، أعراض مقاومة لمحضنة المعدة، لأنها تتفاعل مع وظائف أدوية أخرى والعنك.
- يمنع تناول راسبيبر في حال كنت تتناول الأدوية التالية:
 - التيتانغير (الذي يستعمل في علاج قرقوس نقص المناعة البشرية)، يجب أخفي طبيبك أو الصيدلي، يجب أن تتناول الأدوية التالية:
 - الآثار التأثير التي يستعمل في علاج قرقوس نقص المناعة البشرية؛
 - الكيتوكونازول (الذي يستعمل لعلاج الفطريات الفطرية)؛
 - الإيزوروتيبت (الذي يستعمل في علاج العصارات)؛
 - الستيرويد، الإيمبرامين أو الكوليبرامين (الذي يستعمل في علاج الاكتئاب)؛
 - الديازepam (الذي يستعمل في علاج القلق والصرع أو إرخاء العضلات)؛
 - الفيتينون (الذي يستعمل في علاج الصرير) إذا كنت تتناول الفيتينون، ستحتج للخصوص مقاومة لمحضنة المعدة.
 - الأدوية المضادة لتأثير الماء والتي تعمل على تعييف مثل الوارفارين. ستحاج للخصوص المقاييس من قبل طبيبك عند الذهاب والتوقف عن تناول راسبيبر 20 مل و 40 مل، أعراض تعرّف بعض الماء من جسمك دون راسبيبر 20 مل و 40 مل، سوغر، سوغر، سوغر.
- المعدة، بواسطة أنبوب معدى**
من المهم هنا أن يتم تناول الدواء غير الأنابيب المعدى من قبل أفراد مدربين وبشكل المعرفة الدائرية لضمان أن المعدات التي تم اختيارها (الأنبوب والحقنة) مناسبة لطريق استخدم الدواء. يستعمل خط الماء غير الغازي، يمكن استعمال أي سائل آخر.
- أفضل الأنابيب بالماء قبل تناول الدواء.
1. ضع القرص في حفنة مناسبة وأملأ الحفنة بما يقارب 25 مل من الماء وحوالى 5 مل من الوراء.
 2. تجاه بعض الأنابيب لكمية 50 مل من الماء لتثبيت القرص ومنع انسداد الأنابيب.
 3. فم بالتنبيب الفوري للحقنة لمدة دقيقة لتنبيط القرص.
 4. حافظ على رأس الحقنة نحو الأعلى وتحقق من الرأس لا يحيط بال محلول.
 5. قم بربط الأنابيب بالحقنة مع الحفاظ على الوضعيه الموضحة أدناه.
 6. وجه الحقنة نحو الأعلى ثم رجهما (يجب الحفاظ على وضعية الرأس نحو الأعلى لمنع أي احتباس للراس).
 7. أعد ملأ الحقنة بـ 25 مل من الماء و 5 مل من الوراء، وكرر الخطوة رقم 5 عند الضرورة حتى لا يتم ترك أي روابس في الحقنة. تحتاج بعض الأنابيب لكمية 50 مل من الماء.
- تقنيات من أجل الاستعمال الجيد**
تناول دائمًا راسبيبر كما وصفه لك طبيبك تماماً، استشر طبيبك أو الصيدلي عند ضرورة ذلك.
 لا ينصح بتناول راسبيبر 20 مل و 40 مل، قرص مقاومة لمحضنة المعدة من قبل الأطفال أقل من 12 سنة.
 إذا كنت تتناول هذا الدواء لفترة طويلة (وخاصه من أكثر من سنة واحدة)، يجب على الطبيب ومسنه تحمل المسئلية.
 إذا أمرك طبيبك بتناول هذا الدواء "عذ المطلب" حسب الحاجة، يجب إبلاغه بأي تغيرات بالاعراض.
- طريقة تناول الدواء**
 يمكن أن تتناول الأدواء في أي وقت من اليوم.
 يمكن تناول الأدواء خلال أو بين الوجبات.
- يبلغ القرص توكب ماء يعني ضغط أو سحق الأدواء، يمكن القرص من حبيبات توفر خصائص الدواء من محسنة المعدة والتي لا يجب أن يلطفها اي ضرر قبل المرور في المعدة.
ما يتوجب عليه القيام به في حال مواجهة معيوبات في بلع الأدواء
 في حالة معيوبات في بلع الأدواء:
 - ضع القرص في كوب ماء يعني ضغط أو سحق الأدواء.
 - قم بتقطيع الخليط إلى أي قدر لا يزيد عن بكرتين الصغيرة مثلاً أو خلال 30 دقيقة، قم دائمًا بتقطيع الخليط قبل شربه.
 - من أجل تناول الجرعة بأكملها، أصل الكبس بإضافة نصف كوب ماء ثم الشرب. يجب بلع جميع الحبيبات دون مشحنة أو سحقها.
 - بالنسبة للمرضعات الذين لا يستطيعن البلع، يمكن تناوب القرص في الماء وتناوله بواسطة أنبوب معدى.
- الجرعة**
 - يقوم الطبيب بتحديد عدد الأدواء التي يجب تناولها ومدة العلاج، لكن ذلك يعتمد على حالتكم الصحية وسنكم ووظيفة الكبد لديك.
 - تحدد الجرعات الأعتدانية كالتالي.
- علاج أعراض الارتفاع المعدى العربي (حرقة وارتجاع الحمض)**
 - البالغين والأطفال بدءاً من 12 سنة.
 - إذا خلص تخصيص الطبيب إلى تهاب المريء، تحدد الجرعة الاعتدانية في 40 مل من إنبعاث السكريات والكافيين.
 - إنبعاث السكريات والكافيين.
 - اضطرابات في القيء (أرق).
 - دوخة، تقيقل، تعبان.
 - دوران.
 - جفاف الدم.
 - تزايد ازدياد الكبد في الدم.
 - تقطيع جلدي، حكة وحكة.
 - كسر في الورك والمعصم أو العود الفقري (إذا تم استعمال راسبيبر 20 مل و 40 مل، أعراض مقاومة لمحضنة المعدة يجرعات كبيرة ولفترات طويلة).
 - تناولات غير مرغوب فيها أخرى نادرة (يمكن أن تظهر لدى شخص واحد من بين 1000 شخص).
 - اضطرابات الدم مثل انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية. يمكن لهذه التناولات أن تسبب الصداع، كدمات وتشنج في وogue أصابع.
 - انخفاض نسبة الصوديوم في الدم. يمكن لذلك أن يسبب الصداع، الغثيان، التقيؤ والتشنجات.
 - شعور بالآهاب، ارتباك، اكتئاب.
 - اضطرابات في المثانة.
 - اضطرابات بصيرية مثل دوار وضوضاء الرؤية.
 - صفير أو ضيق في التنفس (تشنج قصبي).
 - التهاب داخل المجرى الهضمي.
 - إصابة الأمعاء بنوع من القطريات (داء المبيضات المعوي).

CARBA'PLUS

Adsorbant et régulateur de la fonction intestinale

Forme et présentation :

CARBA'PLUS : Boîtes de 20 gélules.

Composition :

Par gélule:

charbon activé: 144,40 mg

Poudre de feuille de Séné : 52,50 mg

Poudre de fruit de Fenouil : 20,00 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, gélatine de bovine, dioxyde de titane, oxyde de fer.

Propriétés : CARBA'PLUS contient exclusivement des agents actifs végétaux et minéraux. CARBA'PLUS a un double effet : Adsorbant des gaz et régulateur naturel de la fonction intestinale. Le charbon activé adsorbe les toxines bactériennes et du métabolisme. Le séné évacue rapidement les toxines adsorbées par le charbon. En outre, CARBA'PLUS a un effet désinfectant dans l'intestin anti spasmodique et adoucissant.

Indications : Dyspepsie, digestion pénible.

- Flatulences, ballonnement, météorisme, émission des gaz.
- Fermentation et putréfaction intestinale.
- Auto-intoxication intestinale.
- Paresse intestinale.
- Toutes les formes de constipation.
- Constipation due aux hémorroïdes.
- Troubles fonctionnels intestinaux/Colopathie fonctionnelle.
- Préparation à la radiographie.
- Lavement baryté.

Posologie : 1 à 2 gélules deux fois par jour distant des repas.

Précaution d'emploi : - Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

... u d'allaitement.

CARBA'PLUS
30 GELULES

Prix:88.00DH

Lot:16392

Pér:05/2025

dicaments.

MP/21/V1



ne ou à l'un des autres
és en rubrique 6).

is de votre médecin

ule
z, avez récemment

sez être enceinte ou
decin avant de

ant la grossesse.

ant l'allaitement.

itement ou de

er.

acien avant de

e des véhicules et à

g, gélule ?

exactement les
e médecin ou

édecin.

édecin.

le que vous n'auriez dû
armacien.

gélule

z la dose suivante à

ose que vous avez

édicament,
otre pharmacien.

EVENTUELS ?

provoquer des effets
ement chez tout le

monde.

Si vous avez une réaction allergique, arrêter de prendre ce médicament et prévenez votre médecin immédiatement. Les signes peuvent inclure :

- une difficulté à respirer, un gonflement du visage, du cou, des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Autres effets indésirables :

- éruption cutanée, peau rouge avec des démangeaisons.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DUSPATALIN 200 mg, gélule ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température supérieure à + 5° C.

Pour le conditionnement en plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) :

A conserver à une température ne dépassant pas + 25° C.

Pour le conditionnement en plaquettes thermoformées
(Aluminium/Aluminium) :

A conserver à une température ne dépassant pas + 30° C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DUSPATALIN 200 mg, gélule

• La substance active est : Chlorhydrate de mébéverine 200,00 mg

Pour une gélule

• Les autres composants sont : Stéarate de magnésium, polyacrylate (dispersion de) à 30 pour cent (Eudragit NE 30D), talc, hypromellose, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent (Eudragit L 30D), triacétine.

Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171).

Composition de l'encre d'impression : gomme laque, propylène glycol, solution d'ammoniaque concentrée, hydroxyde de potassium, oxyde de fer noir.

Qu'est-ce que DUSPATALIN 200 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gélule blanche comportant l'inscription « 245 ». Boîte de 20

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 19/09/2017

DUSPATALIN®

200 mg Chlorhydrate de mébénérine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DUSPATALIN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DUSPATALIN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC

DUSPATALIN 200 mg contient du chlorhydrate de mébénérine. Il appartient à un groupe de médicaments appelé antispasmodiques, qui agissent sur votre intestin.

DUSPATALIN 200 mg est utilisé pour soulager les symptômes des troubles fonctionnels intestinaux. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre mais peuvent inclure :

- des douleurs et des crampes
- une sensation de ballonnements
- une diarrhée, une constipation
- des petites selles (fécalémie)

En l'absence d'amélioration de ces symptômes, consultez votre médecin.



6 118000 010531 EAVANT

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSPATALIN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais DUSPATALIN 200 mg, gélule :

• si vous êtes allergique au chlorhydrate de mébénérine ou à l'un des composants de DUSPATALIN 200 mg (mentionnés ci-dessous). En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre pharmacien.

Autres médicaments et DUSPATALIN 200 mg, gélule
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous prévoyez de planifier une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

DUSPATALIN 200 mg n'est pas recommandé pendant la grossesse. DUSPATALIN 200 mg ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Votre médecin pourrait vous conseiller d'arrêter l'allaitement si vous prenez ce médicament. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun effet susceptible d'altérer l'aptitude à conduire ou utiliser des machines n'est attendu avec ce produit.

3. COMMENT PRENDRE DUSPATALIN 200 mg, gélule ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre pharmacien en cas de doute.

Posologie

Adulte

La posologie usuelle est de 1 gélule, 2 à 3 fois par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

La gélule sera prise avant les repas, avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée de traitement

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez pris plus de DUSPATALIN 200 mg, gélule,

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DUSPATALIN 200 mg,

• Si vous oubliez une gélule, ne la prenez pas et prenez l'heure habituelle.

• Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement.