

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

19831

M23- N° 0042251

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0621 Société : *Retraité*

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : EL ZZAHID Brahim

Date de naissance : 01/07/1941

Adresse : AV des pléiades rue 59 N° 59 Hermitage casa

Tél. : 0669584539 Total des frais engagés : 3359,60 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : *Cherif Ben Brahim* Age:


Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 11/03/2024

Signature de l'adhérent(e) : *Cherif Ben Brahim*

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21-02-2024	25000	084000	25000	Dr. SOUZANI Médecin Interniste 125 Bis, Av Des Platanes Bd Anouar Hay Raja L'Hermitage Casablanca - Tel: 05 286 65 25

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE JAIA Bicam ABOUTIKA Boutique à pharmacie Hay Raja L'Hermitage Casablanca - Tel: 05 286 65 25	27/02/24	545,60
	01/03/24	10,80

## ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr FAVARD ENNACHACHE Rue Pasteur 21 Place Pasteur Casablanca : 0622 49 26 74 / 06 54 : 0622 48 27	28/02/24	BIT30 x PCI.5	2313,20 DS

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	Coefficient des Travaux
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 G	
	<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	MONTANTS DES SOINS
		DATE DU DEVIS
		DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Laboratoire Charles Nicolle  
ANALYSES MEDICALES

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille  
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCien INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE  
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

Prélevé le 28/02/024 à 08h13

Préleveur: mustapha amgoun  
Par le laboratoire

Date de Naissance: 15/02/1969 Sexe: F

Édité le: 02/03/24 10h59

Résultats complets

**Mme CHOUIEKH Zhour**

**59 av des pleades 1 hermitage casa**  
**CIN:A588743 RF: 280224005 P.n°**

**Dr. OUMGHARI BOUZIANE HIND**

CASABLANCA, le 02/03/2024

### CHIMIE URINAIRE

VALEURS DE REFERENCE

ANTECEDENTS

DIURESE ..... 2 000 ml/24h  
PROTEINES URINAIRES ..... 0.04 g/l  
Soit 0.08 g/24h (N : < à 0.15)

### IMMUNOLOGIE - AUTOIMMUNITE

VALEURS DE REFERENCE

ANTECEDENTS

#### ANTICORPS ANTIPHOSPHOLIPIDES

ANTICORPS ANTI B2 GP1 IGG : <5  
ANTICORPS ANTI CARDIOLIPINE IGG : <5  
ANTICORPS ANTI B2 GP1 IGM : <5  
ANTICORPS ANTICARDIOLIPINE IGM : <5

Résultat validé par Dr FAVARD Mireille





Laboratoire Charles Nicolle  
ANALYSES MEDICALES

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille  
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE  
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

Prélevé le 28/02/2024 à 08h13

Par le laboratoire

Date de Naissance: 15/02/1969 Sexe: F

Édité le: 02/03/24 10h59

Résultats complets

**Mme CHOUIEKH Zhour**  
**59 av des pleades 1 hermitage casa**  
**CIN:A588743 RF: 280224005 P.n°**

**Dr. OUMGHARI BOUZIANE HIND**

CASABLANCA, le 02/03/2024

## EXAMENS TRANSMIS

**RECHERCHE D'ANTICOAGULANT CIRCULANT** : Examen transmis à un laboratoire spécialisé.

Résultat validé par Dr FAVARD Mireille

Dr FAVARD Mireille  
Rcs Pasteur Casablanca  
Tél: 0522 49 26 74 / 0524 49 30 51

Biogiste responsable : François CORNU				Biologistes médicaux :			
B. AMEYOULD	C. COIGNARD	M. HERVO	M. NOUCHY	O. ROUALDES	C. SAULT	B. SCHUBERT	A. SOARES
J.C. AZOULAY	A. COUPRIE	L. JASSERAND	A. OVIZE	L. PELLEGRINA	A. PETIT	L. STROMPF	J.M. VANDERNOTTE
A. BARBRY	H. DESSUANT	M. JESTIN	G. PANTEIX	B. QUILICHINI	I. PETIT	X. VANHOYE	
R. BENNANI	L. DRUART	L. LEFLEM	L. PELLEGRINA	L. RAYMOND	J. ROCHAT		
T. BENQUEY	A. EBEL	A. LIQUIER	A. PETIT				
T. BLANCHOT	D. ENGERAND	A. MARCILLY	I. PETIT				
C. BOURDIN	M. GARCIA	N. MEKNACHE	J. MORTREUX				
C. BOUZ	B. GERARD	ME. NAUD	L. RAYMOND				
E. CART-TANNEUR	L. GUIS						

AUTORISATIONS : Activités de diagnostic prénatal : analyses de cytogénétique, y compris moléculaire ; analyses de génétique moléculaire ; analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses y compris de biologie moléculaire ; analyses de biochimie y compris les analyses portant sur les marqueurs sanguins maternels ; Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques ; Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ; Autorisation de détenir et/ou d'utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins de médecine nucléaire.

Dossier : 20843 22837-29.02.24

Enregistré le 29 Février 2024, à 14h34

Édité le 1 Mars 2024, à 18h22

Transmis par : LBM CHARLES NICOLE

Références : 2802005 2802005

MA036 - C - 2084322837

Q

LBM CHARLES NICOLE  
DR FAVARD Mireille  
21 place Pasteur  
0 CASABLANCA-MAROC (F)

### Exemplaire destiné au correspondant

Résultat d'analyse : Madame CHOUIEKH, ZHOUR

Née le 15 Février 1969, âgée de 55 ans

Prélèvement du 28 Février 2024 à 08h15



ACCREDITATION  
N° 8-1100  
Liste des sites accrédités  
et portée disponibles sur  
www.cofrac.fr

Seuls les résultats identifiés par le symbole # sont couverts par l'accréditation.

### Informations complémentaires

DR OUMGHARI H

### HEMATOLOGIE Hémostase et Coagulation

#### Recherche d'un anticoagulant de type lupique #

Taux de prothrombine (HemosIL RecombiPlasTin 2G, ACL TOP, IL) Valeurs de référence

● Taux de prothrombine 106 % 70-150

Lorsque le TP est inférieur à 60%, le test de dRVVT est réalisé sur un mélange patient+témoin.

#### Temps de céphaline + activateur - réactif sensibilisé pour la recherche d'anticoagulant circulant (APTT-SP, IL; Normal plasma, Hyphen BioMed)

● Patient	25,3	secondes	
● Ratio (patient/témoin)	0,83		<1,20
● Patient + témoin	27,6	secondes	
● Indice de Rosner	< 1,00	%	<12,00

#### Temps de venin de vipère de Russel dilué - Dépistage (dRVVT Screen, IL)

● Patient	45,2	secondes	
● Ratio SCREEN (patient/témoin)	1,22		<1,10

#### Temps de venin de vipère de Russel dilué - Confirmation (dRVVT Confirm, IL)

● Patient	31,2	secondes	
● Ratio CONFIRM (patient/témoin)	0,87		
● Ratio standardisé (Ratio SCREEN/Ratio CONFIRM)	1,39		<1,20

#### Conclusion

Résultat en faveur d'un anticoagulant circulant de type lupique.

A confronter au bilan immunologique et clinique.

A confronter à la recherche d'anticorps anticardiolipine et anti-béta 2 glycoprotéine 1.

Afin de confirmer le caractère transitoire ou permanent de cet anticoagulant, il serait souhaitable de contrôler ce résultat dans 3 mois.

Attention, les résultats de la recherche d'anticoagulant circulant sont inexploitables en cas de traitement en cours par

Biogiste responsable : <b>François CORNU</b>				Biologistes médicaux :			
<b>B. AMEYOULD</b>	<b>C. COIGNARD</b>	<b>M. HERVO</b>	<b>M. NOUCHY</b>	<b>O. ROUALDES</b>			
<b>J.C. AZOULAY</b>	<b>A. COUPRIE</b>	<b>L. JASSERAND</b>	<b>A. OVILLE</b>	<b>C. SAULT</b>			
<b>A. BARBRY</b>	<b>H. DESSUANT</b>	<b>M. JESTIN</b>	<b>G. PANTEIX</b>	<b>B. SCHUBERT</b>			
<b>R. BENNANI</b>	<b>L. DRUART</b>	<b>L. LEFLEM</b>	<b>L. PELLEGRINA</b>	<b>A. SOARES</b>			
<b>T. BENQUEY</b>	<b>A. EBEL</b>	<b>A. LIQUIER</b>	<b>A. PETIT</b>	<b>L. STROMPF</b>			
<b>T. BLANCHOT</b>	<b>D. ENGERAND</b>	<b>A. MARCILLY</b>	<b>I. PETIT</b>	<b>JM. VANDERNOTTE</b>			
<b>C. BOURDIN</b>	<b>M. GARCIA</b>	<b>N. MEKNACHE</b>	<b>B. QUILICHINI</b>	<b>X. VANHOYE</b>			
<b>C. BOUZ</b>	<b>B. GERARD</b>	<b>J. MORTREUX</b>	<b>L. RAYMOND</b>				
<b>E. CART-TANNEUR</b>	<b>L. GUI</b>	<b>ME. NAUD</b>	<b>J. ROCHAT</b>				

AUTORISATIONS : Activités de diagnostic prénatal ; analyses de cytogénétique, y compris moléculaire ; analyses de génétique moléculaire ; analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris de biologie moléculaire ; analyses de biochimie y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ; Examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques ; Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ; Autorisation de détention et/ou d'utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins de médecine nucléaire.

Madame CHOUIEKH ZHOUR

Date de naissance : 15 Février 1969  
Dossier : 20843 **22837-29.02.24**

## Suite des résultats

Exemplaire destiné au correspondant

## HEMATOLOGIE (suite)

### ■ Recherche d'un anticoagulant de type lupique # (suite)

anticoagulant direct actif par voie orale (risque de résultats faussement positifs).

Recherche d'anticoagulant circulant réalisée selon les recommandations de l'International Society of Thrombosis and Hemostasis.

Interlocuteur : Léna Le Flem, Laurence Guis, Dominique Engerand - Réalisé par : Biomnis IVRY - Validé par : Dr Léna LE FLEM



François CORNU

### Dossier complet

La présentation de nos résultats a changé : désormais, chaque analyse est suivie de la mention « validé par », qui vaut signature informatique du biologiste concerné.



Laboratoire Charles Nicolle  
ANALYSES MEDICALES

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille  
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCien INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE  
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

**FACTURE : 64503**

Casablanca, le 28/02/2024

**CN 85122**

Nom et Prénom : **Madame CHOUIEKH Zhour**  
Référence : **280224 005**

CODE	ANALYSES	B/HN	Clé	PRIX EN DH
B 0182	ANTICOAGULANT CIRCULANT DE TYPE LUPIQUE	700	B	938,00
B 5264	AC ANTI PHOSPHOLIPIDES cardiolipine/b2gp	1000	B	1340,00
B 177	PROTEINURIE 24 heures	30	B	40,20

Prélèvements : 1 25,00 Dh

**MONTANT NET :** **2343,20 Dhs** (Soit 1730 B/ 0 HN)

Arrêtée la présente facture à la somme de :

**Deux mille trois cent quarante trois Dirhams et vingt centimes**



Laboratoire accrédité selon la norme NM ISO 15189 - Portée AA 02/2019 disponible sur le site : [www.mcinet.gov.ma](http://www.mcinet.gov.ma)

CNSS : 225 6180 - Patente : 36340350 - R.C. : 281742 - IF : 59301957 - ICE : 001650011000057 - INP : 093001030  
R. Pasteur, 21, Place Pasteur Casablanca - Tél.: 0522 49 26 74/98 . Pour toute réclamation : E-mail : [labocharlesnicolle@gmail.com](mailto:labocharlesnicolle@gmail.com)  
RIB BANCAIRE BMCE AGENCE MOULAY IDRISI 1er Casablanca\_011 780 00 00 70 210 00 059 34 32

# Plaquénil® 200 mg

Sulfate d'hydroxychloroquine

Comprimé pelliculé

## Veuillez lire attentivement contenu des informations

- Gardez cette notice. Vous avez des questions, interrogez votre pharmacien ou votre personnellement prescrit. Ne n'oubliez, même si les signes de l'effet indésirable sont de l'ordre d'un quelconque effet pharmacien. Ceci s'applique dans cette notice. Voir rubrique 1.

## 1. QU'EST-CE QUE PLAQUENIL® Classe pharmaco-thérapeutique

PLAQUENIL appartient à une famille de médicaments appelés autres anti-rhumatisants musculo-squelettiques.

Ce médicament contient du sulfate d'hydroxychloroquine.

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué pour traiter les maladies articulaires d'origine inflammatoire, telles que la polyarthrite rhumatoïde, ou d'autres maladies telles que le lupus ou en prévention des lucites.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PLAQUENIL®

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications :

#### Ne prenez jamais PLAQUENIL :

- si vous êtes allergique à l'hydroxychloroquine, à ses dérivés ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez une rétinopathie (maladie de la rétine) ;
- si vous allaitez ;
- chez l'enfant de moins de 6 ans, car il existe un risque de fausse route et d'étouffement ;
- en cas de co-administration avec le citalopram, l'escitalopram, l'hydroxyzine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété) ou la dompéridone (médicament contre les vomissements) ou la pipéperazine (médicament utilisé pour traiter le paludisme).

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre PLAQUENIL. Ce médicament ne doit être pris que sous surveillance médicale.

Tes jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux effets toxiques de PLAQUENIL. Par conséquent, suivez ce médicament hors de la portée des enfants.

### Avant le traitement

• Prévenez votre médecin si vous avez des troubles cardiaques : l'hydroxychloroquine peut provoquer des troubles du rythme cardiaque chez certains patients :

l'hydroxychloroquine doit être utilisée avec prudence si vous présentez un allongement de l'intervalle QT depuis votre naissance ou si vous avez des antécédents familiaux de ce trouble, si vous présentez un allongement de l'intervalle QT acquis (détecté par l'ECG, l'enregistrement de l'activité électrique du cœur), si vous avez des troubles cardiaques ou des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous avez un déséquilibre des électrolytes dans le sang (en particulier un taux faible de potassium ou de magnésium, voir rubrique « Autres médicaments et hydroxychloroquine »).

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de porphyrine (maladie du sang). En effet, chez les sujets atteints de porphyrine intermittente, ce médicament peut déclencher la survenue d'une crise aiguë de porphyrine.

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de psoriasis (maladie de la peau) : la prise de ce médicament peut entraîner une aggravation des lésions.

• Si vous avez une maladie grave du foie ou des reins : prévenez votre médecin qui adaptera la posologie de ce traitement à votre cas.

• Prévenez également votre médecin si vous (ou un membre de votre famille) êtes atteints d'un déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges) car un risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) existe avec d'autres médicaments de la même classe que PLAQUENIL.

Avant d'entreprendre un traitement prolongé avec PLAQUENIL, un bilan

ophtalmologique complet pourra vous être prescrit. Ce bilan sera répété au moins une fois par an, afin de dépister une atteinte de la rétine qui imposerait l'arrêt du traitement.

### Pendant le traitement

- Si une perturbation visuelle se produit (acuité visuelle, vision des couleurs...) vous devez prévenir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

• surveillance régulière des cellules du sang pour certains effets indésirables éventuels.

• troubles cardiaques (cœur qui bat trop vite, trop lentement, ou de manière irrégulière) surviennent, vous devez prévenir immédiatement votre médecin. Le risque d'origine de problèmes cardiaques peut augmenter avec la dose. Par conséquent, je recommande doit être respectée. (Voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

UNIL peut diminuer votre taux de sucre dans le sang. Demandez à votre médecin de vous informer des signes et symptômes éventuels d'une diminution du taux de sucre dans le sang. Un contrôle sanguin peut-être nécessaire.

UNIL peut provoquer la survenue d'une rigidité musculaire, de mouvements soudains, de tremblements (troubles extrapyramidaux) (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

### 3. médicaments et PLAQUENIL

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### Ne prenez jamais PLAQUENIL en association avec les médicaments suivants :

• citalopram, escitalopram, hydroxyzine (médicaments contre la dépression ou l'anxiété), dompéridone (médicament contre les vomissements) et pipéperazine (médicament contre le paludisme).

• Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre PLAQUENIL avec :

• d'halofantrine (médicament utilisé pour traiter des crises de paludisme aigu).

### Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- ciclosporine (médicament utilisé pour diminuer les réactions immunitaires de l'organisme en cas de greffe d'organe ou de maladie auto-immune),
- hormones thyroïdiennes,
- topiques gastro-intestinaux, antiacides, kaolin, cimétidine, charbon (médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac, les douleurs digestives ou les ulcères digestifs). PLAQUENIL doit être pris à au moins deux heures d'intervalle avec les antiacides et le kaolin.

• Médicaments contre l'épilepsie ou médicaments pouvant influer sur l'épilepsie, en particulier le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine,

• médicaments contre le paludisme comme la méfloquine (car ils peuvent augmenter le risque de convulsion,

• insulin ou d'autres médicaments pour traiter le diabète,

• médicaments connus pour influer sur le rythme cardiaque, notamment les médicaments utilisés pour traiter les anomalies du rythme cardiaque (anti-arythmiques), la dépression (antidépresseurs tricycliques), les troubles psychiatriques (antipsychotiques), les infections bactériennes (par exemple, moxifloxacine ou azithromycine), les infections par le VIH (par exemple, saquinavir), les infections fongiques (par exemple, fluconazole), les infections parasitaires (par exemple, pentamidine) ou le paludisme (par exemple, halofantrine).

• Médicaments connus pour interférer avec PLAQUENIL notamment les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques (par exemple, itraconazole), les infections bactériennes (par exemple, rifampicine, clarithromycine), les troubles lipidiques (par exemple, gemfibrozil), les infections au VIH (par exemple, ritonavir), les caillots sanguins (par exemple, dabigatran, clopidogrel), les maladies cardiaques (par exemple, digoxine, flecainide, propafenone ou métropolidol) et un traitement à base de plantes pour la dépression : le milletpérus.

### PLAQUENIL avec des aliments et boisson :

Évitez de consommer du jus de pamplemousse, car il peut augmenter le risque d'effets secondaires.

### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Contraception

l'hydroxychloroquine pourrait provoquer une altération des gènes. Par mesure de précaution, si vous êtes un homme ou une femme en âge d'avoir des enfants, il est conseillé d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 8 mois après la fin de votre traitement par PLAQUENIL.

# Plaquénil® 200 mg

Sulfate d'hydroxychloroquine

Comprimé pelliculé

## Veuillez lire attentivement contenu des informations

- Gardez cette notice. Vous avez des questions, interrogez votre pharmacien ou votre personnellement prescrit. Ne n'oubliez pas, même si les signes de l'effet indésirable sont minimes, de renseigner un quelconque effet pharmacien. Ceci s'applique à dans cette notice. Voir rubrique 1.

## 1. QU'EST-CE QUE PLAQUENIL® Classe pharmacothérapeutique

PLAQUENIL appartient à une famille de médicaments appelés autres antirhumatisants musculo-squelettiques.

Ce médicament contient du sulfate d'hydroxychloroquine.

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué pour traiter les maladies articulaires d'origine inflammatoire, telles que la polyarthrite rhumatoïde, ou d'autres maladies telles que le lupus ou en prévention des lucites.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PLAQUENIL®

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais PLAQUENIL :

- si vous êtes allergique à l'hydroxychloroquine, à ses dérivés ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez une rétinopathie (maladie de la rétine) ;
- si vous allaitez ;
- chez l'enfant de moins de 6 ans, car il existe un risque de fausse route et d'étouffement ;
- en cas de co-administration avec le citalopram, l'escitalopram, l'hydroxyzine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété) ou la dompéridone (médicament contre les vomissements) ou la pipéperazine (médicament utilisé pour traiter le paludisme).

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre PLAQUENIL. Ce médicament ne doit être pris que sous surveillance médicale.

Tes jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux effets toxiques de PLAQUENIL. Par conséquent, suivez ce médicament hors de la portée des enfants.

#### Avant le traitement

• Prévenez votre médecin si vous avez des troubles cardiaques : l'hydroxychloroquine peut provoquer des troubles du rythme cardiaque chez certains patients :

l'hydroxychloroquine doit être utilisée avec prudence si vous présentez un allongement de l'intervalle QT depuis votre naissance ou si vous avez des antécédents familiaux de ce trouble, si vous présentez un allongement de l'intervalle QT acquis (détecté par l'ECG, l'enregistrement de l'activité électrique du cœur), si vous avez des troubles cardiaques ou des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous avez un déséquilibre des électrolytes dans le sang (en particulier un taux faible de potassium ou de magnésium, voir rubrique « Autres médicaments et hydroxychloroquine »).

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de porphyrine (maladie du sang). En effet, chez les sujets atteints de porphyrine intermittente, ce médicament peut déclencher la survenue d'une crise aiguë de porphyrine.

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de psoriasis (maladie de la peau) : la prise de ce médicament peut entraîner une aggravation des lésions.

• Si vous avez une maladie grave du foie ou des reins : prévenez votre médecin qui adaptera la posologie de ce traitement à votre cas.

• Prévenez également votre médecin si vous (ou un membre de votre famille) êtes atteints d'un déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges) car un risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) existe avec d'autres médicaments de la même classe que PLAQUENIL.

Avant d'entreprendre un traitement prolongé avec PLAQUENIL, un bilan

ophtalmologique complet pourra vous être prescrit. Ce bilan sera répété au moins une fois par an, afin de dépister une atteinte de la rétine qui imposerait l'arrêt du traitement.

#### Pendant le traitement

- Si une perturbation visuelle se produit (acuité visuelle, vision des couleurs...) vous devez prévenir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

• surveillance régulière des cellules du sang peut être nécessaire pour certains patients.

• troubles cardiaques (cœur qui bat trop vite, trop lentement, ou de manière irrégulière) surviennent, vous devez prévenir immédiatement votre médecin. Le risque d'origine de problèmes cardiaques peut augmenter avec la dose. Par conséquent, je recommande doit être respectée. (Voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

UNIL peut diminuer votre taux de sucre dans le sang. Demandez à votre médecin de vous informer des signes et symptômes éventuels d'une diminution du taux de sucre dans le sang. Un contrôle sanguin peut-être nécessaire.

PLAQUENIL peut provoquer la survenue d'une rigidité musculaire, de mouvements soudains, de tremblements (troubles extrapyramidaux) (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

#### 3. médicaments et PLAQUENIL

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### Ne prenez jamais PLAQUENIL en association avec les médicaments suivants :

• citalopram, escitalopram, hydroxyzine (médicaments contre la dépression ou l'anxiété), dompéridone (médicament contre les vomissements) et pipéperazine (médicament contre le paludisme).

• Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre PLAQUENIL avec :

• d'halofantrine (médicament utilisé pour traiter des crises de paludisme aigu).

#### Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- ciclosporine (médicament utilisé pour diminuer les réactions immunitaires de l'organisme en cas de greffe d'organe ou de maladie auto-immune),
- hormones thyroïdiennes,
- topiques gastro-intestinaux, antiacides, kaolin, cimétidine, charbon (médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac, les douleurs digestives ou les ulcères digestifs). PLAQUENIL doit être pris à au moins deux heures d'intervalle avec les antiacides et le kaolin.

• Médicaments contre l'épilepsie ou médicaments pouvant influer sur l'épilepsie, en particulier le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine,

• médicaments contre le paludisme comme la méfloquine (car ils peuvent augmenter le risque de convulsion),

• insulin ou d'autres médicaments pour traiter le diabète,

• médicaments connus pour influer sur le rythme cardiaque, notamment les médicaments utilisés pour traiter les anomalies du rythme cardiaque (anti-arythmiques), la dépression (antidépresseurs tricycliques), les troubles psychiatriques (antipsychotiques), les infections bactériennes (par exemple, moxifloxacine ou azithromycine), les infections par le VIH (par exemple, saquinavir), les infections fongiques (par exemple, fluconazole), les infections parasitaires (par exemple, pentamidine) ou le paludisme (par exemple, halofantrine).

• Médicaments connus pour interférer avec PLAQUENIL notamment les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques (par exemple, itraconazole), les infections bactériennes (par exemple, rifampicine, clarithromycine), les troubles lipidiques (par exemple, gemfibrozil), les infections au VIH (par exemple, ritonavir), les caillots sanguins (par exemple, dabigatran, clopidogrel), les maladies cardiaques (par exemple, digoxine, flecainide, propafenone ou métropolidol) et un traitement à base de plantes pour la dépression : le milletpérus.

#### PLAQUENIL avec des aliments et boisson :

Évitez de consommer du jus de pamplemousse, car il peut augmenter le risque d'effets secondaires.

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Contraception

l'hydroxychloroquine pourrait provoquer une altération des gènes. Par mesure de précaution, si vous êtes un homme ou une femme en âge d'avoir des enfants, il est conseillé d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 8 mois après la fin de votre traitement par PLAQUENIL.

# Plaquénil® 200 mg

Sulfate d'hydroxychloroquine

Comprimé pelliculé

## Veuillez lire attentivement contenu des informations

- Gardez cette notice. Vous avez des questions, interrogez votre pharmacien ou votre personnellement prescrit. Ne n'oubliez pas, même si les signes de l'effet indésirable sont minimes, de renseigner un quelconque effet pharmacien. Ceci s'applique à dans cette notice. Voir rubrique 1.

## 1. QU'EST-CE QUE PLAQUENIL® Classe pharmacothérapeutique

PLAQUENIL appartient à une famille de médicaments appelés autres antirhumatisants musculo-squelettiques.

Ce médicament contient du sulfate d'hydroxychloroquine.

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué pour traiter les maladies articulaires d'origine inflammatoire, telles que la polyarthrite rhumatoïde, ou d'autres maladies telles que le lupus ou en prévention des lucites.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PLAQUENIL®

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications :

#### Ne prenez jamais PLAQUENIL :

- si vous êtes allergique à l'hydroxychloroquine, à ses dérivés ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez une rétinopathie (maladie de la rétine) ;
- si vous allaitez ;
- chez l'enfant de moins de 6 ans, car il existe un risque de fausse route et d'étouffement ;
- en cas de co-administration avec le citalopram, l'escitalopram, l'hydroxyzine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété) ou la dompéridone (médicament contre les vomissements) ou la pipéperazine (médicament utilisé pour traiter le paludisme).

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre PLAQUENIL. Ce médicament ne doit être pris que sous surveillance médicale.

Tes jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux effets toxiques de PLAQUENIL. Par conséquent, suivez ce médicament hors de la portée des enfants.

### Avant le traitement

• Prévenez votre médecin si vous avez des troubles cardiaques : l'hydroxychloroquine peut provoquer des troubles du rythme cardiaque chez certains patients :

l'hydroxychloroquine doit être utilisée avec prudence si vous présentez un allongement de l'intervalle QT depuis votre naissance ou si vous avez des antécédents familiaux de ce trouble, si vous présentez un allongement de l'intervalle QT acquis (détecté par l'ECG, l'enregistrement de l'activité électrique du cœur), si vous avez des troubles cardiaques ou des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous avez un déséquilibre des électrolytes dans le sang (en particulier un taux faible de potassium ou de magnésium, voir rubrique « Autres médicaments et hydroxychloroquine »).

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de porphyrine (maladie du sang). En effet, chez les sujets atteints de porphyrine intermittente, ce médicament peut déclencher la survenue d'une crise aiguë de porphyrine.

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de psoriasis (maladie de la peau) : la prise de ce médicament peut entraîner une aggravation des lésions.

• Si vous avez une maladie grave du foie ou des reins : prévenez votre médecin qui adaptera la posologie de ce traitement à votre cas.

• Prévenez également votre médecin si vous (ou un membre de votre famille) êtes atteints d'un déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges) car un risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) existe avec d'autres médicaments de la même classe que PLAQUENIL.

Avant d'entreprendre un traitement prolongé avec PLAQUENIL, un bilan

ophtalmologique complet pourra vous être prescrit. Ce bilan sera répété au moins une fois par an, afin de dépister une atteinte de la rétine qui imposerait l'arrêt du traitement.

### Pendant le traitement

- Si une perturbation visuelle se produit (acuité visuelle, vision des couleurs...) vous devez prévenir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

• surveillance régulière des cellules du sang pour certains effets indésirables éventuels.

• troubles cardiaques (cœur qui bat trop vite, trop lentement, ou de manière irrégulière) surviennent, vous devez prévenir immédiatement votre médecin. Le risque d'origine de problèmes cardiaques peut augmenter avec la dose. Par conséquent, je recommande doit être respectée. (Voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

UNIL peut diminuer votre taux de sucre dans le sang. Demandez à votre médecin de vous informer des signes et symptômes éventuels d'une diminution du taux de sucre dans le sang. Un contrôle sanguin peut-être nécessaire.

UNIL peut provoquer la survenue d'une rigidité musculaire, de mouvements soudains, de tremblements (troubles extrapyramidaux) (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

### 3. médicaments et PLAQUENIL

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### Ne prenez jamais PLAQUENIL en association avec les médicaments suivants :

• citalopram, escitalopram, hydroxyzine (médicaments contre la dépression ou l'anxiété), dompéridone (médicament contre les vomissements) et pipéperazine (médicament contre le paludisme).

• Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre PLAQUENIL avec :

• d'halofantrine (médicament utilisé pour traiter des crises de paludisme aigu).

### Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- ciclosporine (médicament utilisé pour diminuer les réactions immunitaires de l'organisme en cas de greffe d'organe ou de maladie auto-immune),
- hormones thyroïdiennes,
- topiques gastro-intestinaux, antiacides, kaolin, cimétidine, charbon (médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac, les douleurs digestives ou les ulcères digestifs). PLAQUENIL doit être pris à au moins deux heures d'intervalle avec les antiacides et le kaolin.

• Médicaments contre l'épilepsie ou médicaments pouvant influer sur l'épilepsie, en particulier le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine,

• médicaments contre le paludisme comme la méfloquine (car ils peuvent augmenter le risque de convulsion,

• insulin ou d'autres médicaments pour traiter le diabète,

• médicaments connus pour influer sur le rythme cardiaque, notamment les médicaments utilisés pour traiter les anomalies du rythme cardiaque (anti-arythmiques), la dépression (antidépresseurs tricycliques), les troubles psychiatriques (antipsychotiques), les infections bactériennes (par exemple, moxifloxacine ou azithromycine), les infections par le VIH (par exemple, saquinavir), les infections fongiques (par exemple, fluconazole), les infections parasitaires (par exemple, pentamidine) ou le paludisme (par exemple, halofantrine).

• Médicaments connus pour interférer avec PLAQUENIL notamment les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques (par exemple, itraconazole), les infections bactériennes (par exemple, rifampicine, clarithromycine), les troubles lipidiques (par exemple, gemfibrozil), les infections au VIH (par exemple, ritonavir), les caillots sanguins (par exemple, dabigatran, clopidogrel), les maladies cardiaques (par exemple, digoxine, flecainide, propafenone ou métropolidol) et un traitement à base de plantes pour la dépression : le milletpérus.

### PLAQUENIL avec des aliments et boisson :

Évitez de consommer du jus de pamplemousse, car il peut augmenter le risque d'effets secondaires.

### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Contraception

l'hydroxychloroquine pourrait provoquer une altération des gènes. Par mesure de précaution, si vous êtes un homme ou une femme en âge d'avoir des enfants, il est conseillé d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 8 mois après la fin de votre traitement par PLAQUENIL.

# Plaquénil® 200 mg

Sulfate d'hydroxychloroquine

Comprimé pelliculé

## Veuillez lire attentivement contenu des informations

- Gardez cette notice. Vous avez des questions, interrogez votre pharmacien ou votre personnellement prescrit. Ne n'oubliez pas, même si les signes de l'effet indésirable sont minimes, de renseigner un quelconque effet pharmacien. Ceci s'applique à dans cette notice. Voir rubrique 1.

## 1. QU'EST-CE QUE PLAQUENIL® Classe pharmacothérapeutique

PLAQUENIL appartient à une famille de médicaments appelés autres antirhumatisants musculo-squelettiques.

Ce médicament contient du sulfate d'hydroxychloroquine.

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué pour traiter les maladies articulaires d'origine inflammatoire, telles que la polyarthrite rhumatoïde, ou d'autres maladies telles que le lupus ou en prévention des lucites.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PLAQUENIL®

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais PLAQUENIL :

- si vous êtes allergique à l'hydroxychloroquine, à ses dérivés ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez une rétinopathie (maladie de la rétine) ;
- si vous allaitez ;
- chez l'enfant de moins de 6 ans, car il existe un risque de fausse route et d'étouffement ;
- en cas de co-administration avec le citalopram, l'escitalopram, l'hydroxyzine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété) ou la dompéridone (médicament contre les vomissements) ou la pipéperazine (médicament utilisé pour traiter le paludisme).

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre PLAQUENIL. Ce médicament ne doit être pris que sous surveillance médicale.

Tes jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux effets toxiques de PLAQUENIL. Par conséquent, suivez ce médicament hors de la portée des enfants.

#### Avant le traitement

• Prévenez votre médecin si vous avez des troubles cardiaques : l'hydroxychloroquine peut provoquer des troubles du rythme cardiaque chez certains patients :

l'hydroxychloroquine doit être utilisée avec prudence si vous présentez un allongement de l'intervalle QT depuis votre naissance ou si vous avez des antécédents familiaux de ce trouble, si vous présentez un allongement de l'intervalle QT acquis (détecté par l'ECG, l'enregistrement de l'activité électrique du cœur), si vous avez des troubles cardiaques ou des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous avez un déséquilibre des électrolytes dans le sang (en particulier un taux faible de potassium ou de magnésium, voir rubrique « Autres médicaments et hydroxychloroquine »).

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de porphyrine (maladie du sang). En effet, chez les sujets atteints de porphyrine intermittente, ce médicament peut déclencher la survenue d'une crise aiguë de porphyrine.

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de psoriasis (maladie de la peau) : la prise de ce médicament peut entraîner une aggravation des lésions.

• Si vous avez une maladie grave du foie ou des reins : prévenez votre médecin qui adaptera la posologie de ce traitement à votre cas.

• Prévenez également votre médecin si vous (ou un membre de votre famille) êtes atteints d'un déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges) car un risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) existe avec d'autres médicaments de la même classe que PLAQUENIL.

Avant d'entreprendre un traitement prolongé avec PLAQUENIL, un bilan

ophtalmologique complet pourra vous être prescrit. Ce bilan sera répété au moins une fois par an, afin de dépister une atteinte de la rétine qui imposerait l'arrêt du traitement.

#### Pendant le traitement

- Si une perturbation visuelle se produit (acuité visuelle, vision des couleurs...) vous devez prévenir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

• surveillance régulière des cellules du sang peut être nécessaire pour certains patients.

• troubles cardiaques (cœur qui bat trop vite, trop lentement, ou de manière irrégulière) surviennent, vous devez prévenir immédiatement votre médecin. Le risque d'origine de problèmes cardiaques peut augmenter avec la dose. Par conséquent, je recommande doit être respectée. (Voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

• PLAQUENIL peut diminuer votre taux de sucre dans le sang. Demandez à votre médecin de vous informer des signes et symptômes éventuels d'une diminution du taux de sucre dans le sang. Un contrôle sanguin peut-être nécessaire.

• PLAQUENIL peut provoquer la survenue d'une rigidité musculaire, de mouvements soudains, de tremblements (troubles extrapyramidaux) (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

#### 3. médicaments et PLAQUENIL

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### Ne prenez jamais PLAQUENIL en association avec les médicaments suivants :

• citalopram, escitalopram, hydroxyzine (médicaments contre la dépression ou l'anxiété), dompéridone (médicament contre les vomissements) et pipéperazine (médicament contre le paludisme).

• Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre PLAQUENIL avec :

• d'halofantrine (médicament utilisé pour traiter des crises de paludisme aigu).

#### Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- ciclosporine (médicament utilisé pour diminuer les réactions immunitaires de l'organisme en cas de greffe d'organe ou de maladie auto-immune),
- hormones thyroïdiennes,
- topiques gastro-intestinaux, antiacides, kaolin, cimétidine, charbon (médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac, les douleurs digestives ou les ulcères digestifs). PLAQUENIL doit être pris à au moins deux heures d'intervalle avec les antiacides et le kaolin.

• Médicaments contre l'épilepsie ou médicaments pouvant influer sur l'épilepsie, en particulier le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine,

• médicaments contre le paludisme comme la méfloquine (car ils peuvent augmenter le risque de convulsion),

• insulin ou d'autres médicaments pour traiter le diabète,

• médicaments connus pour influer sur le rythme cardiaque, notamment les médicaments utilisés pour traiter les anomalies du rythme cardiaque (anti-arythmiques), la dépression (antidépresseurs tricycliques), les troubles psychiatriques

(antipsychotiques), les infections bactériennes (par exemple, moxifloxacine ou azithromycine), les infections par le VIH (par exemple, saquinavir), les infections fongiques (par exemple, flucanaïzole), les infections parasitaires (par exemple, pentamidine) ou le paludisme (par exemple, halofantrine).

• Médicaments connus pour interférer avec PLAQUENIL notamment les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques (par exemple, itraconazole), les infections bactériennes (par exemple, rifampicine, clarithromycine), les troubles lipidiques (par exemple, gemfibrozil), les infections au VIH (par exemple, ritonavir), les caillots sanguins (par exemple, dabigatran, clopidogrel), les maladies cardiaques (par exemple, digoxine, flecainide, propafenone ou métropolidol) et un traitement à base de plantes pour la dépression : le miltefipérite.

#### PLAQUENIL avec des aliments et boisson :

Évitez de consommer du jus de pamplemousse, car il peut augmenter le risque d'effets secondaires.

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Contraception

l'hydroxychloroquine pourrait provoquer une altération des gènes. Par mesure de précaution, si vous êtes un homme ou une femme en âge d'avoir des enfants, il est conseillé d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 8 mois après la fin de votre traitement par PLAQUENIL.

# Plaquénil® 200 mg

Sulfate d'hydroxychloroquine

Comprimé pelliculé

## Veuillez lire attentivement contenu des informations

- Gardez cette notice. Vous avez des questions, interrogez votre pharmacien ou votre personnellement prescrit. Ne n'oubliez pas, même si les signes de l'effet indésirable sont minimes, de renseigner un quelconque effet pharmacien. Ceci s'applique à dans cette notice. Voir rubrique 1.

## 1. QU'EST-CE QUE PLAQUENIL® Classe pharmacothérapeutique

PLAQUENIL appartient à une famille de médicaments appelés autres antirhumatisants musculo-squelettiques.

Ce médicament contient du sulfate d'hydroxychloroquine.

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué pour traiter les maladies articulaires d'origine inflammatoire, telles que la polyarthrite rhumatoïde, ou d'autres maladies telles que le lupus ou en prévention des lucites.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PLAQUENIL®

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais PLAQUENIL :

- si vous êtes allergique à l'hydroxychloroquine, à ses dérivés ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez une rétinopathie (maladie de la rétine) ;
- si vous allaitez ;
- chez l'enfant de moins de 6 ans, car il existe un risque de fausse route et d'étouffement ;
- en cas de co-administration avec le citalopram, l'escitalopram, l'hydroxyzine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété) ou la dompéridone (médicament contre les vomissements) ou la pipéperazine (médicament utilisé pour traiter le paludisme).

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre PLAQUENIL. Ce médicament ne doit être pris que sous surveillance médicale.

Tes jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux effets toxiques de PLAQUENIL. Par conséquent, suivez ce médicament hors de la portée des enfants.

#### Avant le traitement

• Prévenez votre médecin si vous avez des troubles cardiaques : l'hydroxychloroquine peut provoquer des troubles du rythme cardiaque chez certains patients :

l'hydroxychloroquine doit être utilisée avec prudence si vous présentez un allongement de l'intervalle QT depuis votre naissance ou si vous avez des antécédents familiaux de ce trouble, si vous présentez un allongement de l'intervalle QT acquis (détecté par l'ECG, l'enregistrement de l'activité électrique du cœur), si vous avez des troubles cardiaques ou des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous avez un déséquilibre des électrolytes dans le sang (en particulier un taux faible de potassium ou de magnésium, voir rubrique « Autres médicaments et hydroxychloroquine »).

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de porphyrine (maladie du sang). En effet, chez les sujets atteints de porphyrine intermittente, ce médicament peut déclencher la survenue d'une crise aiguë de porphyrine.

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de psoriasis (maladie de la peau) : la prise de ce médicament peut entraîner une aggravation des lésions.

• Si vous avez une maladie grave du foie ou des reins : prévenez votre médecin qui adaptera la posologie de ce traitement à votre cas.

• Prévenez également votre médecin si vous (ou un membre de votre famille) êtes atteints d'un déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges) car un risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) existe avec d'autres médicaments de la même classe que PLAQUENIL.

Avant d'entreprendre un traitement prolongé avec PLAQUENIL, un bilan

ophtalmologique complet pourra vous être prescrit. Ce bilan sera répété au moins une fois par an, afin de dépister une atteinte de la rétine qui imposerait l'arrêt du traitement.

#### Pendant le traitement

- Si une perturbation visuelle se produit (acuité visuelle, vision des couleurs...) vous devez prévenir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

• surveillance régulière des cellules du sang peut être nécessaire pour certains patients.

• troubles cardiaques (cœur qui bat trop vite, trop lentement, ou de manière irrégulière) surviennent, vous devez prévenir immédiatement votre médecin. Le risque d'origine de problèmes cardiaques peut augmenter avec la dose. Par conséquent, je recommande doit être respectée. (Voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

• PLAQUENIL peut diminuer votre taux de sucre dans le sang. Demandez à votre médecin de vous informer des signes et symptômes éventuels d'une diminution du taux de sucre dans le sang. Un contrôle sanguin peut-être nécessaire.

• PLAQUENIL peut provoquer la survenue d'une rigidité musculaire, de mouvements soudains, de tremblements (troubles extrapyramidaux) (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

#### 3. médicaments et PLAQUENIL

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### Ne prenez jamais PLAQUENIL en association avec les médicaments suivants :

• citalopram, escitalopram, hydroxyzine (médicaments contre la dépression ou l'anxiété), dompéridone (médicament contre les vomissements) et pipéperazine (médicament contre le paludisme).

• Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre PLAQUENIL avec :

• d'halofantrine (médicament utilisé pour traiter des crises de paludisme aigu).

#### Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- ciclosporine (médicament utilisé pour diminuer les réactions immunitaires de l'organisme en cas de greffe d'organe ou de maladie auto-immune),
- hormones thyroïdiennes,
- topiques gastro-intestinaux, antiacides, kaolin, cimétidine, charbon (médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac, les douleurs digestives ou les ulcères digestifs). PLAQUENIL doit être pris à au moins deux heures d'intervalle avec les antiacides et le kaolin.

• Médicaments contre l'épilepsie ou médicaments pouvant influer sur l'épilepsie, en particulier le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine,

• médicaments contre le paludisme comme la méfloquine (car ils peuvent augmenter le risque de convulsion),

• insulin ou d'autres médicaments pour traiter le diabète,

• médicaments connus pour influer sur le rythme cardiaque, notamment les médicaments utilisés pour traiter les anomalies du rythme cardiaque (anti-arythmiques), la dépression (antidépresseurs tricycliques), les troubles psychiatriques

(antipsychotiques), les infections bactériennes (par exemple, moxifloxacine ou azithromycine), les infections par le VIH (par exemple, saquinavir), les infections fongiques (par exemple, flucanaïzole), les infections parasitaires (par exemple, pentamidine) ou le paludisme (par exemple, halofantrine).

• Médicaments connus pour interférer avec PLAQUENIL notamment les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques (par exemple, itraconazole), les infections bactériennes (par exemple, rifampicine, clarithromycine), les troubles lipidiques (par exemple, gemfibrozil), les infections au VIH (par exemple, ritonavir), les caillots sanguins (par exemple, dabigatran, clopidogrel), les maladies cardiaques (par exemple, digoxine, flecainide, propafenone ou métropolidol) et un traitement à base de plantes pour la dépression : le milletpérus.

#### PLAQUENIL avec des aliments et boisson :

Évitez de consommer du jus de pamplemousse, car il peut augmenter le risque d'effets secondaires.

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Contraception

l'hydroxychloroquine pourrait provoquer une altération des gènes. Par mesure de précaution, si vous êtes un homme ou une femme en âge d'avoir des enfants, il est conseillé d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 8 mois après la fin de votre traitement par PLAQUENIL.

# Plaquénil® 200 mg

Sulfate d'hydroxychloroquine

Comprimé pelliculé

## Veuillez lire attentivement contenu des informations

- Gardez cette notice. Vous avez des questions, interrogez votre pharmacien ou votre personnellement prescrit. Ne n'oubliez, même si les signes de l'effet indésirable sont de l'ordre d'un quelconque effet pharmacien. Ceci s'applique à dans cette notice. Voir rubrique 1.

## 1. QU'EST-CE QUE PLAQUENIL® Classe pharmaco-thérapeutique

PLAQUENIL appartient à une famille de médicaments appelés autres anti-rhumatisants musculo-squelettiques.

Ce médicament contient du sulfate d'hydroxychloroquine.

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué pour traiter les maladies articulaires d'origine inflammatoire, telles que la polyarthrite rhumatoïde, ou d'autres maladies telles que le lupus ou en prévention des lucites.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PLAQUENIL®

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais PLAQUENIL :

- si vous êtes allergique à l'hydroxychloroquine, à ses dérivés ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez une rétinopathie (maladie de la rétine) ;
- si vous allaitez ;
- chez l'enfant de moins de 6 ans, car il existe un risque de fausse route et d'étouffement ;
- en cas de co-administration avec le citalopram, l'escitalopram, l'hydroxyzine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété) ou la dompéridone (médicament contre les vomissements) ou la pipéraquine (médicament utilisé pour traiter le paludisme).

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre PLAQUENIL. Ce médicament ne doit être pris que sous surveillance médicale.

Tes jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux effets toxiques de PLAQUENIL. Par conséquent, suivez ce médicament hors de la portée des enfants.

#### Avant le traitement

• Prévenez votre médecin si vous avez des troubles cardiaques : l'hydroxychloroquine peut provoquer des troubles du rythme cardiaque chez certains patients :

l'hydroxychloroquine doit être utilisée avec prudence si vous présentez un allongement de l'intervalle QT depuis votre naissance ou si vous avez des antécédents familiaux de ce trouble, si vous présentez un allongement de l'intervalle QT acquis (détecté par l'ECG, l'enregistrement de l'activité électrique du cœur), si vous avez des troubles cardiaques ou des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous avez un déséquilibre des électrolytes dans le sang (en particulier un taux faible de potassium ou de magnésium, voir rubrique « Autres médicaments et hydroxychloroquine »).

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de porphyrine (maladie du sang). En effet, chez les sujets atteints de porphyrine intermittente, ce médicament peut déclencher la survenue d'une crise aiguë de porphyrine.

• Prévenez votre médecin si vous êtes atteint de psoriasis (maladie de la peau) : la prise de ce médicament peut entraîner une aggravation des lésions.

• Si vous avez une maladie grave du foie ou des reins : prévenez votre médecin qui adaptera la posologie de ce traitement à votre cas.

• Prévenez également votre médecin si vous (ou un membre de votre famille) êtes atteints d'un déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges) car un risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) existe avec d'autres médicaments de la même classe que PLAQUENIL.

Avant d'entreprendre un traitement prolongé avec PLAQUENIL, un bilan

ophtalmologique complet pourra vous être prescrit. Ce bilan sera répété au moins une fois par an, afin de dépister une atteinte de la rétine qui imposerait l'arrêt du traitement.

#### Pendant le traitement

- Si une perturbation visuelle se produit (acuité visuelle, vision des couleurs...) vous devez prévenir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

• surveillance régulière des cellules du sang peut être nécessaire pour certains patients.

• troubles cardiaques (cœur qui bat trop vite, trop lentement, ou de manière irrégulière) surviennent, vous devez prévenir immédiatement votre médecin. Le risque d'origine de problèmes cardiaques peut augmenter avec la dose. Par conséquent, je recommande doit être respectée. (Voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

• PLAQUENIL peut diminuer votre taux de sucre dans le sang. Demandez à votre médecin de vous informer des signes et symptômes éventuels d'une diminution du taux de sucre dans le sang. Un contrôle sanguin peut-être nécessaire.

• PLAQUENIL peut provoquer la survenue d'une rigidité musculaire, de mouvements soudains, de tremblements (troubles extrapyramidaux) (voir rubrique 4 : « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

#### 3. médicaments et PLAQUENIL

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### Ne prenez jamais PLAQUENIL en association avec les médicaments suivants :

• citalopram, escitalopram, hydroxyzine (médicaments contre la dépression ou l'anxiété), dompéridone (médicament contre les vomissements) et pipéraquine (médicament contre le paludisme).

• Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre PLAQUENIL avec :

• d'halofantrine (médicament utilisé pour traiter des crises de paludisme aigu).

#### Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- ciclosporine (médicament utilisé pour diminuer les réactions immunitaires de l'organisme en cas de greffe d'organe ou de maladie auto-immune),
- hormones thyroïdiennes,
- topiques gastro-intestinaux, antiacides, kaolin, cimétidine, charbon (médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac, les douleurs digestives ou les ulcères digestifs). PLAQUENIL doit être pris à au moins deux heures d'intervalle avec les antiacides et le kaolin.

• Médicaments contre l'épilepsie ou médicaments pouvant influer sur l'épilepsie, en particulier le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine,

• médicaments contre le paludisme comme la méfloquine (car ils peuvent augmenter le risque de convulsion),

• insulin ou d'autres médicaments pour traiter le diabète,

• médicaments connus pour influer sur le rythme cardiaque, notamment les médicaments utilisés pour traiter les anomalies du rythme cardiaque (anti-arythmiques), la dépression (antidépresseurs tricycliques), les troubles psychiatriques (antipsychotiques), les infections bactériennes (par exemple, moxifloxacine ou azithromycine), les infections par le VIH (par exemple, saquinavir), les infections fongiques (par exemple, flucanaïzole), les infections parasitaires (par exemple, pentamidine) ou le paludisme (par exemple, halofantrine).

• Médicaments connus pour interférer avec PLAQUENIL notamment les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques (par exemple, itraconazole), les infections bactériennes (par exemple, rifampicine, clarithromycine), les troubles lipidiques (par exemple, gemfibrozil), les infections au VIH (par exemple, ritonavir), les caillots sanguins (par exemple, dabigatran, clopidogrel), les maladies cardiaques (par exemple, digoxine, flecainide, propafenone ou métropolidol) et un traitement à base de plantes pour la dépression : le milletpérus.

#### PLAQUENIL avec des aliments et boisson :

Évitez de consommer du jus de pamplemousse, car il peut augmenter le risque d'effets secondaires.

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Contraception

l'hydroxychloroquine pourrait provoquer une altération des gènes. Par mesure de précaution, si vous êtes un homme ou une femme en âge d'avoir des enfants, il est conseillé d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 8 mois après la fin de votre traitement par PLAQUENIL.



# OEDES® 20 mg

Microgranules gastro-résistants en gélules,  
boîtes de 7, 14, 28 et 56  
(Omeprazole)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

• Gardez cette notice, vous pourrez :

• Si vous avez d'autres questions, le pharmacien :

• Ce médicament vous a été donné par

jamais à d'autres personnes. Il pourra

signes de leur maladie sont identiques.

• Si vous ressentez un quelconque effet

médecin ou votre pharmacien. Cela

indésirable qui ne sera pas mentionné

dans la rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que OEDES® 20 mg et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OEDES® 20 mg?
3. Comment prendre OEDES® 20 mg?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver OEDES® 20 mg?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE OEDES® 20 mg, gélules ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique:

OEDES 20 mg contient la substance active Omeprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons.

Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

### Indications thérapeutiques:

OEDES 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes :

#### Chez les adultes :

- le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

#### Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg :

- le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régorgeation), des vomissements et une prise de poids limitée.

#### Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OEDES 20 mg, gélules gastro-résistante?

#### Contra-indications:

##### Ne prenez jamais oedes 20 mg, gélule :

- si vous êtes allergique à l'omeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans OEDES 20 mg.

- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanzoprazole, rabeprazole, ésopramazole).

- Si vous prenez un médicament contenant du néfénlavir (utilisé pour traiter l'infection par le Vih).

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas OEDES 20 mg, gélule gastro-résistante. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre OEDES 20 mg.

#### Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre OEDES 20 mg, gélule.

Des réactions cutanées graves, notamment le syndrome de Stevens-Johnson, la récurrence épidémique toxique, la réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS) et la pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), ont été rapportées en association avec le traitement par l'omeprazole. Arrêtez d'utiliser Oedes 20mg, gélule et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des symptômes liés à ces réactions cutanées graves décrites dans la rubrique 4.

OEDES 20 mg peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre OEDES 20 mg ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :

- Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes à avaler.
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.
- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

- Vous avez des selles noires (tincture de sang).
- Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'omeprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.
- Si vous êtes déjà arrivé de développer une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à OEDES qui réduit l'acide de l'estomac.

- Vous devez effectuer un examen sanguin spécifique (Chromogranine A). Si vous prenez OEDES 20 mg au long-cours (durée supérieure à 1 an), votre médecin vous surveillera probablement de façon régulière. Vous

l'arrêt de l'administration de OEDES 20 mg :

- Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K, une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES 20 mg;
- Rifampicine (utilisé pour la tuberculose);
- Atazanavir (utilisé pour le VIH);
- ...

se dans le traitement de la

éudication intermittente);

le sang (thrombus).

trappe à forte dose dans une forte dose de

temporairement arrêter votre

gastro-résistante.

les antibiotiques suivants : amoxicilline

avec OEDES 20 mg pour le traitement d'un ulcère à

pylori, il est important que vous informez votre médecin de

tous les autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Voir Posologie.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies

alternatives :

Sans objet.

Grossesse, Allaitement et Fertilité:

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

l'omeprazole est excreté dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il y ait une influence sur l'enfant lorsqu'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre OEDES 20 mg pendant l'allaitement.

Sportifs: Sans objet.

Conduite de véhicule et utilisation des machines:

OEDES n'est pas susceptible d'entraîner des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Des effets secondaires tels qu'un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire (peut éventuellement indésirable). Si c'est le cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

Mentions relatives aux exceptions à effet notoire :

OEDES 20 mg, gélule contient du saccharose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le, avant de prendre ce médicament.

OEDES 20 mg, gélule contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par gélule, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

## 3. COMMENT PRENDRE OEDES 20 mg, gélule gastro-résistante ?

VEUILZ TOUJOURS À PRENDRE CE MÉDICAMENT EN SUIVANT EXACTEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

Posologie :

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous:

#### Utilisation chez les adultes:

Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitation acide:

- Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.

- La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 2 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.

- Si l'ulcère n'a pas été complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 4 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.

- Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

Prévention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique :

- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.

Traitement de l'ulcère duodénal et gastrique provoqué par des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Prévention des ulcères du duodénum et de l'estomac si vous prenez des AINS :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par Helicobacter pilori:

- La dose recommandée est de 20 mg d'OEDES 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.

• Votre médecin va vous prescrire en même temps deux antibiotiques parmi l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est de 60 mg par jour.

- Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décide également de la durée pendant laquelle vous prendrez le médicament.

Utilisation chez les enfants et adolescents:

Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

## Si vous arrêtez de prendre OEDES 20 mg:

N'arrêtez pas de prendre OEDES 20 mg sans avis au préalable de votre médecin ou pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant peut éventuellement affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000 ou très rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000 mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

- Apnée soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruption cutanée, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réaction allergique grave).

- Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une récurrence épidémique toxique (rare).

- Éruption cutanée généralisée, température corporelle élevée et d'hypersensibilité aux médicaments (rare).

- Une éruption cutanée rouge, squameuse et généralisée avec des bosses sous la peau et des cloques, accompagnée de fièvre. Les symptômes apparaissent généralement au début du traitement (pustulose exanthématique aiguë généralisée) (rare).

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie (rare).

Les autres effets indésirables sont :

### Effets indésirables fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Maux de tête.

- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.

- Nausées ou vomissements.

- Polypes bénins dans l'estomac.

### Effets indésirables peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Gonflement des pieds et des chevilles.

- Troubles du sommeil (insomnie).

- Étourdissements, fourmillements, somnolence.

- Vertiges.

- Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.

- Eruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

- Malaise général, manque d'énergie.

### Effets indésirables rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses ou faciliter la survenue d'infections.

- Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.

- Agitation, confusion ou dépression.

- Troubles du goût.

- Troubles de la vue, tels que vision trouble.

- Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).

- Sécheresse buccale.

- Inflammation de l'intérieur de la bouche.

- Infection appelée « muguet » qui peut affecter l'intestin et est causé par un champignon.

- Perle de cheveux (alopecie).

- Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.

- Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).

- Problèmes rénaux sévères (néphrite interstitielle).

- Augmentation de la sueur.

### Effets indésirables très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).

- Agressivité.

- Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives.

- Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.

Erythème polymorphe.

• Faiblesse musculaire.

• Confusion des sens chez l'homme.

### Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut pas être estimé à partir des données disponibles).

• Inflammation de l'intestin (entrant dans les diarrhées).

• Si vous prenez OEDES 20 mg pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une déorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'examen sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium.

• Eruption cutanée, éventuellement avec des douleurs dans les articulations.

OEDES 20 mg peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donnez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

Déclaration des effets secondaires:

COOPER PHARMA  
PPV: 130,80 DH



# OEDES® 20 mg

## Microgranules gastrorésistants en gélule (Om)

Lisez attentivement l'intégralité de ce médicament. Elle contient des informations sur votre maladie. Si vous avez d'autres questions ou plus d'informations à notre sujet, gardez cette notice, vous pourrez la montrer à votre pharmacien.

### 1. Identification du médicament

Forme pharmaceutique et OEDES® 20 mg. Microgranule

de 7, 14, 28 et 56

### 2. Composition du médicament

#### Principes actives:

Oméprazole ..... 20 mg

#### EXCIPIENTS: q.s.p une gélule.

Excipient à effet notable: Saccharose.

#### 3. Classe pharmaco-thérapeutique:

OEDES® 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

#### 4. Indications thérapeutiques

OEDES® 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes:

##### Chez les adultes :

• le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

• les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

• les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES® 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

• un excès d'acide dans l'estomac dû à une gêneuse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

##### Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg :

• le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régorgeation), des vomissements et une prise de poids limitée.

##### Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

• les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

#### 5. Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

#### Posologie :

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous:

##### Utilisation chez les adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien, tels que brûlures et régurgitation acide.

Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.

La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal):

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 2 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.

Si l'ulcère n'a pas été complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique):

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4

gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme ou ananas) ou dans de la compote de pomme.

• Toujours remuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.

Si vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre. Les morceaux solides ne macheront pas.

gélule :  
• esprazole ou à l'un des autres  
20 mg.

inhibiteur de la pompe à protons  
lanzoprazole, rabeprazole,

et contenant du nelfinavir (utilisé

dans des crèmes ci-dessus, ne prenez pas istro-ré sistante. Si vous avez des

cin ou votre pharmacien avant de

prendre OEDES® 20 mg.

#### 7. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES® 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

• Apparition soudaine d'une respiration ralente, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

• Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation.

Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagnent d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrose épidermique toxique.

• Jaunisse, unnes foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• Maux de tête.

• Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.

• Nausées ou vomissements.

• Polypes bénins dans l'estomac.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• Gonflement des pieds et des chevilles.

• Troubles du sommeil (insomnie).

• Étouffements, fourmillements, somnolence.

• Vertiges.

• Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.

• Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

• Malaise général, manque d'énergie.

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

• Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses ou faciliter la survenue d'infections.

• Réactions allergiques, parfois très graves incluant le gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, de la fièvre, une respiration sifflante.

• Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.

• Agitation, confusion ou dépression.

• Troubles du goût.

• Troubles de la vue, tels que vision trouble.

• Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).

• Sécheresse buccale.

• Inflammation de l'intérieur de la bouche.

• Infection appelée « muguet » qui peut affecter l'intestin et est causée par un champignon.

• Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue.

• Perte de cheveux (alopecie).

• Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.

• Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).

• Problèmes rénaux sévères (néphrite interstitielle).

• Augmentation de la sueur.

Effets indésirables très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

• Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).

• Agressivité.

• Hépatite aiguë (inflammation chronique de la cavité hépatique).

• Vous avez des selles noires (teintées de sang).

• Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'oméprazole a été associé à une forte augmentation de diarrhées infectieuses.

• Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

• Si vous êtes déjà arrivé de développer une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à OEDES® qui réduit l'acide de l'estomac.

• Vous devez effectuer un examen sanguin spécifique (Chromogranine A).

Si vous prenez OEDES® 20 mg au long-cours (durée supérieure à un an), votre médecin vous surveillera probablement de façon régulière. Vous devrez définir précisément tous les symptômes et événements nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin. La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier au niveau des zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que possible, car vous devrez peut-être arrêter votre traitement avec OEDES® 20 mg. N'oubliez pas de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

#### Enfants :

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que celui-ci ne soit pas recommandé. Ne donnez pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou < 10 kg.

#### Mentions relatives aux excipients à effet notable :

En raison de la présence de Saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucre/somatotase (maladies héréditaires rares).

#### 9. Interactions avec d'autres médicaments:

##### Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. OEDES® 20 mg peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur OEDES® 20 mg.

Vous ne devez pas prendre OEDES® 20 mg si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

• Kétonazole, itraconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques);

• Digoxine (utilisée dans le traitement de problèmes cardiaques);

• Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire);

• Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie); si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES® 20 mg;

• Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K; une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES® 20 mg;

• Rifampicin (utilisé pour traiter la tuberculose);

• Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection VIH);

• Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe);

• Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée);

• Cilostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente);

• Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH);

• Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus));

• Etofénamate (utilisé dans le traitement du cancer).

• Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) - si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante.

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec OEDES® 20 mg pour le traitement d'un ulcère à Helicobacter pylori, il est important que vous informez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

#### Interactions avec les aliments et les boissons :

##### Viens Posologie.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

#### 10. Grossesse, Allaitement et Fertilité:

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.









**Dr Hind Bouziane Oumghari**

Spécialiste en Médecine Interne  
Lauréate de la Faculté de Médecine  
de Casablanca et Bordeaux

Maladies de système - Rhumatologie  
Grands syndromes - Pathologie vasculaire  
Diabétologie - Nutrition - Gériatrie

**د. هند بوزيان أومغاري**  
إختصاصية في الأمراض الباطنية  
خريجة كلية الطب  
بالدار البيضاء و بوردو  
الأمراض المجموعة - أمراض الروماتيزم  
المتلازمات الكبيرة - أمراض الشرايين  
داء السكري - التغدية - طب الشيخوخة

Casablanca, le :

24.01.2011

meilleure  
Zhou

meilleur système

Dr. MECHAL Hana  
Cardiologue  
N° 23, Casablanca  
95, Avenue Bachir Laalaj, 2ème étage, 3ème étage, 09 06 55 99 71 90

checkup  
cardiologie

ECG + Echocardiogram

Dr. Hind Bouziane  
Spécialiste En Médecine Interne  
ED. Abdelloumen, Rue Bachir Laalaj, N°9  
3ème étage, 17ème étage, Casablanca

Bd. Abdelloumen, Rue Bachir Laalaj N°9, Im. Oushima 1, 3ème étage, 17ème étage, Casablanca  
شارع عبد المؤمن، رقم 9 رفقة البشير لعلج، إقامة أوسمان 1، ط 3 رقم 17 - الدار البيضاء

Tél. : 05 22 98 59 86 - 06 94 31 55 57 • E-mail : hind\_bouziane@hotmail.fr


# Dr Hind Bouziane Oumghari

Spécialiste en Médecine Interne  
Lauréate de la Faculté de Médecine  
de Casablanca et Bordeaux

Maladies de système - Rhumatologie  
Grands syndromes - Pathologie vasculaire  
Diabétologie - Nutrition - Gériatrie

د. هند بوزيان أومغاري  
إختصاصية في الأمراض الباطنية  
خريجة كلية الطب  
بالدارالبيضاء و بوردو

الأمراض المجموعة - أمراض الروماتيزم  
المتلازمات الكبيرة - أمراض الشرايين  
داء السكري - التغذية - طب الشيخوخة



Casablanca, le :

27-02-09

Mme chouiekh  
Zlouci

51,10 x 6

Plaque en métal  
14 x 210

140,00  
99,00

oldes  
et Zlouci

545,60

Corvallis 2009/12

Bd. Abdelmoumen, Rue Bachir Laala N°9 Im. Oushmane 1, 3<sup>eme</sup> étage, n°17 - Casablanca  
شارع عبد المنعم، رقم 9 زهة المصطفى العلچ، إقامة أوسمان 1، الطابق 3، رقم 17 - الدار البيضاء

Té. : 05 22 98 59 86 - 06 94 31 55 57 • E-mail : hind\_bouziane@hotmail.fr

LAZMACIE HAY Raja  
Hicham ABOU TAKA  
Dr. Hind Bouziane  
125 Bis, Avenue Lazmacie  
Hay Raja L'Hermitage  
Casablanca - Tél: 05 22 86 00 20

38

15/05

38

31

34

23/6/03

~~cardioflex - today~~

1/5

**Dr. Hind Bouziane**  
Spécialiste En Médecine Interne  
et Néphrologue  
Rue Beni Laâjaj, N°9  
Casablanca - 10ème étage, N°17  
Tél. 0524 58 59 66 - 06 54 31 55 57

~~deux~~