

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes de médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi 09-03 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allai Ben Abdellah - 5ème Etage Angle Rue Mohamed Fikri et Rue Allai Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

198591

Maladie

Dentaire

Optique

Au

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5096

Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL JOUTAIDI Abdennasser


Date de naissance : 1-1-1955

Adresse : lot Islame n° 164 Cte Sidi

Tél. : 0661396575 Total des frais engagés :

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : El Joutaïdi Abdennasser Age :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attent médecin conseil et à la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07 FEV 2024	ca	2000	
20/02/2024	CT		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Chet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE RAWYA DR SALBAOU Youssef Casablanca 347 Bis Bloco E Lissasfa 20/02/2024	20/02/2024	559,20

Tél : 0522 65 08 54 ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Chet et signature du docteur et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Chet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient DES TRAVAUX

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
	H 25533412 21433552 D 00000000 00000000 G 00000000 00000000 B 35533411 11433553

Docteur Rouda CHEIKH

MÉDECINE GÉNÉRALE

Diplômée en Échographie

CHU Ibn Rochd

Médecin du Travail Diplômée
de la Faculté de Médecine de Rennes

الدكتورة روضة الشيخ

الطب العام

دبلوم في الفحص بالصدى

مستشفى ابن رشد

طبية إختصاصية في الطب المهني

خريجة كلية الطب بربان

Casablanca , le

20 FEV 2024

الدار البيضاء في

PHARMACIE RAWYA

Dr SALBAOUI Youssef
347 Bis Bloc E Lissasta 2
Casablanca

Erläuft an den Abnehmer

1) Vitamine D3 Bon 20000

2019+3 Jaar / us (Kapseln)

2) Lipofer

2) B12-vitamin 1000 mcg

150,000 (150000)

PHARMACIE RAWYA

Dr SALBAOUI Youssef
347 Bis Bloc E Lissasta 2
Casablanca
Tél : 0522 65 08 54

Dr CHEIKH Rouda
Médicin Généraliste
Immeuble 165 - Appartement 5 - Sidi Maârouf - Casablanca

الهاتف المحمول : 06 39 82 37 12 GSM :

حي النسيم عمارة 165 عيادة رقم 5 - سidi معروف - الدار البيضاء

Cité Nassim - Immeuble 165 - Appt. 5 - Sidi Maârouf - Casablanca

559.20

ARGENT COLLOIDAL

Pommade à 5%

Tube de 5 g

Composition :

Argent colloïdal	5 g
Excipients (dont lanoline) q.s.p.	100 g

2CS005.V01

الفضة الغروانية

مرهم 5%
أنبوب من 5 غ

ARGENT COLLOIDAL
Pommade à 5%
Tube de 5 g

PROMOPHARM S.A.




6 118000 240013

ARGENT COLLOIDAL
Pommade à 5 %


برموفارم س.ا.
PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc

Indications : Plaies, abcès, furoncles, anthrax.
Mode d'emploi : 2 à 3 applications par jour.



DOLOSTOP 500 mg, comprimé effervescent DOLOSTOP 1000 mg, comprimé effervescent

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques,

Cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

PRÉSENTATION

DOLOSTOP 500 mg comprimé, boîte de 20.

DOLOSTOP 1000 mg comprimé, boîte de 8.

DOLOSTOP 500 mg comprimé effervescent, boîte de 16.

DOLOSTOP 1000 mg comprimé effervescent, boîte de 8.

COMPOSITION

Substance active : Paracétamol

DOLOSTOP 500 mg comprimé, contient 500 mg de paracétamol par comprimé.

DOLOSTOP 1000 mg comprimé, contient 1000 mg de paracétamol par comprimé.

DOLOSTOP 500 mg comprimé effervescent, contient 500 mg de paracétamol par comprimé.

DOLOSTOP 1000 mg comprimé effervescent, contient 1000 mg de paracétamol par comprimé.

Excipients

DOLOSTOP 500 mg comprimé, q.s.p 1 comprimé

DOLOSTOP 1000 mg comprimé, q.s.p 1 comprimé

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.
- En cas de problème de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation, DOLOSTOP doit être utilisé avec précaution.
- Dolostop 500 mg comprimé effervescent contient 366 mg de sodium par comprimé effervescent. DOLOSTOP 1000 mg comprimé effervescent contient 418 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.
EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

Signalez que vous ou votre enfant prenez Dolostop si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang.

Si vous ou votre enfant prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS, LES BOISSONS ET L'ALCOOL

Sans objet

INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYTOTHERAPIE OU THERAPIES ALTERNATIVES

Sans objet

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

SPORTIFS

Sans objet

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VÉHICULES OU À UTILISER DES MACHINES

Sans objet

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

- DOLOSTOP 500 mg comprimé et DOLOSTOP 1000 mg comprimé : Sans objet
- DOLOSTOP 500 mg comprimé effervescent et DOLOSTOP 1000 mg comprimé effervescent : Sodium

POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FRÉQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT

MALNUTRITION CHRONIQUE

DÉSHYDRATATION

Si vous avez l'impression que l'effet de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

DOLOSTOP 500 mg et DOLOSTOP 1000 mg comprimés :

Les comprimés sont à avaler tels quels avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruit).

DOLOSTOP 500 mg et DOLOSTOP 1000 mg comprimés effervescents:

Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau; boire immédiatement après.

Fréquence d'administration

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

Chez l'enfant, elles doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de **6 heures** et d'au moins 4 heures.

Chez l'adulte, elles doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de **8 heures** minimum.

DURÉE DU TRAITEMENT

La durée du traitement est limitée:

- à 5 jours en cas de douleurs
- à 3 jours en cas de fièvre Si les douleurs persistent plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

SURDOSSAGE

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence un médecin.

INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

SAPHIR® 1000 mg/125 mg

Poudre pour suspension buvable en sachet
Boîtes de 12, 16 et 24.

(Amoxicilline /Acide Clavulanique)



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être donné à d'autres personnes, maladie sont identiques.
- Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessus surviennent, n'en parlez pas à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- 1) Qu'est-ce que SAPHIR®?
- 2) Quelles sont les indications de SAPHIR®?
- 3) Comment prendre SAPHIR®?
- 4) Quels sont les effets indésirables de SAPHIR®?
- 5) Comment conserver SAPHIR®?
- 6) Informations supplémentaires.

1) QU'EST-CE QUE SAPHIR®?

SAPHIR® est un antibiotique qui contient deux molécules : l'amoxicilline et l'acide clavulanique. SAPHIR® est utilisé dans les infections de l'oreille, des voies respiratoires supérieures, des voies respiratoires inférieures, de la peau et des os.

2) QUELLES SONT LES INDICATIONS DE SAPHIR® 1G/125MG?

Si votre médecin vous a prescrit SAPHIR® 1G/125MG, il vous a fait cela avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais SAPHIR® si :

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6,
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou,
- Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

Ne prenez pas SAPHIR® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessous.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SAPHIR®.

Faites attention avec SAPHIR® 1g/125mg :

Adresssez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SAPHIR® 1g/125mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SAPHIR®.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière :

SAPHIR® peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez SAPHIR®, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires :

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier/ère que vous prenez SAPHIR®. En effet, SAPHIR® peut influer sur les résultats de ces types de tests.

ENFANTS

Sans objet.

Prises d'autres médicaments et SAPHIR® 1g/125mg :

LOT : M 1651
PER : 05-26
PPV : 116DHO



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous pourriez prendre tout autre médicament. Si vous prenez de l'allopurinol, une réaction cutanée allergique peut survenir. Si vous prenez du probénécide, décidez d'ajuster votre dose. Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation (comme la warfarine) sont pris avec SAPHIR®, elles peuvent être requises.

SAPHIR® peut influer sur l'acné, le cancer ou les maladies rhumatisantes. SAPHIR® peut influer sur l'acné, le cancer ou les maladies rhumatisantes.

Conseils pour les personnes qui ont des maladies chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

Conseils pour les personnes qui ont des malades chroniques : SAPHIR® peut entraîner des réactions allergiques.

AGIDERM 2%, Crème

Acide Fusidique

Voie cutanée

Tube de 15 g

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice ou par votre pharmacien ou votre médecin.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1) Qu'est-ce que AGIDERM 2%, crème et dans quels cas est-il utilisé ?

2) Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AGIDERM 2%, crème ?

3) Comment prendre AGIDERM 2%, crème ?

4) Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5) Comment conserver AGIDERM 2%, crème ?

6) Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que AGIDERM 2%, crème et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Antibiothérapie locale, code ATC : D06AX01.

L'acide fusidique est un antibiotique de structure stéroïdienne, de la famille des fusidanines.

Indications thérapeutique : Ce médicament est préconisé dans le traitement des infections de la peau provoquées par une bactérie appartenant à la famille des staphylocoques ou des streptocoques.

➤ impétigo et dermatoses impétiginiseuses :

• en traitement local uniquement dans les formes localisées à petit nombre de lésions ;

• en traitement local d'appoint en association à une antibiothérapie générale adaptée dans les formes les plus étendues ;

➤ Désinfection des gîtes microbien cutanéo-muqueux, chez les porteurs sains de staphylocoques, et après staphylococcie, notamment furunculose.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AGIDERM 2%, crème ?

Contre-indications :

N'utilisez jamais AGIDERM 2%, crème : Si vous êtes allergique à l'acide fusidique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

En cas de doute, il est nécessaire de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi : Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser AGIDERM 2%, crème. Ce médicament contient de la Glycérine, l'Alcool cétostéarylique, Hydroxybenzoate de méthyle et hydroxybenzoate de propyle qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales. En cas d'utilisation de AGIDERM sur le visage, la zone proche de l'œil doit être évitée, car les excipients présents dans la forme pommade peuvent provoquer des irritations de la conjonctive.

Interactions médicamenteuses : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Aliments, boissons et de l'alcool : Sans objet.

Grossesse et allaitement : Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous allaitez, n'appliquez pas AGIDERM sur le sein. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : AGIDERM n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Excipients à effet notable : Ce médicament contient de la Glycérine, l'Alcool cétostéarylique, Hydroxybenzoate de méthyle et hydroxybenzoate de propyle qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales

3. Comment prendre AGIDERM 2%, crème ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie : Applications locales avec ou sans pansement, une ou deux fois par jour, après nettoyage de la zone infectée.

Evitez l'application en couche épaisse.

Durée du traitement : A titre indicatif, le traitement est limité à une semaine.

Si vous avez utilisé plus de AGIDERM 2%, crème que vous n'auriez dû : La survenue d'un surdosage est peu probable.

Veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser AGIDERM 2%, crème : N'appliquez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'appliquer.

Si vous arrêtez d'utiliser AGIDERM 2%, crème : Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables peu fréquents pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :

• Réactions cutanées locales (y compris dermatite de contact, eczéma) • Éruption cutanée (rash) • Démangeaison (prurit), rougeur de la peau (érythème) • Douleur au site d'application (y compris sensation de brûlure cutanée), irritation au site d'application

Effets indésirables rares, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

• Réaction allergique • Conjunctivite • Gonflement du cou et du visage • Urticaire • Cloque (phlyctène)

Si l'un des effets indésirables est grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires : Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc :

Site internet : <http://www.cappm.ma/>

5. COMMENT CONSERVER AGIDERM 2%, crème ?

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption figurant sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) et en excipients :

AGIDERM 2%, crème :

ACIDE FUSIDIQUE

Excipient q.s.p

0,315 g

Les autres composants sont : Alcool cétostéarylique, Paraffine Blanche molle, Polyoxy 40 stéarate, Paraffine liquide, Isopropyl myristate. Glycérine, Hydroxybenzoate de méthyle, Hydroxybenzoate de propyle, Eau déminéralisée

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : 24/03/2020

Tableau A (Liste I)







Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA

Z.I.12 Tit Mellil - Casablanca -

PRLAGI01V01 MP EHS

ARYAWASI SIDAMIAH





13080

MÉDECINE GÉNÉRALE

Diplômée en Échographie
CHU Ibn Rochd
Médecin du Travail Diplômée
de la Faculté de Médecine de Rennes

Casablanca, le

07 FEV 2024

الدار البيضاء في

دبلوم في الفحص بالصدى
بمستشفى ابن رشد
طبيبة اختصاصية في الطب المهنئ
خريجة كلية الطب ببرلين

Affenasser Elphant

~~PHARMACIE RAWWA
Dr SALBAOUI Youssef
Bis Blocc Lissasca
347 08 55 65 08 54
Tel: 052 22 65 08 54~~

~~PHARMACIE RAWWA
Dr SALBAOUI Youssef
Bis Blocc Lissasca
347 08 55 65 08 54
Tel: 052 22 65 08 54~~

1) Saphir (Ag) 1.5g x 24

2) Dolos (Ag) 1.5g x 18

3) Agt Serine 1.5g x 12

4) Argent coll 1.5g x 12

5) Agt Serine 1.5g x 12

6) Agt Serine 1.5g x 12

GSM: 06 39 82 37 12 الهاف المحمول:

دار النشر والطباعة المعمول - ١٦٥ عبادة رقم ٥ - سيدى معروف - الدار البيضاء

حي النسيم عمارة 165 عيادة رقم 5 - سيدى معروف - الدار البيضاء
Cité Nassim, Bâtiment 165, Avenue 5, Sidi Mârouf, Casablanca

Cité Nassim - Immeuble 165 - Appt. 5 - Sidi Maârouf - Casablanca