

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00626

Société : Royal 198290

Actif  Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Tadili Sidi Redaoui


Date de naissance : 07/08/19\*\*

Adresse : 17 Rue Al 67 TANIA - RABAT

Téléphone : 0661390226 Total des frais engagés : 2216,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 18/12/2023

Nom et prénom du malade : Tadili Sidi Redaoui Age : 79 ans

Lien de parenté :  Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : HTA



En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : RABAT Le : 18/12/2023

Signature de l'adhérent(e) :



#### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 13/12/2023      | Cst<br>ECC        | 300.00<br>D.S.        | ✓                               | EL VILLARIC<br>A. M. M. T. 05 37 67 06 93                      |

## EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur  | Date     | Montant de la Facture |
|---|----------|-----------------------|
| <br>Pharmacie de Kebibat<br>FEDRATI Med Pharmaciens<br>Rue Sbaoui Kebibat - Rabat<br>Tel: 0537 69 05 07<br>INPE: 102036316 | 18.12.23 | 19.16.60              |

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|------|------------------------------|------------------------|
|   |      |                              |                        |
|   |      |                              |                        |
|   |      |                              |                        |
|   |      |                              |                        |
|   |      |                              |                        |

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

| H        |          |
|----------|----------|
| 25533412 | 21433552 |
| 00000000 | 00000000 |

(Création, remont, adjonction)  
ctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET GACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. EL OUARDIGHI Kaoutar

Spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux

Ancienne Cardiologue de l'Hôpital Érasme de Bruxelles - Belgique

Ancienne Interne du CHU Ibn Sina de Rabat

Diplôme de Cardiologie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

Diplôme d'Échocardiographie et d'imagerie vasculaire  
non invasive de l'Université de Bordeaux - France

د. الورديغي كوثر

أخصائية في أمراض القلب والشرايين

طبيبة سابقة في مستشفى ارامز بروكسل - بلجيكا

طبيبة داخلية سابقة في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط

دبلوم التخصص في أمراض القلب والشرايين من كلية الطب والصيدلة بالرباط

دبلوم في الفحص بالصدى والدوبلير من جامعة بوردو فرنسا

Rabat le: 18/12/2023

M<sup>me</sup> Tadili Sidi Redouen

34870.00  
1/ Cet-plexix 100/75 mg  
1 ap/j le matin

34185.00 21 Sulciat 10/1260/125 mg  
1 ap/j le matin

154110 31 Rosuvastatine Sandoz Long  
1 ap/j le soir ap r/é repas.

3496.00 41 Pragel 50 mg  
1 ap/j le matin r/é jeu

381.90 5/1 Ap 5 mg  
1 ap/j le soir

701,00

6,1 Ergic Jup  
hyp' le Soir

Dr. EL GUARDIGHI Kaoutar  
Spécialiste des maladies des vaisseaux  
16 Aouia 1  
Tel: 05 37 67 06 93

au beson

Pharmacie de Kebibat  
rue El Aouia 1  
Tel: 05 37 69 05 07  
NPE: 10203631F

Dr. EL GUARDIGHI Kaoutar  
Spécialiste des maladies des vaisseaux  
16 Aouia 1  
Tel: 05 37 67 06 93

$T = 1916,60$



# Prazol® 20 mg

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra être dangereux.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous n'avez pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

PPV: 96DH00  
PER: 03/26  
LOT: M2622-3

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol® 20 mg :

Oméprazole (DCI).

Excipients qsp.

## FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastro-résistants.
- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante contient la molécule d'oméprazole. Ce médicament appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons (I.P.P.). Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes : Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

## Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel  $\geq 10$  kg

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

## Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

- Maladie ulcéreuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

• Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

• Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Prazol® 20 mg  
Oméprazole

28 gélules



6 118000 041009



# Prazol® 20 mg

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra être dangereux.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous n'avez pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

PPV: 96DH00  
PER: 03/26  
LOT: M2622-3

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol® 20 mg :

Oméprazole (DCI).

Excipients qsp.

## FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastro-résistantes.
- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante contient la molécule d'oméprazole. Ce médicament appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons (I.P.P.). Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes : Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

## Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel  $\geq 10$  kg

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

## Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

- Maladie ulcéreuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

• Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

• Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Prazol® 20 mg  
Oméprazole

28 gélules



6 118000 041009



# Prazol® 20 mg

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra être dangereux.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous n'avez pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

PPV: 96DH00  
PER: 03/26  
LOT: M2622-3

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol® 20 mg :

Oméprazole (DCI).

Excipients qsp.

## FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastro-résistantes.
- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante contient la molécule active oméprazole. Ce médicament appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons (I.P.P.). Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes : Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

## Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel  $\geq 10$  kg

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

## Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

- Maladie ulcéreuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

• Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

• Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Prazol® 20 mg  
Oméprazole

28 gélules



6 118000 041009



AMEP® 5 mg & 10 mg, Comprimés  
Boîtes de 14, 28 & 56.

Amlodipine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été prescrit pour d'autres personnes. Il pourrait leur être prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables indésirables non mentionnés ci-dessous vous a été prescrit pour une maladie identique aux vôtres.

AMEP® 10mg  
14 comprimés



Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'AMEP® 5 & 10 mg comprimés ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMEP® 5 & 10 mg comprimés ?

3. Comment prendre AMEP® 5 & 10 mg comprimés ?

4. Quels sont les effets indésirables de AMEP® 5 & 10 mg comprimés ?

5. Comment conserver AMEP® 5 & 10 mg comprimés ?

6. Informations supplémentaires :

**1. Qu'est-ce que AMEP® comprimé ?**

AMEP® contient la substance active amlodipine, un médicament appartenant à la famille des inhibiteurs calciques. AMEP® est utilisé pour traiter l'angor, une crise cardiaque et certaines maladies de la circulation sanguine.

Chez les patients présentant des symptômes d'angor, AMEP® améliore la circulation sanguine dans le cœur et dans les muscles du cœur, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour la douleur thoracique liée à l'angor.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMEP® 5 & 10 mg comprimés ?**

**Ne prenez jamais AMEP® comprimé :**

• si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amlodipine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique composition, ou aux autres inhibiteurs calciques. Cela peut se manifester par des démangeaisons, des rougeurs de la peau ou des difficultés respiratoires.

• Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).

• Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur était incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

• Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

**Faites attention avec AMEP® comprimé :**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre AMEP®.

Vous devez informer votre médecin si vous présentez ou avez présenté l'une des conditions suivantes :

• crise cardiaque récente,

• insuffisance cardiaque,

• augmentation sévère de la pression artérielle (crise hypertensive),

• maladie du foie,

• vous êtes une personne âgée et votre dose a besoin d'être augmentée.

**Enfants et adolescents :**

AMEP® n'a pas été étudié chez l'enfant âgé de moins de 6 ans. AMEP® ne doit être utilisé que pour le traitement de l'hypertension chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans (voir rubrique 3). Pour des informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre médecin.

**Autres médicaments et AMEP® comprimés :**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

AMEP® peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments, tels que :

• le kétocozaïle, l'itraconazole (médicaments antifongiques),

• le ritonavir, l'indinavir, le nelfinavir (appelés inhibiteur de protéase utilisé pour traiter l'infection par le VIH),

• la rifampicine, l'érythromycine, la clarithromycine (antibiotiques),

• Hypericum perforatum (millepertuis),

• le vérapamil, le diltiazem (médicaments pour le cœur),

• le dantrolène (perfusion pour les augmentations sévères de la température corporelle),

• le tacrolimus, le sirolimus, le temsirolimus et l'éverolimus (médicaments utilisés pour modifier la manière dont le système immunitaire fonctionne),

• la simvastatine (médicament utilisé pour réduire le cholestérol),

• la ciclosporine (médicament immunsupresseur).

AMEP® peut diminuer votre pression artérielle encore davantage si vous prenez déjà

# ERGIC® 5 mg

Desloratadine

comprimés pelliculés, boîtes de 7, 14 et 30

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourraient leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ERGIC®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ERGIC®, comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE ERGIC®, comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ERGIC®, comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE ERGIC®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

Qu'est-ce que ERGIC® ?

ERGIC® contient de la desloratadine qui est un antihistaminique.

Comment prendre ERGIC® ?

ERGIC® est un médicament contre l'allergie qui ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

Indications thérapeutiques :

Quand ERGIC® doit-il être utilisé ?

ERGIC® soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens) chez les adultes et les adolescentes de 12 ans et plus. Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démarque, les démangeaisons du palais, les yeux qui démarquent, qui sont rouges ou larmoyants.

ERGIC® est aussi utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte secondaire provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariées.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ERGIC®, comprimé pelliculé ?

Contre-indications :

Ne prenez jamais ERGIC® :

Si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ou à la loratadine.

Mise en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ERGIC® :

- Si vous présentez une maladie des reins.

- Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de convulsions

Enfants et adolescents :

Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 12 ans.

Interactions avec d'autres médicaments :

Il n'y a pas d'interactions connues d'ERGIC® avec d'autres médicaments. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons :

ERGIC® peut être pris pendant ou en dehors des repas.

La plus grande prudence est recommandée si vous prenez de l'alcool en même temps que votre traitement par ERGIC®.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives : Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La prise d'ERGIC® n'est pas recommandée si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.

Fortification : Aucune donnée n'est disponible sur la fertilité chez l'humain.

Surfertilité : Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

À la dose recommandée, il est peu probable que ce médicament affecte votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Bien que la plupart des personnes ne ressentent pas de somnolence, il est néanmoins recommandé de tester votre réponse à ce médicament avant d'accomplir des activités exigeant une vigilance, telles que conduire des véhicules ou utiliser des machines.

## 3. COMMENT PRENDRE ERGIC®, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

Adultes et adolescents de 12 ans et plus :

La dose recommandée est d'un comprimé une fois par jour avec de l'eau, au moment ou des débuts des répats.

Mode et voies d'administration :

Ce médicament est destiné à la voie orale.

Avez le comprimé en entier.

Durée du traitement :

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera le type de rhinite allergique dont vous souffrez et déterminera la durée pendant laquelle vous devrez prendre ERGIC®. Si votre rhinite allergique est intermittente (présence de symptômes sur une période de moins de 4 jours par semaine ou sur une période inférieure à 4 semaines), votre médecin vous recommandera ce traitement pour une durée qui dépendra de l'évaluation des antécédents de votre maladie. Si votre rhinite allergique est persistante (présence de symptômes sur une période de 4 jours ou plus par semaine et pendant plus de 4 semaines), votre médecin peut vous recommander ce traitement pour une durée plus longue.

ERGIC® 5 mg

Desloratadine

comprimés pelliculés

P.P.V. : 70,00 DH

12/20

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/

# SULIAT® HCT

160 mg/5 mg/12,5 mg

160 mg/5 mg/25 mg

160 mg/10 mg/12,5 mg

160 mg/10 mg/25 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 & 28 et 56

Valsartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il porte des signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez le faire savoir à votre pharmacien.

## Qu'est-ce que cette notice ?

1- Qu'est-ce que SULIAT HCT et dans quel cas est-il utilisé ?

2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT HCT ?

3- Comment prendre SULIAT HCT ?

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5- Comment conserver SULIAT HCT ?

6- Informations supplémentaires

## 1- QU'EST-CE QUE SULIAT HCT ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique :

Code ATC: C09XXD1

Les comprimés de SULIAT HCT contiennent trois substances actives : Valsartan, Amlodipine et Hydrochlorothiazide. Ces substances contribuent au contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

– L'Amlodipine appartient à un groupe de substances appelées « inhibiteurs calciques ».

– Le Valsartan appartient à un groupe de substances appelées « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». Il empêche l'angiotensine II de se lier aux récepteurs dans les vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une diminution de la tension artérielle.

– L'Hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés « diurétiques ». Il augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Du fait de ces trois mécanismes, les vaisseaux sanguins se détendent et la tension artérielle diminue.

### Indications thérapeutiques :

SULIAT HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes dont la pression artérielle est élevée et qui peuvent bénéficier de la prise d'au moins deux substances.

## 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT HCT ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

#### Contre-indications :

Ne prenez jamais SULIAT HCT, comprimés pelliculés, en cas de :

- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT HCT en cas de grossesse.

- Si vous êtes allergique à l'Amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique, au Valsartan, à l'Hydrochlorothiazide (des médicaments utilisés pour traiter les infections pulmonaires ou urinaires) ou à l'un des autres composants de ce médicament.

- Si vous êtes diabétique ou vous avez une insuffisance rénale ( $DGF < 60 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$ ) et vous prenez SULIAT HCT avec des médicaments contenant de l'alcalin.

- Si vous prenez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT HCT et parlez-en à votre médecin.

- Si vous avez une maladie du foie, une destruction des petits canaux biliaires dans le foie (cirrhose biliaire) entraînant une accumulation de bile dans le foie (cholestérol).

- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

- Si vous êtes incapable d'uriner (anurie).

- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est trop bas malgré un traitement pour augmenter les taux sanguins de potassium ou de sodium.

- Si votre taux sanguin de calcium est trop élevé malgré un traitement pour réduire les taux sanguins de calcium.

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide unique dans les articulations).

- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).

- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

- Si vous souffrez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant d'alcalin pour diminuer la pression artérielle.

### Mises en garde, spéciales et précautions particulières d'emploi :

#### Faites attention avec SULIAT HCT :

- Si votre taux sanguin de potassium ou magnésium est bas (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasmes musculaires, rythme cardiaque anormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est bas (avec ou sans symptômes tels que fatigue, confusion, contractions musculaires, convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que nausées, vomissements, constipation, maux d'estomac, infections fréquentes, soif, faiblesses et contractions musculaires).

- Si vous avez des problèmes rénaux, si vous avez eu une greffe de rein ou si vous étiez informé que vous avez un rétrécissement de vos artères rénales.

- Si vous avez des problèmes hépatiques.

- Si vous avez ou si vous avez eu une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, en particulier s'il vous a été prescrit la dose maximale d'Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide (10 mg/320 mg/25 mg).

- Si vous avez présenté une crise cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut aussi vérifier votre fonction rénale.

- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).

- Si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrenales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de SULIAT HCT est déconseillée si vous êtes dans cette situation.

- Si vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythémateux disséminé (appelée également « lupus » ou « LED »).

- Si vous êtes diabétique (taux de sucre élevé dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs ou à des diurétiques (des médicaments utilisés pour augmenter la quantité d'urine produite), en particulier si vous souffrez d'asthme et d'allergies.

- Si vous êtes malade ( vomissements ou diarrhée ).

- Si vous avez présenté des gonflements, en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT HCT et contactez votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais reprendre SULIAT HCT.

- En cas de sensations vertigineuses et/ou d'évanouissements pendant le traitement par SULIAT HCT, prévenez votre médecin le plus rapidement possible.

- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou dans la semaine qui suivent la prise de SULIAT HCT. Cela peut entraîner des troubles de la vision permanents, en l'absence de traitement.

- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :

- Un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) (par exemple Enalapril, Lisinopril, Ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.

- Atiakine.

- Votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Risque accru de cancer de la peau non-mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) suite à l'exposition à des doses cumulatives croissantes d'hydrochlorothiazide (HCTZ):

- Les patients qui prennent l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à de signaler toute lésion cutanée suspecte.

- Les lésions cutanées suspectées doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

- Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir

une protection adéquate en cas d'exposition solaire ;

- L'utilisation d'HCTZ doit aussi être réévaluée avec attention. Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus, parlez-en à votre pharmacien.

L'utilisation de SULIAT HCT est par contre recommandée chez l'enfant.

**Sujets âgés (à partir de 65 ans)**

SULIAT HCT peut être utilisé par les personnes âgées de 65 ans et plus de manière identique à la prise actuelle des 3 substances apposées.

Notamment ceux prenant la dose maximale d'Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide pour diminuer leur pression artérielle, leur fonction rénale et leur diurétisme.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

plus important lorsque vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments, avec d'autres médicaments. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, il est recommandé de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant

# SULIAT® HCT

160 mg/5 mg/12,5 mg

160 mg/5 mg/25 mg

160 mg/10 mg/12,5 mg

160 mg/10 mg/25 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 & 28 et 56

Valsartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il porte des signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez le faire savoir à votre pharmacien.

## Qu'est-ce que cette notice ?

1- Qu'est-ce que SULIAT HCT et dans quel cas est-il utilisé ?

2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT HCT ?

3- Comment prendre SULIAT HCT ?

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5- Comment conserver SULIAT HCT ?

6- Informations supplémentaires

## 1- QU'EST-CE QUE SULIAT HCT ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique :

Code ATC: C09XXD1

Les comprimés de SULIAT HCT contiennent trois substances actives : Valsartan, Amlodipine et Hydrochlorothiazide. Ces substances contribuent au contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

– L'Amlodipine appartient à un groupe de substances appelées « inhibiteurs calciques ».

– Le Valsartan appartient à un groupe de substances appelées « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». Il empêche la rétrécissement des vaisseaux sanguins, avec pour effet de diminuer la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

– L'Hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés « diurétiques ». Il aide à augmenter le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Du fait de ces trois mécanismes, les vaisseaux sanguins se détendent et la tension artérielle diminue.

### Indications thérapeutiques :

SULIAT HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes dont la pression artérielle est élevée et qui peuvent bénéficier de la prise d'au moins deux substances.

## 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT HCT ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

#### Contre-indications :

Ne prenez jamais SULIAT HCT, comprimés pelliculés, en cas de :

- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT HCT en cas de grossesse.

- Si vous êtes allergique à l'Amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique, au Valsartan, à l'Hydrochlorothiazide (des médicaments utilisés pour traiter les infections pulmonaires ou urinaires) ou à l'un des autres composants de ce médicament.

- Si vous êtes diabétique ou vous avez une insuffisance rénale (DFG <60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>) et vous prenez SULIAT HCT avec des médicaments contenant de l'alcalin.

- Si vous prenez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT HCT et parlez-en à votre médecin.

- Si vous avez une maladie du foie, une destruction des petits canaux biliaires dans le foie (cirrhose biliaire) entraînant une accumulation de bilie dans le foie (cholestérol).

- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

- Si vous êtes incapable d'uriner (anurie).

- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est trop bas malgré un traitement pour augmenter les taux sanguins de potassium ou de sodium.

- Si votre taux sanguin de calcium est trop élevé malgré un traitement pour réduire les taux sanguins de calcium.

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide unique dans les articulations).

- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).

- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

- Si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traitée(e) par un médicament contenant d'alcalin pour diminuer la pression artérielle.

### Mises en garde, spéciales et précautions particulières d'emploi :

#### Faites attention avec SULIAT HCT :

- Si votre taux sanguin de potassium ou magnésium est bas (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasmes musculaires, rythme cardiaque anormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est bas (avec ou sans symptômes tels que fatigue, confusion, contractions musculaires, convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que nausées, vomissements, constipation, maux d'estomac, infections fréquentes, soif, faiblesses et contractions musculaires).

- Si vous avez des problèmes rénaux, si vous avez eu une greffe de rein ou si vous étiez informé que vous avez un rétrécissement de vos artères rénales.

- Si vous avez des problèmes hépatiques.

- Si vous avez ou si vous avez eu une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, en particulier s'il vous a été prescrit la dose maximale d'Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide (10 mg/320 mg/25 mg).

- Si vous avez présenté une crise cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut aussi vérifier votre fonction rénale.

- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).

- Si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrenales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de SULIAT HCT est déconseillée si vous êtes dans cette situation.

- Si vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythémateux disséminé (appelée également « lupus » ou « LED »).

- Si vous êtes diabétique (taux de sucre élevé dans le sang).

- Si vous avez une maladie de cholestérol ou de triglycérides très élevé.

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs ou à des diurétiques (des médicaments utilisés pour augmenter la quantité d'urine produite), en particulier si vous souffrez d'asthme et d'allergies.

- Si vous êtes malade ( vomissements ou diarrhée ).

- Si vous avez présenté des gonflements, en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT HCT et contactez votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais reprendre SULIAT HCT.

- En cas de sensations vertigineuses et/ou d'évanouissements pendant le traitement par SULIAT HCT, prévenez votre médecin le plus rapidement possible.

- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou dans la semaine qui suivent la prise de SULIAT HCT. Cela peut entraîner des troubles de la vision permanents, en l'absence de traitement.

- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :

- Un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) (par exemple Enalapril, Lisinopril, Ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.

- Atiakine.

- Votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Risque accru de cancer de la peau non-mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) suite à l'exposition à des doses cumulatives croissantes d'hydrochlorothiazide (HCTZ):

- Les patients qui prennent l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à de signaler toute lésion cutanée suspecte.

- Les lésions cutanées suspectées doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

- Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir

une protection adéquate en cas d'exposition solaire ;

- L'utilisation d'HCTZ doit aussi être réévaluée avec attention. Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus, parlez-en à votre pharmacien.

L'utilisation de SULIAT HCT est par contre recommandée chez l'enfant.

**Sujets âgés (à partir de 65 ans)**

SULIAT HCT peut être utilisé par les personnes âgées de 65 ans et plus de manière identique à la prise actuelle des 3 substances apposées.

Notamment ceux prenant la dose maximale d'Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide pour diminuer leur pression artérielle, leur fonction rénale et leur diurétisme.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important lorsque vous prenez plusieurs médicaments.

# SULIAT® HCT

160 mg/5 mg/12,5 mg

160 mg/5 mg/25 mg

160 mg/10 mg/12,5 mg

160 mg/10 mg/25 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 & 28 et 56

Valsartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il porte des signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez le faire savoir à votre pharmacien.

## Qu'est-ce que cette notice ?

1- Qu'est-ce que SULIAT HCT et dans quel cas est-il utilisé ?

2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT HCT ?

3- Comment prendre SULIAT HCT ?

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5- Comment conserver SULIAT HCT ?

6- Informations supplémentaires

## 1- QU'EST-CE QUE SULIAT HCT ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique :

Code ATC: C09XXD1

Les comprimés de SULIAT HCT contiennent trois substances actives : Valsartan, Amlodipine et Hydrochlorothiazide. Ces substances contribuent au contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

– L'Amlodipine appartient à un groupe de substances appelées « inhibiteurs calciques ».

– Le Valsartan appartient à un groupe de substances appelées « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». Il empêche l'angiotensine II de se lier aux récepteurs dans les vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une diminution de la tension artérielle.

– L'Hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés « diurétiques ». Il augmente le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle.

Du fait de ces trois mécanismes, les vaisseaux sanguins se détendent et la tension artérielle diminue.

### Indications thérapeutiques :

SULIAT HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes dont la pression artérielle est élevée et qui peuvent bénéficier de la prise d'au moins deux substances.

## 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT HCT ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

#### Contre-indications :

Ne prenez jamais SULIAT HCT, comprimés pelliculés, en cas de :

- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT HCT en cas de grossesse.

- Si vous êtes allergique à l'Amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique, au Valsartan, à l'Hydrochlorothiazide (des médicaments utilisés pour traiter les infections pulmonaires ou urinaires) ou à l'un des autres composants de ce médicament.

- Si vous êtes diabétique ou vous avez une insuffisance rénale ( $DGF < 60 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$ ) et vous prenez SULIAT HCT avec des médicaments contenant de l'alcalin.

- Si vous prenez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT HCT et parlez-en à votre médecin.

- Si vous avez une maladie du foie, une destruction des petits canaux biliaires dans le foie (cirrhose biliaire) entraînant une accumulation de bilie dans le foie (cholestérolate).

- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.

- Si vous êtes incapable d'uriner (anurie).

- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est trop bas malgré un traitement pour augmenter les taux sanguins de potassium ou de sodium.

- Si votre taux sanguin de calcium est trop élevé malgré un traitement pour réduire les taux sanguins de calcium.

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide unique dans les articulations).

- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).

- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

- Si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant d'alcalin pour diminuer la pression artérielle.

### Mises en garde, spéciales et précautions particulières d'emploi :

#### Faites attention avec SULIAT HCT :

- Si votre taux sanguin de potassium ou de magnésium est bas (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasmes musculaires, rythme cardiaque anormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est bas (avec ou sans symptômes tels que fatigue, confusion, contractions musculaires, convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que nausées, vomissements, constipation, maux d'estomac, infections fréquentes, soif, faiblesses et contractions musculaires).

- Si vous avez des problèmes rénaux, si vous avez eu une greffe de rein ou si vous étiez informé que vous avez un rétrécissement de vos artères rénales.

- Si vous avez des problèmes hépatiques.

- Si vous avez ou si vous avez eu une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, en particulier s'il vous a été prescrit la dose maximale d'Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide (10 mg/320 mg/25 mg).

- Si vous avez présenté une crise cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut aussi vérifier votre fonction rénale.

- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).

- Si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrenales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostéron. L'utilisation de SULIAT HCT est déconseillée si vous êtes dans cette situation.

- Si vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythémateux disséminé (appelée également « lupus » ou « LED »).

- Si vous êtes diabétique (taux de sucre élevé dans le sang).

- Si vous avez une maladie de cholestérol ou de triglycérides très élevé.

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs ou à des diurétiques (des médicaments utilisés pour augmenter la quantité d'urine produite), en particulier si vous souffrez d'asthme et d'allergies.

- Si vous êtes malade ( vomissements ou diarrhée ).

- Si vous avez présenté des gonflements, en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT HCT et contactez votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais reprendre SULIAT HCT.

- En cas de sensations vertigineuses et/ou d'évanouissements pendant le traitement par SULIAT HCT, prévenez votre médecin le plus rapidement possible.

- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou dans la semaine qui suivent la prise de SULIAT HCT. Cela peut entraîner des troubles de la vision permanents, en l'absence de traitement.

- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :

- Un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) (par exemple Enalapril, Lisinopril, Ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.

- Aïkalin.

- Votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Risque accru de cancer de la peau non-mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) suite à l'exposition à des doses cumulatives croissantes d'hydrochlorothiazide (HCTZ):

- Les patients qui prennent l'HCTZ seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à de signaler toute lésion cutanée suspecte.

- Les lésions cutanées suspectées doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

- Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir

une protection adéquate en cas d'exposition solaire ;

- L'utilisation d'HCTZ doit aussi être réévaluée avec attention. Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus, parlez-en à votre pharmacien.

L'utilisation de SULIAT HCT est par contre recommandée chez l'enfant.

**Sujets âgés (à partir de 65 ans)**

SULIAT HCT peut être utilisé par les personnes âgées de 65 ans et plus de manière identique à la prise actuelle des 3 substances apposées.

Notamment ceux prenant la dose maximale d'Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide pour diminuer leur pression artérielle, leur fonction rénale et leur diurétisme.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.

**Précautions et contre-indications :** Les comprimés de SULIAT HCT sont également utilisés, avec d'autres médicaments, par les personnes âgées. Si vous prenez SULIAT HCT avec d'autres médicaments, veuillez consulter votre pharmacien. Il vous permettra de modifier la dose de vos médicaments.</p

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75

comprimés pelliculés,  
clopidogrel/acide acétylsalicylique

Veuillez lire attentivement cette  
ce médicament car elle contient  
importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être dangereux. Les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).



### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

• si vous avez une maladie des polypes nasaux.

• si vous avez une maladie de l'estomac tel qu'un ulcère d'estomac.

• si vous souffrez d'une maladie de l'estomac ou de l'intestin.

• si vous êtes dans le 3ème trimestre de grossesse.

• si vous avez une maladie de la coagulation interne (saignement au nez, au genou, articulation).

• une blessure grave récente.

• une intervention chirurgicale.

• une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.

• si vous avez eu un caillot dans une artère ou une veine cérébrale ischémique.

• si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin.

• si vous avez des antécédents d'ulcère de l'estomac, compris les allergies à tout médicament.

• si vous avez de la goutte.

• si vous buvez de l'alcool, en raison de l'effet de la goutte ou de lésions gastro-intestinales.

• si vous avez une maladie appartenant à la famille de la déshydrogénase (ou déficit en enzyme) qui peut développer une forme particulière de la goutte.

• si vous prenez des médicaments qui peuvent réduire la quantité de sang en faible quantité.

Pendant la prise de CoPlavix :

• Vous devez avertir votre médecin si vous avez une intervention chirurgicale.

• si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges).

• Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin (thrombotique ou PTT) incluant une apparition comme des petites taches de sang dans les yeux ou de la fatigue extrême inexplicable ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).

• Si vous vous coupez ou si vous avez une blessure, vous pouvez demander plus de temps pour la guérison. Dans le cas de coups, par exemple au cours du rasage, il est recommandé de constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.

• Votre médecin pourra vous donner des instructions pour la guérison.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75

comprimés pelliculés,  
clopidogrel/acide acétylsalicylique

Veuillez lire attentivement cette  
ce médicament car elle contient  
importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour vous. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être dangereux.
- Les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).



### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

• si vous avez une maladie des polypes nasaux.

• si vous avez une maladie de l'estomac tel qu'un ulcère d'estomac.

• si vous souffrez d'une maladie de l'estomac ou de l'intestin.

• si vous êtes dans le 3ème trimestre de grossesse.

• si vous avez une maladie de la coagulation interne (saignement au nez, au genou, articulation).

• une blessure grave récente.

• une intervention chirurgicale.

• une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.

• si vous avez eu un caillot dans une artère ou une veine cérébrale ischémique.

• si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin.

• si vous avez des antécédents d'ulcère de l'estomac, compris les allergies à tout médicament.

• si vous avez de la goutte.

• si vous buvez de l'alcool, en raison de l'effet de la goutte ou de lésions gastro-intestinales.

• si vous avez une maladie affectant la déshydrogénase (ou déficit en alcool déshydrogénase) qui peut développer une forme particulière de goutte dans le sang en faible quantité.

Pendant la prise de CoPlavix :

• Vous devez avertir votre médecin si vous avez une intervention chirurgicale.

• si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges).

• Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin (thrombotique ou PTT) incluant une apparition comme des petites taches de sang dans les yeux ou de la fatigue extrême inexplicable ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).

• Si vous vous coupez ou si vous avez une lésion dans le corps, vous pouvez demander plus de temps pour la guérison de l'effet de votre médicament sur les plaies et les caillots sanguins. Dans le cas de coups ou de chocs (par exemple au cours du rasage), constatez d'anormal. Cependant, si vous avez une lésion dans le corps, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.

• Votre médecin pourra vous donner des instructions pour la guérison de l'effet de votre médicament sur les plaies et les caillots sanguins.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75

comprimés pelliculés,  
clopidogrel/acide acétylsalicylique

Veuillez lire attentivement cette  
ce médicament car elle contient  
importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être dangereux. Les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).



### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

• si vous avez une maladie des polypes nasaux.

• si vous avez une maladie de l'estomac tel qu'un ulcère d'estomac.

• si vous souffrez d'une maladie de l'estomac ou de l'intestin.

• si vous êtes dans le 3ème trimestre de grossesse.

• si vous avez une maladie de la coagulation interne (saignement au nez, au genou, articulation).

• une blessure grave récente.

• une intervention chirurgicale.

• une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.

• si vous avez eu un caillot dans une artère ou une veine cérébrale ischémique.

• si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin.

• si vous avez des antécédents d'ulcère de l'estomac, compris les allergies à tout médicament.

• si vous avez de la goutte.

• si vous buvez de l'alcool, en raison de l'effet de la goutte ou de lésions gastro-intestinales.

• si vous avez une maladie appartenant à la famille de la déshydrogénase (ou déficit en enzyme) qui peut développer une forme particulière de la goutte.

• si vous prenez des médicaments qui peuvent réduire la quantité de sang en faible quantité.

Pendant la prise de CoPlavix :

• Vous devez avertir votre médecin si vous avez une intervention chirurgicale.

• si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges).

• Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin (thrombotique ou PTT) incluant une apparition comme des petites taches de sang dans les yeux ou de la fatigue extrême inexplicable ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).

• Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour la coagulation du sang. Dans le cas de coups ou de blessures, par exemple au cours du rasage, vous devez constater d'anormal. Cependant, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.

• Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les blessures.

• Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les blessures.

• Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les blessures.

• Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les blessures.