

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2028 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : KAROUDI KHADJA

Date de naissance :

Adresse : 21, Rue LAMEN OUDER  
CASA BCANAT - KÉ Khatiby 53000 Casablanca, FR

Tél. 06.66.19.25.26 Total des frais engagés : 150 + 136,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. ASMOUN Ahmed  
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif - Assistant Titulaire  
d'Endocrinologie et Diabète  
Place de La Victoire - 8, Bd.  
Khouribga 20000 Casablanca Tél: 051.58.50/41

Date de consultation : 1 Févr 2021

Nom et prénom du malade : KAROUDI KHADJA Age:

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Pathologie :  
la rhinite allergique

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 15/02/2024

Signature de l'adhérent(e) : K

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15 Fevr 2024	G	1	250 DH	<p style="text-align: right; margin-right: 10px;">Dr. ASMOUN Amin</p> <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">Spécialiste des Maladies de l'Appareil</p> <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">D. Médecin Assistant Titulaire</p> <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">d'Endocrinologie et Diabète</p> <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">Place de La Victoire - 8, Bd.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">Khouribga 2ème Etage Derb Omar</p> <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">Casablanca Tel: 05 22 31 58 50/41</p>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE NOUVELLE K. BOUZOUABA Bd de la Liberté - Casablanca Tél. : 05 22 31 47 17	15/02/24	136,10

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A	M	P	C	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				
				
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H	25533412 00000000 35533411	D	21433552 00000000 11433553
			G	
	B			
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
DATE DU DEVIS				
DATE DE L'EXECUTION				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr ASMOUN Ahmed

SPECIALISTE DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

ESTOMAC, FOIE, INTESTIN

Chirurgie anale: Hérmorroïdes, Fistules, Fissures

Endoscopie digestive

Ex ASSISTANT TITULAIRE D'ENDOCRINOLOGIE ET DIABETE

Ex ENSEIGNANT A LA FACULTE DE MEDECINE DE

CASABLANCA

الدكتور أسمون أحمد

إخلاصي في أمراض الجهاز الهضمي

جراحة المخرج والبواسر

داخلي سابق بقسم أمراض السكر والغدد

مدرس سابق بكلية الطب

بالدار البيضاء

Casablanca le : 15 Fevr 2024 الدار البيضاء في :

KARMONDI Khadija

82,1°

- INFEXUM 20

56,1°

- Duspatalin 200

T = 136,1°



Dr. ASMOUN Ahmed  
Spécialiste des Maladies de l'Appareil  
Digestif Assistant Titulaire  
de l'Endocrinologie et Diabète  
Place de l'Indépendance 2ème étage  
Khouribga 2ème Etage Dar Omar  
Casablanca Tel: 022.31.58.50/41

ou à l'un des autres  
en rubrique 6).  
de votre médecin

avez récemment

z être enceinte ou  
cin avant de

la grossesse.  
l'allaitement.  
ment ou de

en avant de

des véhicules et à

gélule ?

actement les  
médecin ou

ecin.

ecin.

que vous n'auriez dû  
macien.

ule  
a dose suivante à

que vous avez

dicament,  
re pharmacien.

ENTUELS ?

provoquer des effets  
ent chez tout le

monop.

Si vous avez une réaction allergique, arrêter de prendre ce médicament et prévnez votre médecin immédiatement. Les signes peuvent inclure :

- une difficulté à respirer, un gonflement du visage, du cou, des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Autres effets indésirables :

- éruption cutanée, peau rouge avec des démangeaisons.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER DUSPATALIN 200 mg, gélule ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température supérieure à + 5° C.

Pour le conditionnement en plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) :

A conserver à une température ne dépassant pas + 25° C.

Pour le conditionnement en plaquettes thermoformées  
(Aluminium/Aluminium) :

A conserver à une température ne dépassant pas + 30° C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### Ce que contient DUSPATALIN 200 mg, gélule

• La substance active est : Chlorhydrate de méthémépronazole ..... 200,00 mg

Pour une gélule

• Les autres composants sont : Stéarate de magnésium, polyacrylate (dispersion de) à 30 pour cent (Eudragit NE 30D), talc, hypromellose, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent (Eudragit L 30D), triacétine.

Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171).

Composition de l'encre d'impression : gomme laque, propylène glycol, solution d'ammoniaque concentrée, hydroxyde de potassium, oxyde de fer noir.

##### Qu'est-ce que DUSPATALIN 200 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gélule blanche comportant l'inscription « 245 ». Boîte de 20

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 19/09/2017

# DUSPATALIN

200 mg Chlorhydrate de mébénérine

PER..03/2025  
AUDE000101

DUSPATALIN 200MG  
GELU B20

P.P.V : 54DH00



6 118000 010531

00 mg. gélule :  
rate de mébénérine  
10 mg (mentionnez  
de demander l'avis

LIN 200 mg. gélule  
tien si vous prenez  
nédicament.

litez, si vous pensez  
ez, demandez conseil à votre mède

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que DUSPATALIN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
- Comment prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver DUSPATALIN 200 mg, gélule ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE DUSPATALIN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC

DUSPATALIN 200 mg contient du chlorhydrate de mébénérine. Il appartient à un groupe de médicaments appelé antispasmodiques, qui agissent sur votre intestin.

DUSPATALIN 200 mg est utilisé pour soulager les symptômes des troubles fonctionnels intestinaux. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre mais peuvent inclure :

- des douleurs et des crampes du ventre
- une sensation de ballonnements et des flatulences
- une diarrhée, une constipation ou une association des deux
- des petites selles (fèces) dures, en forme de granulés ou de ruban.

En l'absence d'amélioration ou si les symptômes s'aggravent, consultez votre médecin.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSPATALIN 200 mg, gélule?

prendre ce médicament.

DUSPATALIN 200 mg n'est pas recommandé pendant la grossesse. DUSPATALIN 200 mg ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement. Votre médecin pourrait vous conseiller d'arrêter l'allaitement et prendre un autre médicament si vous souhaitez allaiter. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour prendre tout médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun effet susceptible d'altérer l'aptitude à conduire ou utiliser des machines n'est attendu avec ce produit.

## 3. COMMENT PRENDRE DUSPATALIN 200 mg, gélule

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre pharmacien en cas de doute.

### Posologie

#### Adulte

La posologie usuelle est de 1 gélule, 2 à 3 fois par jour.

### Mode d'administration

Voie orale.

La gélule sera prise avant les repas, avec un verre d'eau.

### Fréquence d'administration

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

### Durée de traitement

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez pris plus de DUSPATALIN 200 mg, gélule

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DUSPATALIN 200 mg, gélule

- Si vous oubliez une gélule, ne la prenez pas et prenez l'heure habituelle.
- Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EN

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement.

# إينكسيوم 20 ملخ، أقراص صامدة لحموضة المعدة

# إينكسيوم 40 ملخ، أقراص صامدة لحموضة المعدة

ازو ميراروز

## ما العمل إذا كنت تواجه صعوبة في بلع الأقراص

- إذا كنت تواجه صعوبة في بلع الأقراص
  - ضع الأقراص في كوب من الماء (غير عازى)، يجب عدم استخدام أي سائل آخر.
  - هزك الماء، حتى تفكك الأقراص (لن يكون المزيج صافياً). ثم اشرب المزيج على الفور أو في غضون 30 دقيقة. يجب دامنا تحريك الكوب جيداً من خلال إضافة ما يعادل نصف كوب من آجل تناول الدواء، كاملاً لашطف الكوب جيداً من خلال إضافة ما يعادل نصف كوب من الماء (الماء الشيري). تخون القطعة الصلبة على الورق، لا تستغفلاً ولا تستسقها.
  - إذا لم تتمكن من البلع على الإطلاق، فيمكن منزء المرض مع الماء، ويسهي في محفظة. يمكن بعد ذلك إعطاء المزيج مباشرة في المعدة عن طريق أنبوب معددي.

## الاستخدام لدى الأطفال أقل من 12 سنة

- لا ينصح باستخدام إينكسيوم، أقراص صامدة لحموضة المعدة لدى الأطفال أقل من 12 سنة. المعلومات المتعلقة بالجرعة الخاصة للأطفال الذين تتراوح أمراضهم بين سنة واحدة و 11 سنة واردة في النشرة المرفقة مع إينكسيوم كيس (استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات).

## المرضى المسنين

- ليس هناك حاجة لتعديل الجرعة لدى المرضى المسنين.

### إذا تناولت جرعة زائدة من إينكسيوم

- إذا تناولت جرعة زائدة عن الجرعة التي وصفها الطبيب من إينكسيوم، استشر الطبيب أو الصيدلي على الفور.

### إذا نسيت تناول إينكسيوم

- إذا نسيت تناول جرعة ما، تناولها بمجرد تذكرها. لكن إذا اقترب موعد تناول الجرعة التالية، لا تتناول جرعة مفاجأة (أي جرعتين في نفس الوقت) للتغويض عن الجرعة المنسية.
- لا تتناول جرعة مفاجأة (أي جرعتين في نفس الوقت) للتغويض عن الجرعة المنسية.
- إذا كانت لديك أسلطة حول استعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات أوفـر.

## 4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

- كغيره من الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثار جانبية لكنها لا تؤثر على جميع المرضى بالضرورة.

- إذا لاحظت أيًا من الآثار الجانبية الخطيرة التالية، توقف عن تناول إينكسيوم واتصل بالطبيب على الفور:

- البرقان، الاليول الداكن والشعور بالغثيان التي يمكن أن تكون من أعراض الإصابة بمرض في الكبد.
- هذه الآثار نادرة وقد تصيب ما يصل إلى شخص واحد من 1000 شخص.
- ظهور صفير مفاجئ عند النوم، تورم الشفرين واللسان والحلق أو الجسم، طفح جلدي، إعماق، أو صعوبة في البلع (تفاعل أرجي شديد).
- هذه الآثار نادرة وقد تصيب ما يصل إلى شخص واحد من 1000 شخص.
- ظهور مفاجئ لطفح جلدي شديد أو احمرار في الجلد مع تقرحات أو تفترش قد يحدث حتى بعد عدة أسابيع من العلاج. في بعض الأحيان يمكن أن تكون الفقاعات شديدة وتدون مصووبة بتزرع من التشققات أو العيوب أو الأنف أو الأعضاء التناسلية. يمكن أن يتضطرط الطفح الجلدي ليصبح إصابة جلدية خطيرة ومميتة (نقشر البشرة والأغشية المبطنة السطحية) وهذا قد يتطلب تدخل الطبيب.

يرجى قراءة هذه النشرة بمumen قبل الشروع في استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات تهمك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مجددًا.
- إذا كانت لديك أسلطة أخرى أو شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات إضافية.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تجعله شخص آخر حتى إذا ظهرت عليه نفس الأعراض، يمكن لذلك أن يضره.
- إذا شعرت بأثر جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، استشر الطبيب أو الصيدلي، ينطبق هذا على آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

## في هذه النشرة:

1. ما هو إينكسيوم وما هي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول إينكسيوم؟
3. كيف تناول إينكسيوم؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يتحقق إينكسيوم؟
6. مستوى العلبة ومعلومات أخرى.

## 1. ما هو إينكسيوم وما هي دواعي استعماله؟

- يحتوي إينكسيوم على مادة تسمى إزوميراروزول وهو دواء ينتمي لفئة «متبيطات مضخة البروتون» ويعلم على تقليل كمية المضم الذي تفرزه المعدة. يستعمل إينكسيوم لعلاج الحالات التالية:

### لدى الآتي:

- لعلاج الارتفاع المعددي المرئي حيث يعود حمض المعدة في المري، (أي الأنروب الذي يربط بين الطلق والمعدة) ويسبب الشعور بالألم، التهاب وحرقة.
- الفرات المعددية أو الآمني عشرية (الأمعاء الدقيقة) المصودية بعذوى يكتيريا الملوكية البوابية، إذا أصبحت بهذه العدوى، يمكن أن يصفع له الطبيب مضادات العدوى حيوية لعلاج العدوى و السماح بالتنام الفرحة.
- الفرات المعددية المرتيبة بتناول الأدوية المسماة مضادات الالتهاب اللاستيرويدية (AINS). يمكن أيضًا أن يستخدم إينكسيوم لمنع ظهور الفرات المعددية في حالة العلاج باستعمال مضادات الالتهاب اللاستيرويدية (AINS).
- زيادة المعدة في المعدة سبب وحود زائدة على مستوى البكتيريا (متلازمة زولينجر إيلسون).
- زياد المعدة في المعدة سبب وحود زائدة على مستوى البكتيريا (متلازمة زولينجر إيلسون).
- زياد المعدة في المعدة سبب وحود زائدة على مستوى البكتيريا (متلازمة زولينجر إيلسون).
- زياد المعدة في المعدة سبب وحود زائدة على مستوى البكتيريا (متلازمة زولينجر إيلسون).

## الماهفين انطلاقاً من عمر 12 سنة

- لعلاج الارتفاع المعددي المرئي المرضي حيث يعود حمض المعدة في المري، (أي الأنروب الذي يربط بين الطلق والمعدة) ويسبب الشعور بالألم، التهاب وحرقة في المعدة.
- الفرات المعددية أو الآمني عشرية (الأمعاء الدقيقة) المصودية بعذوى يكتيريا هيليكوباكتر بيليوري، إذا أصبحت بهذه العدوى، يمكن أن يصفع له الطبيب مضادات العدوى حيوية لعلاج العدوى و السماح بالتنام الفرحة.

## 2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول إينكسيوم؟

### لا تتناول أبداً إينكسيوم:

- إذا كنت تعاني من الحساسية إزاء، إزوميراروزول أو إزا، أي من المكونات الأخرى التي يحتوي عليها هذا الدواء، (وهي مذكورة في القسم 6).
- إذا كنت تعاني من الحساسية إزاء، كانت آخر لمحضة، مثل باتنوبيرازول، لانسوبيرازول،

## Notice : Information du patient

# INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

## INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'INexium
3. Comment prendre l'INexium
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver l'INexium
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que l'INexium et dans quels cas est-il utilisé

l'INexium contient un médicament appelé esoméprazole. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « inhibiteurs de la pompe à protons ». Ils agissent en réduisant la quantité d'acide produite par l'estomac. l'INexium est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Adultes

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.
- Ulcères de l'estomac associés à la prise de médicaments appelés AINS (antiinflammatoires non stéroïdiens). l'INexium peut également être utilisé pour empêcher la formation d'ulcères de l'estomac si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une excroissance au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).
- La poursuite du traitement de l'INexium par voie intraveineuse après prévention de la récidive hémorragique d'un ulcère.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO). Il s'agit de la remontée d'acide de l'estomac dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), entraînant une douleur, une inflammation et des brûlures d'estomac.
- Les ulcères de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous avez cette affection, votre médecin peut également prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre la cicatrisation de l'ulcère.

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'INexium

Ne prenez jamais l'INexium :

si vous êtes allergique à l'esoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler

- Si vous avez des difficultés pour avaler les comprimés, suivez les instructions ci-dessous.

- Mettez l'INexium dans une boîte à pilules ou une boîte à emballages individuels.
- Remuez l'INexium avec un peu d'eau tiède et buvez-le.
- le mélangez avec de la soupe, du thé ou du lait.
- le boirez avec une cuillère à soupe.
- Afin de faciliter l'absorption, buvez l'INexium avec un demi-verre d'eau.
- pas en cours d'absorption.
- Si vous ne pouvez pas avaler l'INexium avec une seringue, il existe une autre façon de prendre l'INexium.

#### Utilisation chez

les personnes âgées

l'INexium, comprimé gastro-résistant, n'a pas d'effet supplémentaire chez les personnes âgées.

Si vous avez pris plus de l'INexium que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de l'INexium que votre médecin vous a prescrit, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

#### Si vous oubliez de prendre l'INexium

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
- Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants, arrêtez de prendre l'INexium et contactez un médecin immédiatement :

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie. Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, d'un gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, d'une éruption cutanée, d'une perte de connaissance ou de difficultés pour avaler (réaction allergique sévère). Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère ou d'un rougissement de la peau s'accompagnant de cloques ou d'une desquamation, qui peut survenir même après plusieurs semaines de traitement. Parfois, les cloques peuvent être sévères et s'accompagner d'un saignement au

