

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.



## Déclaration de Maladie

M23- N° 0038072

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule 0002027 Société : 198816

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom JADOUAL Mohamed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 28 / 02 / 2024

Nom et prénom du malade : JADOUAL Mohamed Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Goutte chronique

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 28/02/2024

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

PR4FR05/V2/20-10-2023

## Adresses Mails utiles

- ☐ Réclamation : contact@mupras.com
- ☐ Prise en charge : pec@mupras.com
- ☐ Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/02/24	CC		30.00dh	

Docteur SAÏD EL KHACHAM  
 ALUMATOCHE 5  
 Bd. Bouziane - Résidence - Casablanca  
 Appt 5 Sidi Othmane - Casablanca  
 Tél: 05 22 37 14 14

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur      Date      Montant de la Facture

28/02/24      119,90

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue      Date      Désignation des Coefficients      Montant des Honoraires

29/02/24      860      = 66,00 dh

# AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien      Date des Soins      Nombre      Montant détaillé des Honoraires

AM      PC      IM      IV

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

# SOINS DENTAIRES

Dents Traitées      Nature des Soins      Coefficient



Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

# O.D.F PROTHESES DENTAIRES

# DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)  
 Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr. Hicham SATI

Spécialiste en Rhumatologie  
Maladies Rhumatismales

Articulations - OS. et Colonne vertébrale

- Ancien Professeur Assistant des Hôpitaux de France
- Diplôme Universitaire de la douleur
- Membre International du Collège Américain de rhumatologie et de la Société Française de Rhumatologie
- Diplôme en Rhumatologie Pédiatrique

Sur Rendez-vous - Horaire Continue

Casablanca, le :

الدار البيضاء في :

28/02/24

Dr. Hicham SATI

27.60

Rypon 1000

1/2

leca

3440 x 2

Dr. Hicham SATI

80

FM

2 kg

46.40

Zylone

149.40

Docteur SATI Hicham  
RHUMATOLOGUE

Dr. Hicham SATI

LABORATOIRE AFRIQUIA D'ANALYSES  
BIOLOGIQUES ET MEDICALES

**Dr. BELHAQ Jamal**

Docteur en pharmacie biologiste  
Diplômé de l'Université de Montpellier (France)



مختبر إفريقيا للتحليلات الطبية

**الدكتور بلحق جمال**

صيدلي أخصائي في البيولوجيا الطبية  
خريج جامعة مونبلييه (فرنسا)



INP (P.P) : 097158232



INP (Laboratoire) : 093001097

Prélèvement du : 29/02/2024

Edition du : 29/02/2024

Référence : 40229432



Mr. JADOUAL MOHAMED

Code Patient 1BJ2719

Médecin: Dr. HICHAM SATI

EXAMENS DE SANG  
BIOCHIMIE

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
Urée.....	: 0,49	g/l	(0.15 - 0.45)
Soit .....	: 8.13	mmol/l	(2.5 - 7.5)
Créatinine.....	: 18,87	mg/l	(6 - 13)
Soit.....	: 166.1	μmol/l	(53-114)
Acide Urique.....	: 63,25	mg/l	(25 - 70)
Soit.....	: 380.	μmol/l	(150 - 416)

LABORATOIRE AFRIQUIA  
D'ANALYSE MEDICALES  
Dr BELHAQ Jamal  
97 Bd Driss El Harti Casablanca  
Tél.: 05 22 56 73 44  
P (PP) 097158232  
093001097

97, Bd. Driss El Harti - 1er étage - Cité Djamaâ - Casablanca - Tél.: 05 22 56 73 44  
R.C.: 259264 - Patente : 33801058 - IF : 49507635 - C.N.S.S : 2601749 - ICE : 001585388000042



093001097

LABORATOIRE AFRIQUIA D'ANALYSES  
BIOLOGIQUES ET MEDICALES

**Dr. BELHAQ Jamal**

Docteur en pharmacie biologiste  
Diplômé de l'Université de Montpellier (France)



INP (P.P) : 097158232

مختبر إفريقيا للتحليلات الطبية

**الدكتور بلحق جمال**

صيدلي أخصائي في البيولوجيا الطبية  
خريج جامعة مونبلييه (فرنسا)



INP (Laboratoire) : 093001097

**Facture n° 4B3H3611**

Casablanca le : 29/02/2024

Analyses effectuées le: 29/02/2024

Pour.....: **Mr. JADOUAL MOHAMED**

Sur prescription du: Dr HICHAM SATI

Code.....: 1BJ2719



Organisme.....:

**Bilan:**

AU CREAT

Cotation : (B 60 )

**Montant Net : 66.00 Dh**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

**SOIXANTE SIX Dhs 00 Cts**

LABORATOIRE AFRIQUIA  
D'ANALYSES MEDICALES  
Dr BELHAQ Jamal  
97 Bd Driss El Harti Casablanca  
Tél: 05 22 56 73 44  
INP (P.P): 097158232  
INP (Labo): 093001097



093001097

## Dr. Hicham SATI

Spécialiste en Rhumatologie  
Maladies Rhumatismales

Articulations - OS. et Colonne vertébrale

- Ancien Professeur Assistant des Hôpitaux de France
- Diplôme Universitaire de la douleur
- Membre International du Collège Américain de rhumatologie et de la Société Française de Rhumatologie
- Diplôme en Rhumatologie Pédiatrique

Sur Rendez-vous - Horaire Continue

Casablanca, le :

28/08/2024

الدار البيضاء هي :

*[Signature]*

## الدكتور هشام ساطح

إختصاصي أمراض المفاصل  
والروماتيزم والعظام والعمود الفقري

- أستاذ مساعد بالمستشفيات  
الفرنسية سابقا

- عضو المعهد الأمريكي لأمراض الروماتيزم

- والجمعية الفرنسية لأمراض الروماتيزم

- دبلوم جامعي في علاج الألم

- شهادة الترويض الطبي

- دبلوم في روماتيزم الأطفال

بالموعد - التوقيت المستمر



Acide urique.

*[Signature]*

LABORATOIRE AFRICA  
D'ANALYSES  
97 E. Bouziane  
Tél: 097158232  
Fax: 093001097

Docteur SATI Hicham  
Rhumatologue  
Bouziane, Résidence Farhatine 5, Appt. 5, 2ème Etage, (A côté d'Acima) - Casablanca  
Tél./Fax: 05 22 37 14 14

# Depo-Medrol®

80 mg/2 ml

Suspension injectable

acétate de méthyprednisolone



HR1281  
06/P2028  
P.P.V:37DH70

LOT/EXP :



**Informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'elle.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- leur être nocif, même si les signes de leur maladie ne sont pas évidents.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Depo-Medrol et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Depo-Medrol ?
3. Comment utiliser Depo-Medrol ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Depo-Medrol ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que Depo-Medrol et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament contient de l'acétate de méthyprednisolone.

L'acétate de méthyprednisolone appartient au groupe des glucocorticoïdes. La méthyprednisolone inhibe les manifestations locales de l'inflammation (chaleur, gonflement, douleur, rougeur) et les réactions allergiques (hypersensibilité). Elle influence également de nombreux organes et processus métaboliques dans l'organisme.

- Ainsi, on l'utilise pour le traitement de nombreuses affections telles que :
- affections rhumatismales d'origines diverses
- inflammations tendineuses

# Depo-Medrol®

80 mg/2 ml


Suspension injectable

acétate de méthyprednisolone



HR1281  
06/P2028  
P.P.V:37DH70

LOT/EXP :



**Informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'elle.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- leur être nocif, même si les signes de leur maladie ne sont pas évidents.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Depo-Medrol et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Depo-Medrol ?
3. Comment utiliser Depo-Medrol ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Depo-Medrol ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que Depo-Medrol et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament contient de l'acétate de méthyprednisolone.

L'acétate de méthyprednisolone appartient au groupe des glucocorticoïdes. La méthyprednisolone inhibe les manifestations locales de l'inflammation (chaleur, gonflement, douleur, rougeur) et les réactions allergiques (hypersensibilité). Elle influence également de nombreux organes et processus métaboliques dans l'organisme. Ainsi, on l'utilise pour le traitement de nombreuses affections telles que :

- affections rhumatismales d'origines diverses
- inflammations tendineuses

# MYANTALGIC®

(Tramadol-Paracétamol)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATIONS

- Comprimés pelliculés, boîte de 20
- Comprimés effervescents, boîte de 20

## COMPOSITION

### Comprimé pelliculé

Tramadol chlorhydrate .....

Paracétamol .....

Excipient q.s.p .....

### Comprimé effervescent

Tramadol chlorhydrate .....

Paracétamol .....

Excipient q.s.p .....

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antalgique de niveau II.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Douleurs modérées à intenses lorsque les antalgiques de niveau I sont inefficaces. Il est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité connue au tramadol, au paracétamol ou à l'un des excipients.
- Intoxication aiguë ou surdosage avec des produits à effet sédatif, hypnotiques, autres analgésiques centraux, opioïdes.
- Traitement simultané ou récent (arrêt de moins de 15 jours) par les IMAO.
- Insuffisance hépatocellulaire sévère.
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 ml/mn).
- Insuffisance respiratoire sévère.
- Epilepsie non contrôlée par un traitement adapté.
- Grossesse et allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas dépasser la dose recommandée et ne pas utiliser d'autres médicaments contenant du paracétamol ou tramadol sans avis médical.
- Les patients ayant des antécédents d'épilepsie ou ceux qui sont susceptibles de présenter des convulsions ne devront être traités par l'association tramadol/paracétamol qu'en cas de nécessité absolue (risque de convulsion).
- Utiliser avec prudence chez les patients susceptibles de présenter une dépression respiratoire.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

- IMAO
- Carbamazépine
- Agonistes morphiniques (buprénorphine, nalbuphine, pentazocine)
- Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
- Autres dérivés morphiniques
- Benzodiazépines
- Barbituriques
- La prise d'alcool est fortement déconseillée pendant le traitement.

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En raison de la présence de tramadol, ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.

MYANTALGIC® 20 comprimés pelliculés

PPU 29DH50  
EXP 06/2025  
LOT 33021 3

mg  
mg  
ulé

mg  
0 mg  
scent

MYANTALGIC®  
20 Comprimés Pelliculés 37,5 mg / 325 mg



**ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés**  
**ALLOPURINOL**

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmière.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Que contient cette notice :**
1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
  3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
  6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :**

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Avertissements et précautions :**  
Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/lère avant de prendre ZYLORIC.

**ZYLORIC 100 mg**

Boîte de 100 comprimés  
A.M.M. N° 63 DMP/21/NTT  
SOTHEMA SOUSKOURA

Remboursable AMO



l'allopurinol et contactez votre médecin.

- Si vous souffrez de problèmes de circulation, passez dans les voies urinaires.
- Informez votre médecin si vous prenez ou pourriez prendre l'un des médicaments suivants :
- Aspirine
- Théophylline, utilisée pour l'asthme.
- Médicaments utilisés pour le diabète.
- Vidarabine (anti-viral).
- Didanosine, utilisée pour le VIH.
- Antibiotiques (ampicilline).
- Médicaments utilisés pour l'hypertension.
- Médicaments utilisés pour les douleurs, par exemple les analgésiques.
- Médicaments utilisés pour les problèmes cardiaques, comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion).
- Médicaments utilisés pour les problèmes rénaux, comme des diurétiques (pour éliminer l'excès de liquide).
- Médicaments utilisés pour les problèmes de sang, comme la warfarine.

• Tout autre médicament que vous prenez ou pourriez prendre. Veuillez avertir votre médecin avant de commencer tout autre traitement sans ordonnance, y compris les médicaments pour la grippe.

**Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le faire, planifiez une grossesse avec votre médecin avant de prendre ce médicament. L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse peut être dangereuse. En raison du passage de l'allopurinol dans le lait maternel, il est conseillé de ne pas allaiter pendant le traitement.

**Conduite de véhicules et machines**

Dans de rares cas, la prise de ZYLORIC peut provoquer des vertiges, ou une sensation de fatigue. Si vous ressentez ces effets, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines.

**Liste des excipients**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au galactose ou une malabsorption du glucose.

**3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC comprimés ?**

Veillez à toujours prendre ZYLORIC comprimés de votre médecin ou pharmacien. Les comprimés doivent être pris avec de l'eau, à jeun, avant le repas.

**Posologie**

La posologie recommandée est de 100 mg par jour.

Les posologies recommandées sont celles indiquées ci-dessous.

Si vous êtes âgé(e) ou si vous avez des problèmes rénaux, votre médecin pourra vous prescrire une posologie plus faible.

Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le faire, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

**Utilisation chez les enfants**

Les posologies recommandées sont celles indiquées ci-dessous.

**Mode et voie d'administration**

Les comprimés sont à prendre par voie orale.

Les comprimés doivent être pris avec de l'eau, à jeun, avant le repas.

LOT 232851

EXP 09 2027

PPV 46.70 DH