

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7307 Société : 198845

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : ELARFAOUI MOHAMED

Date de naissance : 01.01.1953

Adresse : Choueifatyak Arbyad

HAY, LAHA CHSA

Tél. 0668777582 Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

*Dr AZIZ CHAFI*  
51, Bd Roi Mohamed V  
Neurochirurgie  
Tel. 05 22 54 02 00

Date de consultation : 16.02.2019 Age : 65

Nom et prénom du malade : M. ZABRI MAF

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Neurochirurgie

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : Pathologie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : ACC

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : ACC

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/02/2014	106	0	300,00	Dr. NEJEDZI CHAFIQ Bd Rihabi El Maskini Casablanca Tél. 05 22 94 02 60

### EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AD-DORHA Avenue Sidi El Mekki El Mekki Casablanca	16/02/2014	2548,00

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
				Coefficient des travaux												
				Montants des soins												
				Début d'exécution												
				Fin d'exécution												
				Coefficient des travaux												
				Montants des soins												
				Date du devis												
				Date de l'exécution												
DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>				H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000	G	35533411	11433553	
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
B	00000000	00000000														
G	35533411	11433553														
<p><b>O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES</b></p> <p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>																
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION												

**Docteur Aziz CHAFIQ**

**NEUROCHIRURGIEN**

Chirurgie du Système Nerveux Central  
et de la Colonne Vertébrale

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris  
Ex. Chirurgien au C.H.U. de Bicêtre (PARIS)

Sur Rendez-Vous

Casablanca, Le .....

2005/05/22 DOHA  
Stendhal City  
2-701-0522

**الدكتور عزيز شفيق**

اختصاصي في جراحة الدماغ  
والجهاز العصبي والعمود الفقري

خريج كلية الطب بباريس

جراح سابق بالمستشفى الجامعي بيستر (باريس)

بالمتوعد

16.07.2005

الدار البيضاء، في

Dr : 03 mg  
9/1 Anteradyl 10  
41.80 x 2 112g x 2 mot el  
280.00  
x 3 2 Fleximust  
98.40 7263 1X2 mot el  
275.00 7264 300 12X2 le sen  
31 Nayant  
Dr. AZIZ CHAFIQ  
Neurochirurgien  
51, Bd. Rahal El Meskini - Résidence ESSAFA N° 19 - CASABLANCA  
Téléphone : 05.22.54.02.60 / 05.22.44.31.77

51 شارع رحال المskinي - إقامة الصفار رقم 19 - الدار البيضاء  
51, Bd. Rahal El Meskini - Résidence ESSAFA N° 19 - CASABLANCA  
الهاتف : 05.22.54.02.60 / 05.22.44.31.77

41

Multi-items

MANSA

82.00

76.00

7. le 10  
101



Dr. Aziz CHAFIQ  
Neurochirurgien  
51, Bd. R�chal El Mezki, Casablanca  
Tél: 05 22 54 02 60

PHARMACIE AD-DORA  
Avenue Sidi Abdellah  
Casablanca - Tel: 05 22 25 25 25

PHARMACIE AD-DORA

Avenue Sidi Abdellah

154800  
PHARMACIE AD-DORA  
Avenue Sidi Abdellah  
Casablanca - Tel: 05 22 25 25 25

# FLEXIMAX

## FORME ET PRESENTATION :

Boîte de 30 et 60 gélules

## COMPOSITION (par gélule)

Substance active: Cartilage

d'Harpagophytum 200mg,

Anti-agglomérant: Stéarate

Capsule végétale en HPI

## PROPRIETES :

**FLEXIMAX** améliore la qualité *du cartilage*

combinaison du cartilage *de requin* et de l'Harpagophytum, et permet ainsi un bien-être articulaire.

LOT: 2306015  
FAB: 06/2023  
EXP: 06/2026  
PVC: 280.000H



# FLEXIMAX

## FORME ET PRESENTATION :

Boîte de 30 et 60 gélules

## COMPOSITION (par gélule)

Substance active: Cartilage

d'Harpagophytum 200mg,

Anti-agglomérant: Stéarate

Capsule végétale en HPI

## PROPRIETES :

**FLEXIMAX** améliore la qualité *du cartilage*

combinaison du cartilage *de requin* et de l'Harpagophytum, et permet ainsi un bien-être articulaire.

LOT: 2306015  
FAB: 06/2023  
EXP: 06/2026  
PVC: 280.000H



# FLEXIMAX

## FORME ET PRESENTATION :

Boîte de 30 et 60 gélules

## COMPOSITION (par gélule)

Substance active: Cartilage

d'Harpagophytum 200mg,

Anti-agglomérant: Stéarate

Capsule végétale en HPI

## PROPRIETES :

**FLEXIMAX** améliore la qualité *du cartilage*

combinaison du cartilage *de requin* et de l'Harpagophytum, et permet ainsi un bien-être articulaire.

LOT: 2306015  
FAB: 06/2023  
EXP: 06/2026  
PVC: 280.000H





l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

### 3. COMMENT PRENDRE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

#### Posologie

La posologie est variable en fonction de l'affection traitée, elle est aussi adaptée à chaque patient.

AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable peut être utilisé sous certaines conditions chez les enfants pour le traitement des troubles du rythme cardiaque (arythmie). La dose sera ajustée par le médecin en fonction de l'âge et du poids de l'enfant.

Si les troubles persistent, consultez rapidement votre médecin.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

#### Mode d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale. Les comprimés doivent être avalés avec une boisson (par exemple de l'eau).

#### Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce médicament. Vous ne devez pas arrêter le traitement sans son autorisation.

#### Si vous avez pris plus de AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin.

#### Si vous oubliez de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

En cas d'oubli, prendre dès que possible votre comprimé et poursuivre votre traitement normalement. Ne jamais prendre une double dose pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :** • une fatigue, • des refroidissements des extrémités, • un ralentissement du rythme cardiaque, • des problèmes de circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (maladie de Raynaud), • des insomnies, des cauchemars.

**Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :** • des troubles gastro-intestinaux (douleurs de l'estomac, nausées, vomissements, diarrhées).

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :** • des sensations vertigineuses, • une diminution du nombre de plaquette dans le sang, • une maladie du cœur (insuffisance cardiaque), • des anomalies du rythme cardiaque (troubles de la conduction cardiaque), • une chute de la tension artérielle, • une difficulté à marcher pouvant être aggravée chez une personne qui boitait déjà, • des hallucinations, des troubles psychiatriques (psychoses, modifications de l'humeur, confusion), une impuissance, • divers effets sur la peau et les cheveux, notamment, des tâches rouges (purpura), une chute de cheveux (alopecie), des boutons rouges (psoriasis), ou aggravations d'un psoriasis, • une

sensation  
niveau de  
rendant la

**Effets à la  
personne**

sang (hyp

faire atténuer au risque d'hypoglycémie \*), apparition de certains anticorps (anticorps antinucléaires) visible lors d'une prise de sang, \* apparition ou aggravation d'une faiblesse musculaire causée par une maladie auto-immune.

**Effets indésirables de fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :** • des crises convulsives liées à un taux anormalement bas de sucre (hypoglycémie) chez les enfants et adolescents.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

#### 5. COMMENT CONSERVER AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température inférieure à 30°C.



Tenir à l'abri de la lumière.



Tenir à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments utilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### Ce que contient AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

• La substance active est (sont) : Chlorhydrate de propranolol ..... 40 mg

• Les autres composant(s) excipient(s) est (sont) :

Le D-mannitol, la gélatine, l'acide alginique, l'acide stéarique et le stéarate de magnésium.

##### Qu'est-ce que AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable.

Chaque boîte contient 50 comprimés.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**  
06/07/2018.

écheresse au  
des bronches

er jusqu'à 1  
sucré dans le  
l'atients devant

apparition de certains  
anticorps (anticorps antinucléaires) visible lors d'une prise de sang, \*

apparition ou aggravation d'une faiblesse musculaire causée par une

maladie auto-immune.

40000529102



l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

### 3. COMMENT PRENDRE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

#### Posologie

La posologie est variable en fonction de l'affection traitée, elle est aussi adaptée à chaque patient.

AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable peut être utilisé sous certaines conditions chez les enfants pour le traitement des troubles du rythme cardiaque (arythmie). La dose sera ajustée par le médecin en fonction de l'âge et du poids de l'enfant.

Si les troubles persistent, consultez rapidement votre médecin.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

#### Mode d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale. Les comprimés doivent être avalés avec une boisson (par exemple de l'eau).

#### Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce médicament. Vous ne devez pas arrêter le traitement sans son autorisation.

#### Si vous avez pris plus de AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin.

#### Si vous oubliez de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

En cas d'oubli, prendre dès que possible votre comprimé et poursuivre votre traitement normalement. Ne jamais prendre une double dose pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :** • une fatigue, • des refroidissements des extrémités, • un ralentissement du rythme cardiaque, • des problèmes de circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (maladie de Raynaud), • des insomnies, des cauchemars.

**Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :** • des troubles gastro-intestinaux (douleurs de l'estomac, nausées, vomissements, diarrhées).

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :** • des sensations vertigineuses, • une diminution du nombre de plaquette dans le sang, • une maladie du cœur (insuffisance cardiaque), • des anomalies du rythme cardiaque (troubles de la conduction cardiaque), • une chute de la tension artérielle, • une difficulté à marcher pouvant être aggravée chez une personne qui boitait déjà, • des hallucinations, des troubles psychiatriques (psychoses, modifications de l'humeur, confusion), une impuissance, • divers effets sur la peau et les cheveux, notamment, des tâches rouges (purpura), une chute de cheveux (alopecie), des boutons rouges (psoriasis), ou aggravations d'un psoriasis, • une

sensation  
niveau de  
rendant la

**Effets à la  
personne**

sang (hyp

faire atténuer au risque d'hypoglycémie \*), apparition de certains anticorps (anticorps antinucléaires) visible lors d'une prise de sang, \* apparition ou aggravation d'une faiblesse musculaire causée par une maladie auto-immune.

**Effets indésirables de fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :** • des crises convulsives liées à un taux anormalement bas de sucre (hypoglycémie) chez les enfants et adolescents.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

#### 5. COMMENT CONSERVER AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température inférieure à 30°C.



Tenir à l'abri de la lumière.



Tenir à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments utilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### Ce que contient AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

• La substance active est (sont) : Chlorhydrate de propranolol ..... 40 mg

• Les autres composant(s) excipient(s) est (sont) :

Le D-mannitol, la gélatine, l'acide alginique, l'acide stéarique et le stéarate de magnésium.

##### Qu'est-ce que AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable.

Chaque boîte contient 50 comprimés.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**  
06/07/2018.

écheresse au  
des bronches

er jusqu'à 1  
sucré dans le  
l'atients devant

apparition de certains  
anticorps (anticorps antinucléaires) visible lors d'une prise de sang, \*

apparition ou aggravation d'une faiblesse musculaire causée par une

maladie auto-immune.

40000529102

# NUPENTIN® 300mg et 400mg

## Gélules en boîtes de 30, 60 et 90.

### Gabapentine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne l'offrez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques à ceux du patient prescrit. Ne le conservez pas à la maison.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous ressentez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en ou à votre pharmacien.

- problèmes de mouvements anormaux tels que torsions convulsives, mouvements saccades et raideur,
- bourdonnements dans les oreilles,
- une association d'effets indésirables qui apparaissent simultanément qui peut inclure: augmentation de la taille des ganglions (petites masses isolées sous la peau), fièvre, éruption cutanée et inflammation du foie, jaunissement de la peau et des yeux (ictère), inflammation du foie,
- insuffisance rénale aigüe, incontinence urinaire,
- augmentation du volume des seins, augmentation de la taille des seins chez l'homme,
- effets indésirables suivant un arrêt brutal du traitement (anxiété, difficulté à dormir, sueurs), douleurs à la poitrine,
- fièvre chez les patients diabétiques,
- musculaires (rhabdomyolyse),
- résultats des tests sanguins (élévation de la créatine kinase).

Conseil: si vous êtes sous hémodialyse (pour purifier le sang si vous souffrez d'une insuffisance rénale), prévenez votre médecin si vous présentez des douleurs musculaires ou une faiblesse musculaire,

## SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### PENTIN® 300mg et 400 mg, gélule:

problèmes rénaux votre médecin pourrait vous prescrire une pose urinaire,

si vous êtes sous hémodialyse (pour purifier le sang si vous souffrez d'une insuffisance rénale), prévenez votre médecin si vous présentez des douleurs musculaires ou une faiblesse musculaire,

produit à usage interne,

1. COMPOSITION DU MÉDICAMENT
- Chaque gélule contient 300mg ou 400mg de substance active. Les autres composants sont : mannitol, amidon de maïs, magnésium.
- Composants de l'enveloppe de la gélule : oxyde de fer jaune, sodium lauryl sulfate, dioxyde de titane, gélatine, eau.
2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PPV: 275DH00

**NUPENTIN® 300 mg**  
Boîte de 90 gélules  
Voie orale



6 118001 300044

**NUPENTIN® 300mg et 400mg**  
Gélules en boîtes de 30, 60 et 120  
Gabapentine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute ou si vous avez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques à ceux qui lui sont propres. Il peut être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1. COMPOSITION DU MÉDICAMENT

Chaque gélule contient 300mg ou 400mg de substance active : Gabapentine. Les autres composants sont : mannitol, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium.

Composants de l'enveloppe de la gélule : oxyde de fer jaune, sodium lauryl sulfate, dioxyde de titane, gélatine, eau.

PPV:92 DH 70

**NUPENTIN® 300 mg**  
Boîte de 30 gélules  
Voie orale



6 118 001 300020

de mouvements anormaux tels que torsions convulsives, saccades et raideur, tics dans les oreilles,

et d'effets indésirables qui apparaissent simultanément qui augmentent la taille des ganglions (petites masses de la peau), fièvre, éruption cutanée et inflammation du foie, de la peau et des yeux (ictère), inflammation du foie, œnale aiguë, incontinence urinaire,

du volume des seins, augmentation de la taille des seins

et de la glycémie chez les patients diabétiques, dégradation des fibres musculaires (rhabdomyolyse),

changement des résultats des tests sanguins (élévation de la créatine phosphokinase dans le sang).

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## 7. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec NUPENTIN® 300mg et 400 mg, gélule :

- si vous souffrez de problèmes rénaux votre médecin pourrait vous prescrire une dose différente,
- si vous êtes sous hémodialyse (pour purifier le sang si vous souffrez d'une insuffisance rénale), prévenez votre médecin si vous présentez des douleurs musculaires ou une faiblesse musculaire,

**NUPENTIN® 300mg et 400mg**  
Gélules en boîtes de 30, 60 et 120  
Gabapentine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute ou si vous avez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques à ceux qui lui sont propres. Il peut être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Chaque gélule contient 300mg ou 400mg de substance active : Gabapentine. Les autres composants sont : mannitol, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium.

Composants de l'enveloppe de la gélule : oxyde de fer jaune, sodium lauryl sulfate, dioxyde de titane, gélatine, eau.

PPV:92 DH 70

**NUPENTIN® 300 mg**  
Boîte de 30 gélules  
Voie orale



6 118 001 300020

de mouvements anormaux tels que torsions convulsives, saccades et raideur, tics dans les oreilles,

et d'effets indésirables qui apparaissent simultanément qui augmentent la taille des ganglions (petites masses de la peau), fièvre, éruption cutanée et inflammation du foie, de la peau et des yeux (ictère), inflammation du foie, œnale aiguë, incontinence urinaire,

du volume des seins, augmentation de la taille des seins

et de la glycémie chez les patients diabétiques, dégradation des fibres musculaires (rhabdomyolyse),

changement des résultats des tests sanguins (élévation de la créatine phosphokinase dans le sang).

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## 7. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec NUPENTIN® 300mg et 400 mg, gélule :

- si vous souffrez de problèmes rénaux votre médecin pourrait vous prescrire une dose différente,
- si vous êtes sous hémodialyse (pour purifier le sang si vous souffrez d'une insuffisance rénale), prévenez votre médecin si vous présentez des douleurs musculaires ou une faiblesse musculaire,

**NUPENTIN® 300mg et 400mg**  
Gélules en boîtes de 30, 60 et 120  
Gabapentine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute ou si vous avez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques à ceux qui lui sont propres. Il peut être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1. COMPOSITION DU MÉDICAMENT

Chaque gélule contient 300mg ou 400mg de substance active : Gabapentine. Les autres composants sont : mannitol, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium.

Composants de l'enveloppe de la gélule : oxyde de fer jaune, sodium lauryl sulfate, dioxyde de titane, gélatine, eau.

PPV:92 DH 70

**NUPENTIN® 300 mg**  
Boîte de 30 gélules  
Voie orale



6 118 001 300020

de mouvements anormaux tels que torsions convulsives, saccades et raideur, tics dans les oreilles,

et d'effets indésirables qui apparaissent simultanément qui augmentent la taille des ganglions (petites masses de la peau), fièvre, éruption cutanée et inflammation du foie, de la peau et des yeux (ictère), inflammation du foie, œnale aiguë, incontinence urinaire,

du volume des seins, augmentation de la taille des seins

et de la glycémie chez les patients diabétiques, dégradation des fibres musculaires (rhabdomyolyse),

changement des résultats des tests sanguins (élévation de la créatine phosphokinase dans le sang).

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## 7. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec NUPENTIN® 300mg et 400 mg, gélule :

- si vous souffrez de problèmes rénaux votre médecin pourrait vous prescrire une dose différente,
- si vous êtes sous hémodialyse (pour purifier le sang si vous souffrez d'une insuffisance rénale), prévenez votre médecin si vous présentez des douleurs musculaires ou une faiblesse musculaire,

Nutritional values / Valeurs Nutritionnelles

	per / par 1 Tbl. / 1 Cp.	RD / AJR *
Vitamine C	80 mg	133 %
Niacine	16 mg α-TE	81 %
Vitamine E	12 mg α-TE	120 %
Acide Pantothenique	6 mg	100 %
Riboflavine (Vitamine B2)	1.4 mg	78 %
Vitamine B6	1.4 mg	70 %
Thiamine (Vitamine B1)	1.1 mg	79 %
Acide folique	200 µg	100%
Biotine	50 µg	33 %
Vitamine B12	2.5 µg	125 %
<hr/>		
	per / par 100 g Tbl. / Cp.	per / par
Energy/Energie	897 kJ (209 kcal)	37 kJ (8.6 kcal)
Salt / Sel	20.5 g	0.84 g
Carbohydrate / Glucides	18 g	0.7 g
thereof sugars / dont sucres	0.8 g	<0.1 g
Protein / Protéines	0.6 g	<0.1 g
Fat / Lipides	0.3 g	<0.1 g
thereof saturated fatty acids / dont acides gras saturés	0.3 g	<0.1 g

\* AJR: Apport Journalier Recommandé:  
1 dose = 1 comprimé. 1 tube contient 20 doses.

\* RD: recommended daily intake:  
1 serving = 1 tablet. One tube contains 20 servings.

Tous les produits Hansal sont fabriqués en Allemagne. Ils sont formulés avec des actifs scientifiquement testés, et fabriqués selon les normes pharmaceutiques les plus élevées.

Fabricant:  
Sanotact GmbH,  
Hessenweg 10, D-48157  
Münster, Allemagne.  
Distributeur Exclusif  
et titulaire de l'AMM:  
Pharma Jouvence SARL  
8 RUE MOHAMED SEDRI  
20040 Casablanca.

4 001728 370051

**hansal**

**MULTIVITAMINES**  
20 comprimés effervescents / effervescent tablets

10  
Vitamines  
Essentielles

Made in Germany



Poids Net / Net Weight: 82 g

PPV 82 DH

LOT :	EXP :
L02500	02/2026

**hansal**  
**MULTI  
VITAMINES**

**hansal**

**MULTI  
VITAMINES**

**FORME  
ET  
VITALITE**

1 comprimé par jour  
Goût Orange  
Sans Sucre  
Sans Gluten  
Formule Synergique



Complément Alimentaire

Made in Germany

Tous les produits Hansal sont fabriqués en Allemagne. Ils sont formulés avec des actifs scientifiquement testés, et fabriqués selon les normes pharmaceutiques les plus élevées.

**Produit** Complément alimentaire avec 10 vitamines. Ceci n'est pas un médicament. Avec édulcorant. Goût orange.

**Dose Recommandée:** 1 comprimé par jour, dissout dans un verre d'eau (200ml). **Ingrediénts:** acide citrique acide, régulateur d'acidité hydrogénocarbonate de sodium, agent de volume sorbitol, arômes, amidon de maïs, acide L-ascorbutique (vitamine C), maltodextrine, édulcorant cyclamate de sodium, DL acétate d'alpha-tocophérol (vitamine E), poudre de jus de betterave, nicotinamide, édulcorant saccharine-sodium, pantothenate de calcium, D. colorant riboflavine, pyridoxine (Vitamine B6) riboflavine (Vitamine B2) mononitrate de thiamine (vitamine B1), acide pteroylmonoglutamate (acide folique), D-biotine, cyanocobalamine (vitamine B12). Ne contient pas de : gluten, lactose, ingrédients d'origine animale, sucres ajoutés.

**Avertissement :** La dose journalière recommandée ne devrait pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne sont pas un substitut à un régime alimentaire varié et équilibré et à un style de vie sain. Garder hors de la portée de jeunes enfants. Conserver au frais et au sec, moins de 25°C. Garder l'étui bien fermé. A consommer avant le / numero de lot voir le fond du tube.

**Produit** Food supplement with 10 vitamins. Not a medicine. With sweeteners: Orange flavour. **Recommended intake:** 1 tablet per day, dissolved in a glass of water (200 ml). **Ingredients:** acid citric acid; acidity regulator sodium hydrogen carbonate, bulking agent sorbitol, flavourings, maize starch, L-ascorbic acid (vitamin C); maltodextrin, sweetener sodium cyclamate; DL-alpha-tocopherylacetate (vitamin E); beetroot juice powder, nicotinamide, sweetener saccharin-sodium, calcium D-pantothenate, colour riboflavin, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), thiamin mononitrate (vitamin B1), pteroylmonoglutamic acid (folic acid); D-biotin, cyanocobalamin (vitamin B12). Without gluten, lactose, animal ingredients, added sugar. **Warning:** The recommended daily intake indicated should not be exceeded. Food supplements are not a substitute for a varied and balanced diet and a healthy way of living. Keep out of young children's reach. Store below 25°C and dry, keep tube tightly closed. Best before end/batch number see tube bottom.

82 g

