

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1991 Société : R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

AMRI FATHA

Date de naissance :

20-03-59

Adresse :

Habitat et P.R.

A 99571

Tél. : 0661314567

Total des frais engagés : 3467,80

Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO - GASTRO - ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO - CHIRURGICALE  
Rés. Mawlid 4 Angle Bd. Abdelloumen  
et Bd. Anoual - Casablanca  
Tél : 05 22 98 41 10

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cachet du médecin :

Date de consultation :

06/03/2024

Nom et prénom du malade :

Amri Fatha

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

R61

colopathie

Pathologie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 18/03/2024

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/03/24	consult	rr	200,00	DR. BENNIS X
06/03/24	abc 637	3	400,00	600,00

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DALAL 10 Rue Al-Aziz Dalal Casablanca 05 22 992 764 U92020247	06/03/2024	2867,20

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux									
													
													
<p><b>O.D.F PROTHESSES DENTAIRES</b></p> <p><b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b></p> <table border="0"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>				H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	35533411	11433553	
H	25533412	21433552											
D	00000000	00000000											
B	35533411	11433553											
				Coefficient des Travaux									
				Montants des Soins									
				Date du devis									
				Date de l'Execution									

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

## Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Échographie Abdominale - Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris ( Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

## الدكتور بن尼斯 خالد

إختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والبواسير

خريج كلية الطب بانجي وباريس

شهادة التشخيص بالمنظار الباطني (باريس)


شهادة التشخيص في أمراض وجراحة المخرج (باريس)

عضو الجمعية الفرنسية في أمراض المخرج والمصارين

عضو الجمعية الفرنسية في الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, le ..... 06/03/2011

Amri Fatima



## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SINGULAIR.

- Si votre asthme ou votre respiration s'aggrave, informez immédiatement votre médecin.
- SINGULAIR par voie orale n'est pas destiné à traiter les crises aiguës d'asthme. En cas de crise, suivez les instructions de votre médecin. Ayez toujours sur vous votre traitement de secours par voie inhalée en cas de survenue d'une crise d'asthme.
- Il est important que vous ou votre enfant preniez tous les médicaments pour l'asthme prescrits par votre médecin. SINGULAIR ne doit pas être utilisé à la place d'autres médicaments que votre médecin vous a prescrits pour l'asthme.
- Tout patient traité par un médicament antiasthmatique doit être informé qu'il doit contacter son médecin en cas de symptômes tels qu'un syndrome pseudo-grippal, des fourmillements/engourdissements des bras et des jambes, une aggravation des symptômes pulmonaires et/ou une éruption cutanée.
- Vous ne devez pas prendre d'acide acétylsalicylique (aspirine) ou d'anti-inflammatoires (connus également sous le nom d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS) s'ils aggravent votre asthme.

Les patients doivent être avertis que divers événements neuropsychiatriques (par exemple, des modifications du comportement et de l'humeur) ont été rapportés chez des adultes, des adolescents et des enfants avec Singulair (voir rubrique 4). Si vous développez de tels symptômes au cours du traitement par Singulair, vous devez consulter votre médecin.

## Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 15 ans.

Différentes formes de ce médicament sont disponibles pour les enfants de moins de 18 ans en fonction de l'âge.

## Autres médicaments et SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Certains médicaments peuvent modifier l'effet de SINGULAIR, ou SINGULAIR peut modifier l'effet d'autres médicaments.

Avant de débuter votre traitement par SINGULAIR, informez votre médecin si vous prenez les médicaments suivants :

- du phénobarbital (utilisé pour le traitement de l'épilepsie),
- de la phénytoïne (utilisée pour le traitement de l'épilepsie),

- de la rifampicine (utilisée pour le traitement de la tuberculose et d'autres infections),
- du gemfibrozil (utilisé pour le traitement des taux élevés de lipides dans le plasma).

## SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé peut être pris pendant ou en dehors des repas.

## Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

## Grossesse

Votre médecin décidera si vous pouvez prendre SINGULAIR pendant cette période.

## Allaitement

Le passage de ce médicament dans le lait maternel n'est pas connu. Vous devez consulter votre médecin avant de prendre SINGULAIR si vous allaitez ou envisagez l'allaitement.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'est pas attendu que SINGULAIR ait un effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines. Cependant, la réponse au médicament peut varier d'une personne à l'autre. Certains effets indésirables (tels qu'étourdissements ou somnolence), rapportés avec SINGULAIR, peuvent affecter l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines chez certains patients.

## SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé contient du lactose et du sodium

Si votre médecin vous a informé que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

## 3. COMMENT PRENDRE SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Vous ne devez prendre qu'un seul comprimé de SINGULAIR par jour suivant la prescription de votre médecin.
- Il doit être pris même en l'absence de symptômes ou lors d'une crise d'asthme aiguë.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# SINGULAIR® 10 mg, comprimé pelliculé

Montelukast

Ver de  
inf



SINGULAIR® 10 mg.  
Montelukast sodique.  
Boîte de 28 comprimés pelliculés.

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA  
P.P.V: 307,00 DH  
AMM 206DMP/21/NCI

6

118001 160181

note notice  
int  
r be  
gez v  
ement



SINGULAIR® 10 mg.  
Montelukast sodique.  
Boîte de 28 comprimés pelliculés.

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA  
P.P.V: 307,00 DH  
AMM 206DMP/21/NCI

6

118001 160181

Ne le donnez pas à d'aut



SINGULAIR® 10 mg.  
Montelukast sodique.  
Boîte de 28 comprimés pelliculés.

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA  
P.P.V: 307,00 DH  
AMM 206DMP/21/NCI

QU'est-ce que SINGULAIR 10 mg, comprimé



SINGULAIR® 10 mg.  
Montelukast sodique.  
Boîte de 28 comprimés pelliculés.

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA  
P.P.V: 307,00 DH  
AMM 206DMP/21/NCI



SINGULAIR® 10 mg.  
Montelukast sodique.  
Boîte de 28 comprimés pelliculés.

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA  
P.P.V: 307,00 DH  
AMM 206DMP/21/NCI

maîtrise  
culé ?

ng, co  
ventu  
mg, cr  
infor

10 mg,

EST-IL UTILISÉ ?

TC: R03DC03

eurs aux leucotriènes  
triènes.

ment et un œdème

de leucotriènes dans vos poumons et provoquent également des symptômes d'allergie. En bloquant les leucotriènes, SINGULAIR améliore les symptômes de l'asthme, contribue au contrôle de l'asthme et peut améliorer les symptômes d'allergie saisonnière (connue également sous le nom de rhume des foins ou rhinite allergique saisonnière).

## Quand SINGULAIR doit-il être utilisé ?

Votre médecin vous a prescrit SINGULAIR pour le traitement de votre asthme, pour prévenir les symptômes d'asthme le jour et la nuit.

- SINGULAIR est indiqué chez les adultes et adolescents de 15 ans et plus insuffisamment contrôlés par leur traitement et qui nécessitent l'ajout d'un traitement complémentaire. également indiqué en traitement préventif s d'asthme déclenchés par l'effort. Les patients asthmatiques traités par leur asthme, SINGULAIR peut en même un soulagement symptomatique de la saisonnière. minera comment SINGULAIR doit être utilisé tômes et de la sévérité de votre asthme.

## Qu'est-ce que l'asthme ?

L'asthme est une maladie au long cours.

d :

à respirer en raison du rétrécissement des s. Ce rétrécissement des voies aériennes néaire en réaction à différentes circonstances, sensibles qui réagissent à différents que la fumée de cigarette, le pollen, rt,

gonflement (une inflammation) de la muqueuse des voies aériennes.

te l'asthme comprennent : toux, sifflement ue.

## l'allergie saisonnière ?

ière (connue également sous le nom de rhume ite allergique saisonnière) est une réponse ent provoquée par les pollens des arbres, des herbes transportés par l'air. Les symptômes sonnières peuvent généralement comprendre : un nez bouché, qui coule, qui pique ; des éternuements ; des yeux larmoyants, gonflés, rouges, qui piquent.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS

### A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SINGULAIR

#### 10 mg, comprimé pelliculé ?

Informez votre médecin en cas de problèmes médicaux ou d'allergies que vous présentez ou avez présentés.

### Ne prenez jamais SINGULAIR 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au montelukast ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### b) MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTION D'EMPLOI

Prendre des précautions particulières avec CALCIFIX® D3 en cas :

- de traitement prolongé, il est nécessaire de faire contrôler régulièrement la quantité de calcium éliminée dans les urines (calciurie). En fonction du résultat, votre médecin pourra être amené à réduire, voire à interrompre votre traitement,
- d'administration supplémentaire de calcium et de vitamine D à fortes doses qui doit se faire sous stricte surveillance médicale,
- de traitement associé à base de bisphosphonates, ainsi qu'en cas de traitement avec un antibiotique de la famille des cyclines, il est conseillé d'attendre au moins deux heures entre les prises de ces médicaments et de CALCIFIX® D3,
- de sarcoidose ou d'insuffisance rénale,
- d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire), en raison de la présence de sorbitol,
- d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase-isomérase (maladies métaboliques rares).

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### c) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

**AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN** en particulier les digitaliques, les cyclines, les bisphosphonates, l'estramustine, les sels de fer, les antiépileptiques et les diurétiques thiazidiques, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### d) GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas de grossesse, ne pas dépasser 1500 mg de calcium et 600 UI par jour de vitamine D3, soit un comprimé par jour.

**D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.**

### e) LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Aspartam, sorbitol et saccharose.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

### a) POSOLOGIE

Réserve à l'adulte.

La posologie quotidienne est de 2 comprimés par jour soit 1 comprimé matin et soir.

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.**

### b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Les comprimés sont à croquer, puis à avaler avec un grand verre d'eau, ou à sucer.

### c) FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Prendre ce médicament à distance des repas.

### d) DURÉE DU TRAITEMENT

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.**

### e) CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Lors de la prise d'une dose excessive de ce médicament, les symptômes suivants peuvent apparaître : nausées, vomissements, soif intense, constipation.



42,20

ette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre

nnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de  
rait lui être nocif.

voir besoin de la relire.

42,20

#### ET QUANTITATIVE

rant à calcium élément..... 500 mg

) UI/g\* correspondant à cholécalciférol (vitamine D3) ..... 400 UI

q.s.p. un comprimé

'alphacophérol, de graisses alimentaires, de gélatine, de saccharose et d'amidon de maïs.

#### FORME PHARMACEUTIQUE

#### NTATION

gr.

Lot T U 5 P  
EXP 03 2025  
PPV 42,20 D H

AMENT ?

chez le sujet âgé, en cas de carences en calcium et en vitamine D.

l'ostéoporose, lorsque l'apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.

42,20

#### LE MÉDICAMENT ?

dans les cas suivants :

en des constituants,

42,20

ient élevée (hypercalcémie),

par l'urine (hypercalciurie),

ire due à un déficit enzymatique), en raison de la présence d'aspartam.

IMPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole).

- Si vous prenez un médicament contenant du néfénlavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas OEDES 20 mg, gélule gastro-résistante. Si vous avez des douleurs, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre OEDES 20 mg.

#### Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre OEDES 20 mg, gélule.

Des réactions cutanées graves, notamment le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrose épidermique toxique, la réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS) et la pustulose exanthématoïde aiguë généralisée (PEAG), ont été rapportées en association avec le traitement par l'omeprazole. Arrêtez d'utiliser Oedes 20mg, gélule et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des symptômes liés à ces réactions cutanées graves décrits dans la rubrique 4.

OEDES 20 mg peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre OEDES 20 mg ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :

- Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes à avaler.
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.
- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.
- Vous avez des selles noires (teintées de sang).
- Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'omeprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.
- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.
- Si vous êtes déjà arrivé de développer une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à OEDES qui réduit l'acidité de l'estomac.

• Vous devez effectuer un examen sanguin spécifique (Chronogramme AI). Si vous prenez OEDES 20 mg au long-cours (durée supérieure à un an), votre médecin vous surveillera régulièrement de façon régulière. Vous devez définir précisément tous les symptômes et événements nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que OEDES 20 mg, gélule gastro-résistante, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier au niveau des zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que possible, car vous devrez peut-être arrêter votre traitement avec OEDES 20 mg. Rappelez-vous de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

#### Enfants :

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme, bien que celui-ci ne soit pas recommandé. Ne donner pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou < 10 kg.

#### Interactions avec d'autres médicaments:

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Cela concerne également les médicaments que vous achetez sans ordonnance.

OEDES 20 mg peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur OEDES 20 mg.

Vous ne devez pas prendre OEDES 20 mg si vous prenez un médicament contenant du néfénlavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Kétonazole, itraconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques);
- Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques);
- Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire);
- Phényletoïne (utilisé dans l'épilepsie); si vous prenez de la phényletoïne, une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 2 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.

- Si l'ulcère n'a pas été complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

• Traitements des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 4 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.

• Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

Prévention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique :

- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.

• Traitements de l'ulcère duodénal et gastrique provoqué par des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Prévention des ulcères duodénal et de l'estomac si vous prenez des AINS :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

• Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par *Helicobacter pilori*:

- La dose recommandée est de 20 mg d'OEDES 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.

• Votre médecin va vous prescrire en même temps deux antibiotiques parmi l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole.

• Traitement d'un excès d'acidité dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison).

- La dose recommandée est de 60 mg par jour.

• Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décidera également de la durée pendant laquelle vous prendrez le médicament.

#### Utilisation chez les enfants et adolescents:

• Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitations acides.

Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 10 kg peuvent prendre OEDES 20 mg. La posologie dépendra du poids de l'enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.

• Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par *Helicobacter pilori*:

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre OEDES 20 mg. La posologie dépendra du poids de l'enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.
- Votre médecin prescrira à votre enfant deux antibiotiques en même temps : l'amoxicilline et la clarithromycine.

• Posologie :

- Il est recommandé de prendre vos gélules le matin.

• Les gélules peuvent être prises avec de la nourriture ou à jeun.

- Elles doivent être avalées entières avec un demi-verre d'eau. Les gélules ne doivent pas être mordues ni croquées car elles contiennent des granulés pelliculés ce qui empêche le médicament d'être détruit par l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas détruire les granulés. Que faire si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler les gélules :

• Ouvrir la gélule et avaler le contenu directement avec un demi-verre d'eau ou mettre le contenu dans un verre d'eau non gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme ou ananas) ou dans de la compote de pomme.

- Toujours remuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Pour s'assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne pas les manger ni les croquer.

Si vous avez pris plus de OEDES 20 mg que vous n'auriez dû :

• Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre OEDES 20 mg, gélules

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez.

Effets indésirables à des rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

• Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).

• Agressivité.

• Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives

• Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.

• Erythème polymorphe.

• Faiblesse musculaire.

• Gonflement des seins chez l'homme.

Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut pas être estimé à partir des données disponibles)

• Inflammation de l'intestin (entrant dans des diarrhées)

- Si vous prenez OEDES 20 mg pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des examens sanguins pour surveiller votre taux de magnésium.
- Eruption cutanée, éventuellement avec des douleurs dans les articulations.

OEDES 20 mg peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

#### Déclaration des effets secondaires:

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER OEDES 20 mg, gélules ?

• Conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

• N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte (La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois mentionné).

• Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

• Ce qui contient OEDES 20 mg, gélules ?

• La substance active est :

• Oméprazole ..... 20 mg

• Les autres composants :

• Carbonate de magnésium léger, Hydroxypropylcellulose,

• Hydroxypropylphosphate de sodium dihydraté, Amidon, Talc, Sucre

• pulvérulé, Sucre granulé 850µ, Hydroxypropylméthycellulose, Eudragit L

• 100 55, Dioxyde de titane, Polysorbate 80, Macrogol 6000, Silice

• colloidale anhydre, Pellets d'hydroxyde de sodium, Eau purifiée en q.s.p

• 1 gélule.



41, rue Mohammed Diouri, 20110 Casablanca

Conditions de prescription et de livraison: Tableau C (Liste II).

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : Juillet 2022.

# OEDES® 20 mg

Microgranules gastro-résistants en gélules,  
boîtes de 7, 14, 28 et 56  
(Oméprazole)

Conseils utiles de cette notice avant de prendre  
vos importantes à la fois

de la relire.  
votre médecin ou votre  
pharmacien. Ne le donnez  
être nocif, même si les  
sirable, parlez-en à votre  
médecin ou votre pharmacien.  
indésirable qui ne serait pas mentionné

LOT : 220837  
PER : 11-2024  
PPV : 140.00DH

est-il utilisé?  
de prendre OEDES®

LOT : 220837  
PER : 11-2024  
PPV : 140.00DH

ANS QUELS CAS

Classe pharmaco-therapéutique :  
PPV : 92,50 DH

active Oméprazole. Il appartient à  
inhibiteurs de la pompe à protons.  
te par votre estomac.

es affections suivantes :  
L'acide de l'estomac remonte au  
à la gorge à l'estomac) entraînant

des de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de  
votre estomac (ulcère gastrique).

COOPER PHARMA  
PPV : 92,50 DH

230642

2023025

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (rérgurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

• les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OEDES 20 mg, gélules gastro-résistante?

Contre-indications :

• ne prenez jamais oedes 20 mg, gélule :

si vous êtes allergique à l'omeprazole ou à l'un des autres composants

contenus dans OEDES 20 mg.

• si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par

l'arrêt de l'administration de OEDES 20 mg :

- Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K; une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de OEDES 20 mg.
- Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose) ;
- Aztreonam (utilisé pour traiter l'infection VIR) ;
- Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe) ;
- Milperolol (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée) ;
- Clofazimine (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente) ;
- Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection VIR) ;
- Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus)).
- Eribulin (utilisé dans le traitement du cancer).
- Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) – si vous prenez une autre dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par OEDES 20 mg, gélule gastro-résistante.

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline

et clarthromycine avec OEDES 20 mg pour le traitement d'un ulcère à

Helicobacter pylori, il est important que vous informez votre médecin de

tous les autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Voir Posologie.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies

alternatives :

Sans objet.

Grossesse, Allaitement et Fertilité :

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'omeprazole est excrété dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il y ait une influence sur l'enfant lorsqu'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre OEDES 20 mg pendant l'allaitement.

Sportifs: Sans objet.

Conduite de véhicule et utilisation des machines:

OEDES n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Des effets secondaires tels qu'un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire (voire effets indésirables). Si c'est le cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

Mentions relatives aux accès à effet notoire :

OEDES 20 mg, gélule contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par gélule, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE OEDES 20 mg, gélule gastro-résistante ?

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

Posologie :

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous:

Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitation acide :

- Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.

• La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

• Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) :

Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrivez de prendre OEDES 20 mg:

N'arrêtez pas de prendre OEDES 20 mg sans avis au préalable de votre médecin ou pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) ou très rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000) mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves/rare).
- Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrose épidermique toxique/rare).
- Éruption cutanée rouge, squameuse et généralisée avec des bosses sous la peau et des cloques, accompagnée de fièvre. Les symptômes apparaissent généralement au début du traitement (pustulose exanthémique aiguë généralisée/rare).
- Jaunisse, urine foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie (rare).

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• Maux de tête.

• Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.

• Nausées ou vomissements.

• Polypes bénins dans l'estomac.

Effets indésirables peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• Gonflement des pieds et des chevilles.

• Troubles du sommeil (insomnie).

• Éboulements, fourmillements, somnolence.

• Vertiges.

• Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.

• Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

• Malaise général, manque d'énergie.

Effets indésirables très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

• Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses ou faciliter la survenue d'infections.

• Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.

• Agitation, confusion ou dépression.

• Troubles du goût.

• Troubles de la vue, tels que vision trouble.

• Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).

• Sécheresse buccale.

• Inflammation de l'intérieur de la bouche.

• Infection appelée « muguet » qui peut affecter l'intestin et est causé par un champignon.

• Perte de cheveux (alopecie).

• Éruption cutanée lors d'une exposition au soleil.

• Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).

• Problèmes rénaux sévères (néphrite interstitielle).

• Augmentation de la sueur.

**Docteur BENNIS Khalid**

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Echographie Abdominale - Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris ( Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

Casablanca, le 06/03/24

Amri Fatiha

Facture = 400 DH

Echo Abdominale

K 30

~~Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO - GASTRO - ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO - CHIRURGICALE  
Rés. Mawlid 4 Angle Bd. Abdelmoumen  
et Bd. Anoual - Casablanca  
Tél : 05 22 98 41 16~~

Résidence " AL Mawlid 4" Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual

2ème Etage N° "A 24" - CASABLANCA - Tél.: 05 22 98 41 16

Portable Cabinet : 06 65 04 25 69

DOCTEUR BENNIS KHALID

SPECIALISTE en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplômé d'Échographie Abdominale Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale Paris (St Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

## ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

06/03/2024

**AMRI Fatiha**

### Clinique

BALLONNEMENT ABDOMINAL AVEC CONSTIPATION INTERMITTENTE.  
PYROSIS INTERMITTENT IPP DEPENDANT.

### Examen

Foie de taille normale (FH= 11 cm), d'échostructure homogène et de contours réguliers.

Absence de syndrome de masse; absence de dilatation des VBIH.

TP de calibre normal ( 8 mm).VBP fine ( 2 mm).

Vésicule biliaire alithiasique, à paroi fine .

Pancréas normal et homogène dans son ensemble.

Absence d'adénopathies profondes.


Rate homogène, de taille normale (grand axe de 6 cm).Aspect moucheté du cadre colique.

Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles.Vessie et utérus normaux.

### Conclusion

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE NORMALE. ENCOMBREMENT STERCORAL COLIQUE.


Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO - GASTROENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO - CHIRURGICALE  
Rés. Mawlid 4 Angle Bd. Abdelmoumen  
et Bd. Anoual - Casablanca  
Tél 05 22 98 41 16





DR BENNIS KHALID  
06/03/24 11:57:53

Abdomen



B  
Frq 4.0 MHz  
Gn 18  
E/A 1/4  
CarteC/O/  
D 16.0 cm  
DR 63  
FR 36 Hz  
AO 100 %  
XBea m Off



DR BENNIS KHALID  
06/03/24 11:56:19

MI 0.4 Tls 0.2 C2-5-RC  
Abdomen



B  
Frq 4.0 MHz  
Gn 18  
E/A 1/4  
CarteC/O/  
D 16.0 cm  
DR 63  
FR 36 Hz  
AO 100 %  
XBea m Off

1 L 12.53 cm  
2 L 9.20 cm