RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'H
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Autorisation CNDP N° : A-A-215 /2019

MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M23-009135

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4720 Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : Zineddine Yamina

Date de naissance : 13 / 10 / 1967

Adresse : 10, rue El Farabi Hay Yasmina Berrechid

Tél. : 0663180297 Total des frais engagés : 400,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Professeur Hassan EL GHOMARI Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie et Nutrition Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoual et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél : 05 22 98 14 14

Date de consultation : 01 / 03 / 2024

Nom et prénom du malade : Zineddine Yamina Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Berrechid **Le :** 12 / 03 / 2024

Signature de l'adhérent(e) :

MUPRAS 12 MAR. 2024 ACCUEIL

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie M23-0009135

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Cœfficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07.03.24	S		300dh	

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoual
et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél : 05 22 86 14 14

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE YASMINA 77 Rue Ibn Nafiss Hay Yassmina Berrechid - Tél : 0522 53 31 82 ICE : 000508818000240	07/03/24	183,00

062057401

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE CENTRAL BERRECHID Dr Abdelhamid HAWAZINE Pharmacien Biologiste	07 03 24		549,00 Dhs

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre AM	Nombre PC	Nombre IM	Nombre IV	Montant détaillé des Honoraires

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Cœfficient



CŒFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 | 21433552
00000000 | 00000000
D — G
00000000 | 00000000
35533411 | 11433553
B

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



CŒFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Hassan EL GHOMARI
Professeur à la F.M.P.C
Spécialiste en Endocrinologie - Diabètologie
Nutrition & Croissance
Ancien Attaché à l'hôpital Saint Luc
de Montréal - Canada

الدكتور حسن الغماري
أستاذ جامعي بكلية الطب و الصيدلة
أخصائي أمراض الغدد – داء السكري
التغذية و النمو
طبيب سابقا بمستشفى سان لوك
مونتريال – كندا

Casablanca, le : 07.03.24 الدار البيضاء في :

Mme ZINEDDINE Samira

24,40 x 5

LEVOTHYROX 100

1 cp/j le matin 30 min avant le repas pendant 6 mois

6,80 x 7 = 13,40

LEVOTHYROX 25

1cp /j 5 j/7
1/2 cp 2 j/7 , pendant 6 MOIS

RELAXIUM 375

1 gel / jour le soir , pendant 1 MOIS

PHARMACIE YASMINA
77 Rue Ibn Nafiss Hay Yassmina
Berrechid - Tél. : 05 22 53 31 88
ICE : 000508818000024
INPE : 06205740 01

PHARMACIE YASMINA
77 RUE IBNOU NAFIS
HAY Yasmina Ber. Tél
Tél : 05 22 53 31 38

183,00

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabètologie et Nutrition
Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoual
et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél : 05 22 86 14 14

مركز عبد المومن، زاوية شارع أنوال و شارع عبد المومن، الطابق الثالث – رقم 313 – الدار البيضاء
Abdelmoumen Center, Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen, 3ème étage - N° 313 - Casablanca
E-mail : hassanelghomari@yahoo.fr - البريد الإلكتروني - Tél. : 05 22 86 14 14 الهاتف :
N° INP : 091028506 - ICE : 001663750000032

Docteur Hassan EL GHOMARI
Professeur à la F.M.P.C
Spécialiste en Endocrinologie - Diabètologie
Nutrition & Croissance
Ancien Attaché à l'hôpital Saint Luc
de Montréal - Canada

الدكتور حسن الغماري
أستاذ جامعي بكلية الطب و الصيدلة
أخصائي أمراض الغدد – داء السكري
التغذية و النمو
طبيب سابقا بمستشفى سان لوك
مونتريال – كندا

Casablanca, le : 07.03.14 الدار البيضاء في :

Mme ZINEDDINE Samira

Merci de bien vouloir réaliser les examens suivant :

Glycémie à jeun
TSH ultra sensible
Calcémie
HDL+LDL+TG
Cholesterol total

Laboratoire Central Ezraz ★ Biologie médicale ★ Pharmacie
BERRECHID
★ Dr Abderrahmid HAMAZIME ★

CABINET D'ENDOCRINOLOGIE DIABÉTOLOGIE & NUTRITION

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoual
et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél : 05 22 86 ..

مركز عبد المومن، زاوية شارع أنوال و شارع عبد المومن، الطابق الثالث – رقم 313 – الدار البيضاء
Abdelmoumen Center, Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen, 3ème étage - N° 313 - Casablanca
E-mail : hassanelghomari@yahoo.fr : البريد الإلكتروني - Tél. : 05 22 86 14 14 / 05 22 86 37 44 : الهاتف
N° INP : 091028506 - ICE : 001663750000032

LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES MEDICALES ERRAZI

LABORATOIRE CENTRAL

المختبر المركزي للتحليلات الطبية الرازي

Biochimie - Hématologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

Dr. EL GHOMARI HASSAN
Date du prélèvement : 07/03/24
Dossier édité le : 07/03/2024
Code Patient : 148034

Mme ZINEDDINE Samira

Prélèvement Effectué au Laboratoire

070324 019

BIOCHIMIE SANGUINE

	KONELAB 20i		Valeurs de référence	Antécédents
GLYCEMIE A JEUN ..... :	0,81	g/l	(0.7 à 1.10)	22/09/23 : 0.88
ou ..... :	4,50	mmol/l	(3,88 à 6,12)	
CALCIUM ..... :	94,75	mg/l	(86 à 103)	22/09/23 : 96.40
ou ..... :	2,37	mmol/l	(2,20 à 2,55)	
CHOLESTEROL TOTAL ..... :	2,03	g/l	(< 2,20)	27/03/23 : 2.15
ou ..... :	5,24	mmol/l	(3,61 à 5,68)	
TRIGLYCERIDES ..... :	1,13	g/l	(<1.50)	27/03/23 : 0.85
ou ..... :	1,29	mmol/l	(< à 1,72)	
CHOLESTEROL HDL ..... :	0,58	g/l	(0.30 à 0.60)	27/03/23 : 0.57
ou ..... :	1,50	mmol/l	(à > 1,03)	

CHOLESTEROL LDL ..... : 1,22 g/L

Nbr de facteurs de risque*	Valeur Cible du LDL-C (g/l)
aucun	< 2,20
1	< 1,90
2	< 1,69
> ou = 3	< 1,30
Patient à haut risque	< 1,00

*: Diabète, obésité, HTA, age>60ans, tabac, HDL-C<0,40g/L et antécédents familiaux de maladie coronaire.

ENDOCRINOLOGIE

			Valeurs de référence	Antécédents
TSH(Ultra-sensible) ..... :	6,26	µIU/ml		22/09/23 : 3.89

Par Chimiluminescence sur Architect abbott

Valeurs attendues
Euthyroidie ..... : 0.25 à 5 µIU/ml
Hyperthyroidie .... : < à 0.15 µIU/ml
Hypothyroidie ..... : > à 7 µIU/ml

INPE 063060990

Avenue Mohamed V, Dar Hakami derrière la Préfecture de Police - Berrechid - Tél. : 05 22 32 88 49
Fax : 05 22 32 48 88 - E-mail : hazn.biolog@gmail.com - Patente : 40712914 - RC : 15608
ICE : 001638113000039 - Autorisation N° : 5814

LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES
MEDICALES ERRAZI
المختبر المركزي للتحليلات
الطبية الرازي
LABORATOIRE CENTRAL
Biochimie - Hématologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

FACTURE N° : 24003312

BERRECHID ..... : 07/03/2024
Nom et Prénom ... : Madame Samira ZINEDDINE
Prescripteur .... : Dr. EL GHOMARI HASSAN

CODE	ANALYSES	Clé	B/HN	PRIX EN DH
B 164	TSH	B	250	275,00
B 109	CHOLESTEROL LDL CALCULE	B	50	55,00
B 108	CHOL HDL	B	50	55,00
B 134	TRIGLYCERIDES	B	50	55,00
B 106	CHOLESTEROL TOTAL	B	30	33,00
B 104	CALCIUM	B	30	33,00
B 118	GLYCEMIE A JEUN	B	30	33,00

Montant Net ..... : **549,00 Dhs** (Soit 490 B/ 0 HN)

Arrêtée la présente facture à la somme de:
Cinq cent quarante neuf Dirhams et zéro centime

INPE 063060990

Dr. A HAWAZINE

Avenue Mohamed V, Dar Hakami derrière la Préfecture de Police - Berrechid - Tél. : 05 22 32 88 49
Fax : 05 22 32 48 88 - E-mail : hazn.biolog@gmail.com - Patente : 40712914 - RC : 15608
ICE : 001638113000039 - Autorisation N° : 5814

•في حالة الإصابة بأمراض [illegible]
شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم،
في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).
•في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.
هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (امراض وراثية نادرة).
إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية (قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنتِ حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.
عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.
هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").
فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.
يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع

اشتراك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيركس

ابلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيركس.
من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكس (أكثر من 2 ساعة إن أمكن) الأدوية التالية :
•الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،
•الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجات التبادل الأيوني، سوكرالفات، الموضعي المعدي ـ المعوي، مضادات الحموضة والممتصات)،
•سيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم عند مريض غسيل الكلى
المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:
•الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،
•الأدوية لعلاج السل،
•(الأدوية لعلاج الملاريا (الكلوروكين / البروغوانيل،
•الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون، منع الحمل
•الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،
•المواد الأخرى مثل إيماتينب، سونيتينيب،، أورليستات،
عليكم بإشعار طبيبكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية .مكملات مع الصويا
استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنتِ حاملا أو كنتِ ترضعين، و إذا كنتِ تعتقدين أن تكونين حاملا أو تخططين للحمل، اسألي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع
•تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)
•علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
•عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
•ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

اذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال.
تاريخ انتهاء الصلاحية
لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ المذكور على E/ العلبة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في جاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضـ
إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات و[illegible]ة للتدهور
لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الإجراءات ستسمح بحماية البيئة.

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليفوتيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ، 100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟
المادة الفعّالة هي:
ليفوتيروكسين صودي ..... 25 ميكروغرام
.... 50 ميكروغرام
.... 100 ميكروغرام
.... 200 ميكروغرام
.... لقرص قابل للقطع

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين، كروسكارميلوز صودي، ستيارات المغنزيوم
قائمة السواغات ذو تأثير معروف
لاكتوز
الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء يرـ على شكل قرص أبيض قابل للقطع.
كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانّع:

ميرك كيه جي ايه ايه ـ فرانكفورتر شتراس250 ـ 64293 دار مشتات ـ ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء، المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسليم

القائمة II

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30أبريل2015

•في حالة الإصابة بأمراض [illegible]
شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم،
في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).
•في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.
هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (امراض وراثية نادرة).
إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية (قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنتِ حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.
عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.
هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").
فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.
يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع

اشتراك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيركس

ابلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيركس.
من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكس (أكثر من 2 ساعة إن أمكن) الأدوية التالية :
•الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،
•الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجات التبادل الأيوني، سوكرالفات، الموضعي المعدي ـ المعوي، مضادات الحموضة والممتصات)،
•سيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم عند مريض غسيل الكلى
المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:
•الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،
•الأدوية لعلاج السل،
•(الأدوية لعلاج الملاريا (الكلوروكين / البروغوانيل،
•الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون، منع الحمل
•الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،
•المواد الأخرى مثل إيماتينب، سونيتينيب،، أورليستات،
عليكم بإشعار طبيبكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية .مكملات مع الصويا
استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنتِ حاملا أو كنتِ ترضعين، و إذا كنتِ تعتقدين أن تكونين حاملا أو تخططين للحمل، اسألي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع
•تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)
•علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
•عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
•ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

اذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال.
تاريخ انتهاء الصلاحية
لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ المذكور على E/ العلبة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في جاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضـ
إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات و[illegible]ة للتدهور
لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الإجراءات ستسمح بحماية البيئة.

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليفوتيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ، 100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟
المادة الفعّالة هي:
ليفوتيروكسين صودي ..... 25 ميكروغرام
.... 50 ميكروغرام
.... 100 ميكروغرام
.... 200 ميكروغرام
.... لقرص قابل للقطع

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين، كروسكارميلوز صودي، ستيارات المغنزيوم
قائمة السواغات ذو تأثير معروف
لاكتوز
الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء يرـ على شكل قرص أبيض قابل للقطع.
كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانّع:

ميرك كيه جي ايه ايه ـ فرانكفورتر شتراس250 ـ 64293 دار مشتات ـ ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء، المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسليم

القائمة II

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30أبريل2015

•في حالة الإصابة بأمراض [illegible]
شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم،
في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).
•في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.
هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (امراض وراثية نادرة).
إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية (قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنتِ حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.
عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.
هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").
فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.
يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع

اشتراك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيركس

ابلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيركس.
من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكس (أكثر من 2 ساعة إن أمكن) الأدوية التالية :
•الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،
•الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجات التبادل الأيوني، سوكرالفات، الموضعي المعدي ـ المعوي، مضادات الحموضة والممتصات)،
•سيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم عند مريض غسيل الكلى
المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:
•الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،
•الأدوية لعلاج السل،
•(الأدوية لعلاج الملاريا (الكلوروكين / البروغوانيل،
•الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون، منع الحمل
•الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،
•المواد الأخرى مثل إيماتينب، سونيتينيب،، أورليستات،
عليكم بإشعار طبيبكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية .مكملات مع الصويا
استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنتِ حاملا أو كنتِ ترضعين، و إذا كنتِ تعتقدين أن تكونين حاملا أو تخططين للحمل، اسألي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع
•تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)
•علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
•عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
•ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

اذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال.
تاريخ انتهاء الصلاحية
لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ المذكور على E/ العلبة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في جاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضـ
إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات و[illegible]ة للتدهور
لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الإجراءات ستسمح بحماية البيئة.

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليفوتيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ، 100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟
المادة الفعّالة هي:
ليفوتيروكسين صودي ..... 25 ميكروغرام
.... 50 ميكروغرام
.... 100 ميكروغرام
.... 200 ميكروغرام
.... لقرص قابل للقطع

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين، كروسكارميلوز صودي، ستيارات المغنزيوم
قائمة السواغات ذو تأثير معروف
لاكتوز
الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء يرـ على شكل قرص أبيض قابل للقطع.
كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانّع:

ميرك كيه جي ايه ايه ـ فرانكفورتر شتراس250 ـ 64293 دار مشتات ـ ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء، المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسليم

القائمة II

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30أبريل2015

•في حالة الإصابة بأمراض [illegible]
شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم،
في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).
•في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.
هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (امراض وراثية نادرة).
إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية (قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنتِ حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.
عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.
هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").
فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.
يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع

اشتراك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيركس

ابلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيركس.
من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكس (أكثر من 2 ساعة إن أمكن) الأدوية التالية :
•الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،
•الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجات التبادل الأيوني، سوكرالفات، الموضعي المعدي ـ المعوي، مضادات الحموضة والممتصات)،
•سيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم عند مريض غسيل الكلى
المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:
•الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،
•الأدوية لعلاج السل،
•(الأدوية لعلاج الملاريا (الكلوروكين / البروغوانيل،
•الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون، منع الحمل
•الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،
•المواد الأخرى مثل إيماتينب، سونيتينيب،، أورليستات،
عليكم بإشعار طبيبكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية .مكملات مع الصويا
استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنتِ حاملا أو كنتِ ترضعين، و إذا كنتِ تعتقدين أن تكونين حاملا أو تخططين للحمل، اسألي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع
•تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)
•علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
•عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
•ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

اذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال.
تاريخ انتهاء الصلاحية
لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ المذكور على E/ العلبة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في جاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضـ
إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات و[illegible]ة للتدهور
لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الإجراءات ستسمح بحماية البيئة.

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليفوتيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ، 100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟
المادة الفعّالة هي:
ليفوتيروكسين صودي ..... 25 ميكروغرام
.... 50 ميكروغرام
.... 100 ميكروغرام
.... 200 ميكروغرام
.... لقرص قابل للقطع

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين، كروسكارميلوز صودي، ستيارات المغنزيوم
قائمة السواغات ذو تأثير معروف
لاكتوز
الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء يرـ على شكل قرص أبيض قابل للقطع.
كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانّع:

ميرك كيه جي ايه ايه ـ فرانكفورتر شتراس250 ـ 64293 دار مشتات ـ ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء، المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسليم

القائمة II

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30أبريل2015

•في حالة الإصابة بأمراض [illegible]
شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم،
في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).
•في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.
هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (امراض وراثية نادرة).
إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية (قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنتِ حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.
عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.
هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").
فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.
يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع

اشتراك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيركس

ابلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيركس.
من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكس (أكثر من 2 ساعة إن أمكن) الأدوية التالية :
•الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،
•الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجات التبادل الأيوني، سوكرالفات، الموضعي المعدي ـ المعوي، مضادات الحموضة والممتصات)،
•سيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم عند مريض غسيل الكلى
المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:
•الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،
•الأدوية لعلاج السل،
•(الأدوية لعلاج الملاريا (الكلوروكين / البروغوانيل،
•الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون، منع الحمل
•الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،
•المواد الأخرى مثل إيماتينب، سونيتينيب،، أورليستات،
عليكم بإشعار طبيبكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية .مكملات مع الصويا
استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنتِ حاملا أو كنتِ ترضعين، و إذا كنتِ تعتقدين أن تكونين حاملا أو تخططين للحمل، اسألي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع
•تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)
•علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
•عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
•ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

اذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال.
تاريخ انتهاء الصلاحية
لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ المذكور على E/ العلبة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في جاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضـ
إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات و[illegible]ة للتدهور
لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الإجراءات ستسمح بحماية البيئة.

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليفوتيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ، 100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟
المادة الفعّالة هي:
ليفوتيروكسين صودي ..... 25 ميكروغرام
.... 50 ميكروغرام
.... 100 ميكروغرام
.... 200 ميكروغرام
.... لقرص قابل للقطع

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين، كروسكارميلوز صودي، ستيارات المغنزيوم
قائمة السواغات ذو تأثير معروف
لاكتوز
الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء يرـ على شكل قرص أبيض قابل للقطع.
كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانّع:

ميرك كيه جي ايه ايه ـ فرانكفورتر شتراس250 ـ 64293 دار مشتات ـ ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء، المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسليم

القائمة II

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30أبريل2015

في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة
من المعلومات من طبيبك أو الصيدلي.

7871391098

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

.يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى و لو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
4 - م
5 - م للقطع ؟
6 - م

1- ما ... ي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلاني العلاجي

هذا الدواء هرمونة درقية

دواعي الاستعمال

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة.

وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات

ليفوتيروكس *ليس لديه أي آثار* على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

.يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى و لو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
؟
ابل للقطع ؟
هي حالات استعماله؟
الد
هذا الدواء هرمونة درقية
دواعي الاستعمال



فترة الحمل.
الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.
الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.
قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة.
وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات
ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

.يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى و لو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
؟
ابل للقطع ؟
هي حالات استعماله؟
الد
هذا الدواء هرمونة درقية
دواعي الاستعمال



فترة الحمل.
الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.
الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.
قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة.
وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات
ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

.يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى و لو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
؟
ابل للقطع ؟
هي حالات استعماله؟
الد
هذا الدواء هرمونة درقية
دواعي الاستعمال



فترة الحمل.
الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.
الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.
قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة.
وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات
ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

.يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى و لو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
؟
ابل للقطع ؟
هي حالات استعماله؟
الد
هذا الدواء هرمونة درقية
دواعي الاستعمال



فترة الحمل.
الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.
الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.
قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة.
وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات
ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

.يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى و لو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
؟
ابل للقطع ؟
هي حالات استعماله؟
الد
هذا الدواء هرمونة درقية
دواعي الاستعمال



فترة الحمل.
الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.
الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.
قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة.
وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات
ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

.يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى و لو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
؟
ابل للقطع ؟
هي حالات استعماله؟
الد
هذا الدواء هرمونة درقية
دواعي الاستعمال



فترة الحمل.
الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.
الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.
قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة.
وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات
ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

.يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى و لو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
؟
ابل للقطع ؟
هي حالات استعماله؟
الد
هذا الدواء هرمونة درقية
دواعي الاستعمال



فترة الحمل.
الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.
الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.
قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة.
وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات
ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات