

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de éducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Rise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tel. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

W21-833267

2. 200062

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

10603

Société :

Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

MAKINSI - SAID

Date de naissance :

07/09/1968

Adresse :

Gh3 rendue 2013 etage 3 em N° 13 Am chell

CASA Blanche

Tél. 06 61 63 32 66

Total des frais engagés

15000

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : CHIMENTOUN AICHA

Age : 07/06/1970

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

AFFECTION ORL

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 25 MAR. 2013

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/03/24	C2	7	3000H	DR. ALOANE Mohamed Amine Specialiste en ORL et Chirurgie de l'oreille, du nez et du appareil respiratoire. Angle de l'Av. des Ouds et Bd. Hassan II, Casablanca 20040. Tel: 0522 54 39 39

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
HARMACIE BOULEVARD EL QODS SLAOUI HANNA 54, Boulevard El Qods 39 39 Casablanca	01/03/24	344.90

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en c^os de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'O.D.F.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Montant des Honoraires	Coefficient DES TRAVAUX
<img alt="Diagram of a dental arch with numbered teeth from 1 to 8 in the upper arch and 1 to 8 in the lower arch. The diagram is oriented with H at the top, G at the right, D at the left, and B at the bottom. The teeth are numbered sequentially from 1 to 8 in each arch."/					

- Traitement de la surdité
- Chirurgie de la thyroïde
- Traitement du vertige
- Prise en charge du ronflement
- Rhinite Allergique
- Chirurgie endoscopique
- Ancien médecin à l'hôpital
20 Aout Casablanca



Thermo-ablation thyroïdienne
علاج الغدة الدرقية بالتردد الحراري

Casablanca le :

01 Mars 2024

الدار البيضاء في:

CHIMOUN AICHA

40,00

COTIPRED 20 MG

(S.V)

3 cp le matin pendant 5 jours

119.10

TABUNEX

(P. O. 7)

PHARMACIE BOULEVARD QODS
SLAOUI HAMDA ZAHRA
54, Boulevard El Qods
54, Ain Chock Casablanca
Tel: 05 22 52 39 39

(S.V)

18.10 x 2 2 pulv le matin pendant 1 mois

18.10 x 2

OTRIVINE

(S.V)

1 pulv le soir pdt 15 jours

74.80 x 2

SEPCEN 500

(S.V)

1 comprimé 2 fois par jour * 10 jours

344.90

Dr. ALLOUANE Mohamed Amine
Spécialiste en ORL et Chirurgie
Angle Bd. Al Qods et Bd. Haïfa
Tel: 05 22 50 04 40/06 10 88 02 35



RISONEL® 0.05%

FUROATE DE MOMÉTASONE

Boîte d'un flacon de 140 doses
Suspension pour pulvérisation nasale.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise :

Furoate de mométasone monohydratée..... 51,8 microgrammes.

Quantité correspondant à furoate de mométasone anhydre..... 50 microgrammes Pour une dose.

Une pulvérisation, délivre une dose de 50 microgrammes de furoate de mométasone anhydre.

Ce médicament se présente sous forme de suspension pour pulvérisation nasale. Boîte de 140 doses. Un flacon correspond à 140 Pulvérisations

Les autres composants sont :

Excipients : Glycerine, Cellulose microcristalline et carbonate de sodium, Citrate de sodium dihydraté, Acide citrique et hydrochloride de benzalkonium, Polysorbate 80, Eau purifiée.

Liste des excipients à effet notable :

Chlorure de benzalkonium, glycerine.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE OU LE CORTICOIDE A USAGE LOCAL, (R: système respiratoire)

Le furoate de mométasone est un glucocorticoïde, anti-inflammatoire locale.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Ce médicament contient un corticoïde. C'est un traitement qui s'administre par voie nasale.

Il est indiqué :

- chez l'adulte et l'enfant de plus de 3 ans, en traitement allergique,
- chez l'adulte pour soulager les symptômes liés à la rhinite dans les fosses nasales.

POSOLOGIE :

Rhinite allergique :

- Adulte et enfant de plus de 12 ans: la dose habituellement efficace est de 2 pulvérisations dans chaque narine 1 fois par jour le matin. Lorsque les symptômes sont améliorés, la dose peut être diminuée à 1 pulvérisation dans chaque narine par jour.

- Enfant entre 3 et 11 ans: la dose habituellement efficace est de 1 pulvérisation dans chaque narine une fois par jour le matin.

La mise en route et la durée du traitement en sont fonction de l'exposition allergique.

Polypose nasosinusienne
La dose habituellement efficace est de 2 fois par jour. Lorsque les symptômes sont améliorés, la dose peut être diminuée à 1 pulvérisation dans chaque narine par jour.

En cas de persistance des symptômes
Veuillez consulter votre médecin.

DANS TOUS LES CAS, SE CONSULTER UN MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voir nasale,

- Agiter légèrement le flacon
- Lors du premier usage, la pulvérisation peut être un peu inutile, celle-ci reste amortie et doit être réamorcée par un mouvement de rotation.

DANS TOUS LES CAS, SE CONSULTER UN MEDECIN.

Durée du traitement :

Se conformer à l'ordonnance.

Fréquence d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament comme prescrit par votre médecin ou pharmacien et dans les délais indiqués dans l'ordonnance.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais RISONEL® nasal dans les cas suivants :

- allergie à l'un des composants
- saignements du nez,
- en cas d'herpès du nez, de la bouche ou des yeux.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

Il est également contre-indiqué pour les personnes qui ont eu une réaction allergique à ce médicament.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde

En cas de surinfection (mouche, narine, etc.), il est recommandé de prendre des mesures pour empêcher la propagation de l'infection.

N° du Lot

23-H 2024

Date Per.

07.2026

P.P.V: 119,10 DH



6 118001 040674

Il est recommandé de prendre des mesures pour empêcher la propagation de l'infection.

Il est recommandé de prendre des mesures pour empêcher la propagation de l'infection.

Il est recommandé de prendre des mesures pour empêcher la propagation de l'infection.

Il est recommandé de prendre des mesures pour empêcher la propagation de l'infection.

Il est recommandé de prendre des mesures pour empêcher la propagation de l'infection.



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Si les symptômes persistent, plus de 7 jours, demandez l'avis de votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

1-Qu'est-ce que Otrivine et quand est-il utilisé ?
Otrivine 0.1% Nébuliseur est indiqué dans le traitement de la congestion nasale, de la rhinite périenne et allergique (y compris rhume des foins) et de la sinusite.

Otrivine Adulte contient du chlorhydrate de xyloémétazoline qui aide à décongestionner et à nettoyer les conduits nasaux en réduisant les sécrétions nasales excessives ainsi les vaisseaux sanguins gonflés reviennent à leur taille normale.

2- Quand Otrivine ne doit-il pas être utilisé ?

Ce médicament est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 15 ans et en cas notamment :

- D'allergie à la xyloémétazoline ou aux autres composants du produit.
- D'allergie à un autre décongestionnant.
- D'hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée.
- D'antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de facteurs de risque susceptibles de favoriser la survenue d'AVC, en raison de l'activité sympathomimétique alpha du vasoconstricteur.
- D'insuffisance coronarienne sévère.
- D'antécédents de convulsions.
- D'intervention chirurgicale récente au niveau de la tête.

3-Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Otrivine ?

Veuillez consulter votre médecin en cas :
D'hyperactivité de la thyroïde ou de diabète (Diabète mellitus), de glaucome à angle étroit, hypertension, maladies cardiovasculaires, grossesse ou allaitement.

Sans avis médical, Otrivine ne doit pas être utilisé plus de 5 jours.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 15 ans. Ce médicament ne doit pas être utilisé sans ordonnance médicale.

4- Interactions avec d'autres médicaments

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments (spécialement : les IMAO ou d'autres antidépresseurs), incluant ceux utilisés sans prescription.

Il est inutile et potentiellement dangereux d'associer entre deux médicaments contenant un vasoconstricteur seul ou associé à une ou plusieurs substances actives (même administrés par des voies différentes).

5-Otrivine peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Avant d'utiliser Otrivine pendant la grossesse ou l'allaitement, veuillez consulter votre médecin.

6-Comment utiliser Otrivine ?

Sauf prescription contraire du médecin, vous devez vous tenir aux recommandations posologiques suivantes pour **Adultes et enfants plus de 15 ans** :

Une nébulisation dans chaque narine, 2 à 3 applications par jour.

La posologie maximale journalière ne doit pas être dépassée.

La durée maximale de traitement ne doit pas excéder 5 jours.

Mode d'emploi du nébuliseur :

1.nettoyez votre nez.

2. Inclinez votre tête légèrement vers l'avant et insérez l'embout dans une narine.

3. Exercez une pression sur le nébuliseur une fois et inspirez en même temps.

4. Retirez l'embout avant de libérer la pression sur le nébuliseur.

5. Répétez l'opération pour l'autre narine.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien. Chaque flacon doit être utilisé par une seule personne pour prévenir toute infection.

Ne pas utiliser le flacon après 28 jours de son ouverture.

Ne pas dépasser les doses recommandées.

En cas de surdosage veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

7-Quels effets secondaires Otrivine peut-il provoquer ?

Comme tous les médicaments, Otrivine Adulte nébuliseur peut causer des effets secondaires, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Une gêne locale peut être ressentie après l'application d'Otrivine si vous avez des conduits nasaux sensibles.

L'utilisation d'Otrivine peut provoquer les effets secondaires suivants : occasionnellement sensation de brûlure dans le nez et la gorge, irritation locale, nausées, maux de tête et sécheresse de la muqueuse nasale, des troubles visuels transitoires et des réactions.

Certains effets cardiovasculaires comme des palpitations peuvent apparaître spécialement en cas de problèmes cardiaques.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8-A quoi faut-il encore faire attention ?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient.

Conserver à 30 °C.

Les médicaments doivent être tenus hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent de plus amples informations destinées aux professionnels.

LOT M0839

EXP 08 2026

PPV 18.10 DH

Otrivine® 1%
Nébuliseur
Solution 10 ml



6 118000 220138

nasale

rate de
iosphate

et du
onserva

é révisée

de Rabat

ned Al

00 41

gsk

