

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

201730

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]
Matricule : 11596

Société : Royal air maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Taouil KHALID

Date de naissance :

05/07/1973

Adresse :


27 allée des longeavilliers ESSAFAZ

Tél. : 06 61 33 1486

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 23/02/2014

Nom et prénom du malade : Mou.N.J.S FATHIA ZAHNA Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection chronique

H

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : Couff

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement de Actes
23/02/2024	CS		150,00	D.B. DENTAL Clinic Bd Ha Ahmed Maouar Al Al-Sabah 2 Medecin: Dr. B. DENTAL Clinic Bd Ha Ahmed Maouar Al Al-Sabah 2

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur		EXECUTION DE LA PRESCRIPTION
		MONTANT DE LA FACTURE
		113,73
		23/2/24

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Montant des Honoraires	COEFFICIENT DES TRAVAUX

Docteur Fadoua BELACHMI
MÉDECINE GÉNÉRALE



الدكتورة فدوی بلہشمي

الطب العام

- حاصلة على دبلوم في داء السكري

من كلية الطب - الرباط

- رخص السياقة

- Diu en Diabétologie

de la FMPR

- Permis de Conduire



05 22 75 73 74

الدار البيضاء في : 23 FEV. 2024
Houssain ZAHRA

803/02

- Alyera

qd

3x4x10 (capsule)

20 - 8g

1x2x10 (syringe)

fees fef fef

fort fort fort

gel 2x10 (syringe)

gel 2x10 (syringe)

100, 200, 500, 1000

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

13, 25, 50, 100

lues vous devez prendre et pendant
dre. Cela dépendra de votre état de
uation.

stro-cesophagien tels que brûlures et
ophage a été légèrement endommagé,
fois par jour pendant 4-8 semaines.
rendre une dose de 40 mg pendant 8
ophage n'a pas encore cicatrisé.

age a été guéri est de 10 mg une fois
agé, la dose usuelle est de 10 mg une

ie haute de votre intestin (ulcère
ne fois par jour pendant 2 semaines.
e prendre la même dose pendant 2
e n'a pas été cicatrisé.
catisé, la dose peut être augmentée à
jour pendant 4 semaines.

cère gastrique :
ne fois par jour pendant 4 semaines.
e prendre la même dose pendant 4
e n'a pas été cicatrisé.
catisé, la dose peut être augmentée à 40
pendant 8 semaines.

rique ou duodénal :
20 mg une fois par jour. Votre médecin
es de 20 mg) une fois par jour.
odénal provoqué par des AINS (anti-

ne fois par jour pendant 4-8 semaines.
duodénum si vous prenez des AINS :
par jour.

ne infection par Helicobacter pilori et
'AULCER® deux fois par jour pendant

même temps deux antibiotiques parmi
aztreonam, ciprofloxacine, amoxicilline et
omac dû à une grosseur au niveau du

gélules de 20 mg) par jour.
fonction de vos besoins et il décidera
vous prendrez le médicament.

stro-cesophagien tels que brûlures et

esant plus de 10 kg peuvent prendre
oids de l'enfant et le médecin décidera
s provoqués par une infection par

uent prendre AULCER®. La posologie
docteur décidera de la dose correcte à

et deux antibiotiques en même temps :

les le matin.
rs d'un repas ou à jeun.
c un demi-verre d'eau. Les gélules ne

doivent pas être mâchées ni croquées car elles contiennent des granulés pelliculés ce qui empêche le médicament d'être détruit par l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas détériorer les granulés.

Que faire si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler les gélules ?

Si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler vos gélules :

- Ouvrir la gélule et avaler le contenu directement avec un demi-verre d'eau ou mettre le contenu dans un verre d'eau non gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus de pomme, orange, ou ananas) ou dans de la compote de pomme.
- Toujours remuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.
- Pour s'assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne pas les mâcher ni les croquer.

6. CONTRE INDICATIONS :

Ne prenez jamais AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'omeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanzoprazole, rabéprazole, ésoméprazole).
- Si vous prenez un médicament contenant du nefinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH).

Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AULCER®.

7. LES EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, AULCER® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre AULCER® et contactez immédiatement un médecin :

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).
- Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique.
- Couleur jaune de la peau, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Ces effets indésirables peuvent se produire avec des fréquences qui sont définies comme suit :

Très fréquents :	Peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10
Fréquents :	Peut affecter de 1 à 10 personnes sur 100
Peu fréquents :	Peut affecter de 1 à 10 personnes sur 1.000
Rares :	Peut affecter de 1 à 10 personnes sur 10.000
Très rares :	Peut affecter moins de 1 personne sur 10.000
Inconnus :	ne peut être estimée sur la base des données disponibles

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents :

- Maux de tête.
- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.
- Nausées, vomissements.
- **Polypes bénins dans l'estomac.**

Effets indésirables peu fréquents :

- Gonflement des pieds et des chevilles.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Etourdissements, fourmillements, somnolence.
- Vertiges.
- Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.
- Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

1. DENOMINATION :

AULCER 20 mg, gélules gastro-résistantes

Boîte de 14 et 28 gélules gastro-résistantes

DCI : oméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

2. COMPOSITION D'AULCER 20 mg gélules gastro-résistantes :

• Composition en substance active :

AULCER 20 mg : chaque gélule contient 20 mg d'oméprazole.

Composition en excipient :

Les excipients sont : saccharose/ amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, phosphate disodique, mannitol, hydroxypropyl méthylcellulose (hypromellose), polyéthyléneglycol 6000 (Macrogol), talc, polysorbate 80, dioxyde de titane (CI=77891, E-171), eudragit L30D55 (copolymères) Acrili.

Liste des excipients à effet notable :

Saccharose, polyéthyléneglycol (Macrogol) et mannitol.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITE

Oméprazole appartient à la classe des médicaments appelée « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). AULCER® peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées de la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents.

Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

5. POSOLOGIE :

Voie d'administration : voie orale.

Veillez à toujours prendre AULCER® en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez les prendre et de votre santé et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en continu.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux et régurgitation acide :

- Si votre médecin constate que votre ulcère n'a pas été complètement guéri, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.
- Votre médecin peut vous demander de prendre 20 mg deux fois par jour.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de l'estomac (ulcère duodénal) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.
- Votre médecin peut vous demander de prendre 20 mg deux fois par jour.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.
- Votre médecin peut vous demander de prendre 20 mg deux fois par jour.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique :

- La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour.
- Vous pouvez augmenter la dose à 40 mg (2 gélules) une fois par jour.

Traitement de l'ulcère gastrique et de l'ulcère pancréatique (ulcère non stéroïdiens) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.
- Votre médecin peut vous prescrire de l'amoxicilline, la clarithromycine et le misoprostol.

Traitement des ulcères provoqués par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.
- Votre médecin va vous prescrire de l'amoxicilline, la clarithromycine et le misoprostol.

Prévention des récidives :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par semaine.

Traitement des ulcères de l'estomac et de l'œsophage :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères pancréatiques (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour.
- Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de la sévérité et de la durée pendant laquelle l'ulcère persiste.

Utilisation chez l'enfant :

Traitement des symptômes du reflux et régurgitations acides :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et de moins de 12 ans peuvent prendre AULCER®.

La dose recommandée dépendra du poids de l'enfant et de la gravité de l'ulcère.

**LOT : 22271
PER : 06/2025
PPU : 102,00 DH**

plus de 4 ans pour l'enfant et le moins de 12 ans.

Il faut prendre AULCER® tous les jours.

gèlules vous devez prendre et pendant
ndre. Cela dépendra de votre état de
nuation.

Gastro-œsophagien tels que brûlures et

œsophage a été légèrement endommagé,
e fois par jour pendant 4-8 semaines.
prendre une dose de 40 mg pendant 8
phage n'a pas encore cictré.

phage a été guéri est de 10 mg une fois

cictré, la dose usuelle est de 10 mg une

de haute de votre intestin (ulcère

une fois par jour pendant 2 semaines.
e prendre la même dose pendant 2
re n'a pas été cictré.

cictré, la dose peut être augmentée à
jour pendant 4 semaines.

ulcère gastrique :

une fois par jour pendant 4 semaines.
e prendre la même dose pendant 4
re n'a pas été cictré.

cictré, la dose peut être augmentée à 40
ur pendant 8 semaines.

trique ou duodénal :

20 mg une fois par jour. Votre médecin
les de 20 mg) une fois par jour.

duodénal provoqué par des AINS (anti

ne fois par jour pendant 4-8 semaines.
du duodénum si vous prenez des AINS :
par jour.

une infection par Helicobacter pilori et

d'AULCER® deux fois par jour pendant

même temps deux antibiotiques parmi
étronidazole.

estomac dû à une grosseur au niveau du

3 gélules de 20 mg) par jour.
fonction de vos besoins et il décidera
vous prendrez le médicament.

Gastro-œsophagien tels que brûlures et

esant plus de 10 kg peuvent prendre
oids de l'enfant et le médecin décidera

s provoqués par une infection par

uent prendre AULCER®. La posologie
édecin décidera de la dose correcte à

t deux antibiotiques en même temps :

les le matin.
rs d'un repas ou à jeun.
ec un demi-verre d'eau. Les gélules ne

doivent pas être mâchées ni croquées car elles contiennent des granulés pelliculés ce qui empêche le médicament d'être détruit par l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas détériorer les granulés.

Que faire si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler les gélules ?

Si vous ou votre enfant avez des difficultés à avaler vos gélules :

- Ouvrir la gélule et avaler le contenu directement avec un demi-verre d'eau ou mettre le contenu dans un verre d'eau non gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus de pomme, orange, ou ananas) ou dans de la compote de pomme.
- Toujours remuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.
- Pour s'assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne pas les mâcher ni les croquer.

6. CONTRE INDICATIONS :

Ne prenez jamais AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'omeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanzoprazole, rabéprazole, ésoméprazole).
- Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH).

Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AULCER®.

7. LES EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, AULCER® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre AULCER® et contactez immédiatement un médecin :

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).
- Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique.
- Couleur jaune de la peau, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Ces effets indésirables peuvent se produire avec des fréquences qui sont définies comme suit :

Très fréquents :	Peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10
Fréquents :	Peut affecter de 1 à 10 personnes sur 100
Peu fréquents :	Peut affecter de 1 à 10 personnes sur 1.000
Rares :	Peut affecter de 1 à 10 personnes sur 10.000
Très rares :	Peut affecter moins de 1 personne sur 10.000
Inconnus :	ne peut être estimée sur la base des données disponibles

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents :

- Maux de tête.
- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.
- Nausées, vomissements.
- Polypes bénins dans l'estomac.

Effets indésirables peu fréquents :

- Gonflement des pieds et des chevilles.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Etourdissements, fourmillements, somnolence.
- Vertiges.
- Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.
- Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.



GTIN 05016007207996
 LOT 233120A
 MFG 03 2023
 EXP 02 2026
 SN 491718561988

- Qu'est ce que c'est ?
- Bacilac forte Intelicaps®
- qui contient :
- des Bifidobactéries
- Chaque gélule contient 1 milliard de bactéries Bifidobactéries.
- Au sein de chaque gélule : 60% de cellulose microcristalline et 40% d'eau.

PYLERA® gélules

Boîte de 1 flacon de 120.
 AMM N°281 DMP / 21 / NNP
 PPV : 803,00 DH

Titulaire de l'AMM / Distributeur :
 SOTHEMA, B.P.N° 127182 Boussoura, MAROC



6 118001 072262

CERTIFICAT N° DA20181805430DMP/20UCA/v1

A consommer de préférence avant :

Lot :

0 3 2 0 2 5
 S G 2 3 0 0 ?



5420044312627

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BACILAC forte Intelicaps®?

- Bacilac forte Intelicaps® est sûr et aucun effet secondaire n'est connu à ce jour.
- Il n'existe pas de contre-indication à la prise de Bacilac forte Intelicaps®.
- Cependant les personnes souffrant de troubles importants de l'immunité doivent être suivies par leur médecin.
- Ne pas utiliser Bacilac forte Intelicaps® en cas d'allergie ou d'hypersensibilité à un ou plusieurs excipients du produit.

Comment prendre BACILAC forte Intelicaps®?

- Bacilac forte Intelicaps® peut être utilisé par les enfants à partir de l'âge de 6 ans et les adultes.
- La dose recommandée est de 1 à 2 gélules par jour.
- Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

Comment conserver BACILAC forte Intelicaps®?

- Bacilac forte Intelicaps® peut être conservé à température ambiante, dans un endroit sec.
- La date d'expiration est mentionnée sur la face externe de l'emballage et fait référence au produit non ouvert et correctement conservé.

porte Intelicaps®

limentaire, ce n'est pas un médicament

Quelle est la composition de BACILAC forte Intelicaps®?

- Les gélules de Bacilac forte Intelicaps® sont d'origine 100% végétale.
- Composants actifs : au moins 1 milliard de bactéries lyophilisées
 - Lactobacillus rhamnosus GG
 - Bifidobacterium lactis
- dextrième, Cellulose microcristalline, Hypromellose, résium, Dioxyde de silicium, um (E171).

porter BACILAC forte Intelicaps® ?
 Intelicaps® est disponible en pharmacie.
 demander conseil à votre médecin ou

Distribué par :



bottu SA
 82, Allée des Casuarinas - Ain Sébila - Casablanca

VÉSALÉ PHARMA
 Microbiotic Solutions