

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 812

Société : RAR 203501

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Sifame Zalikha

Date de naissance : 19.11.19

Adresse : 25, rue l'orange S' 1 min 439/11

N°7 H.7

Tél. : 06.62.24.61.15

Total des frais engagés : 3768,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 17 Avril 2024

Nom et prénom du malade : BASSORI

FATIMA

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Amblyopie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 17/04/2024

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	AA/04/20	18,-

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000

(Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

OPTIC MERS SULTAN

1, Haj Omar Riffi - Quartier Mers Sulten
- Casablanca - Tél.: 0522.44.93.91

IF: 4190706 R.C: 327722 - Patente: 34307006
ICE 000835172000043

FACTURE N 6008

INPE:095004651

Casale: 25/04/2024

Mr: BASSORI FATIMA doit

Nature des verres	Vision de Loin	Vision de Prés	Double Fovers	Progressif
	OD: OG:	OD: OG:	OD: OG:	OD: OG:
Monture ✓	Métal ✓	Plastique		
VL: OD: Plan (-0,50 à 90°) OG: Plan (-0,75 à 60°)				900,00 900,00
Tout en métalique. Prada.				1700,00
OD: VP: OG: TOTAL: Add: 100,00				
				3500,00

Arrêtée la présente Facture à la Somme de :

1, Haj Omar Kiffi Quartier
Mers El Kébir - Casablanca
Tél: 06 68 05 98 72

OPTIQUE MERS SULTAN

Opticien Optométriste

1. Haj Omar Rifi Quartier
Mers Sultan - Casablanca
66 66 66 98 / 6

Docteur Khalid BANINE

Ophtamologiste



- Chirurgie de la cataracte (phaco)

- Strabisme - Glaucome - Voies Lacrymales

- Angio laser - Correction optique (LASIK)

الدكتور خالد بنين

إختصاصي في طب وجراحة العيون

- جراحة الجلالة - المحول - مسالك الدموع

- داء الزرق - تصوير أوعية الشبكة - الليزر

- تصحيح البصر لابنك

Casablanca, le : 17 AVR 2024

الدار البيضاء . في :

BASSORI

Fatima

lunette n° 3 de l'm

OD = (-0150 30°)

OL = (-0175 60°)

187 Bassorl Cnetel lne 181x35

Dr Khalid BANINE
OPHTALMOLOGISTE

Angle Bd Ibn Tachafine et Ibn Al Adrâa
El Mourakuchi Rés Fatima Zahra
3ème étage N° 6 Casablanca

OPTIQUE MERS SULTAN
Opticien Optométriste
1, Haj Omer Jiffi Quartier
Mers Sultan - Casablanca
Tél: 06 68 85 98 72

Angle Bd Ibn Tachafine et Ibn Al Adrâa El Mourakuchi
Résidence Fatima Zahra II 3ème étage - N°6 Casablanca
(au dessus de Marjane Market et Bank of Africa)

Tél. : 0522 61 22 22

E-mail : kbanine@gmail.com

زاوية شارع ابن تاشفين و شارع ابن العذراء المراكشي
إقامة فاطمة الزهراء II. الطابق 3 رقم 6 - الدار البيضاء
(فوق مرجان ماركت و بنك أفريقيا)

الهاتف : 0522 61 22 22

الاستعمال لدى الأطفال
البيانات المنشورة حالياً لا تسمح بتوصية جرعة ومدة للعلاج بالنسبة
للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
كيفية وطريقة الاستعمال:
للاستعمال الموضعي.
لتقطير داخل العين.
ابريلع لا يحقن.

اعملوا أيديكم جيداً قبل التقطير.
لتحبوا لمس العين أو الجفون بطرف القطرة.
لتقطير المحلول في العين، انظروا إلى أعلى واسحبوا الجفن السفلي
للسkin إلى أسفل قليلاً. اغلقوا عينكم وقوموا بمحف فانس المحلول
منديل قظيف.
اغلقوا القارورة بعد الاستعمال.

وثيقة الاستعمال
بعد 15 يوماً الأولى من العلاج، استمروا في التقطير بمعدل مرة كل
4800 يومين.

إذا قررت استعمال مقدار أكبر من اللازم من كركطول 0,1 في الملة،
قطرات للعين:
استمروا طبيكم أو الصيدلاني على الفور.
من غير المتوقع حدوث أي آثار ضارة.

في حال تقطير جرعة زائدة، يجب غسل العين بمحلول ملحي معقم.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
مثل جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء أعراض جانبية إلا أنها لا
تصيب كل من يستعمل هذا الدواء.

قد تظهر الأعراض الجانبية التالية على العين:
لم في العينين.
أهيج العين (لا يمكن تقدير وقعة حدوث هذا العرض بناء على
البيانات المنشورة).

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية
إذا لاحظتم ظهور أيّة أعراض جانبية، يرجى إعلام طبيكم أو الصيدلاني
أو الممرض/ة. ويشمل هذا أيّة أعراض جانبية محتملة غير مدرجة في
هذه النشرة. من خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية، يمكنكم المساعدة
في تطوير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيف تقام بحفظ كركطول 0,1 في الملة، قطارات للعين؟
يحفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.
لا يجوز استعمال هذا الدواء بعد انفاسه، تاريخ الصلاحية يشير إلى آخر يوم في الشهر المذكور.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
يجب استخدام أي قارورة مفتوحة خلال 15 يوماً.

فقطوا متناولون تاريه انتهاء الصلاحية على ملصق الفارورة = تاريخ
الفتح + 15 يوماً بعد عيادة «المستعمال إلى غاية (اليوم ، الشهر)».
يجب عدم إقفال الأدوية في مصاري المرف الصناعي وفي المخلفات المنزلية.
اطلبوا من صيدلانيكم التخلص من الأدوية التي لم تعودوا مستعملونها.
من شأن هذه التدابير أن تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية
على ماذا يحتوي كركطول 0,1 في الملة، قطارات للعين؟

المادة الفعالة هي: إينوزين فوسفات ثانوي الصوديوم ثانوي المالي: 0,1
غرام لكل 100 مل من قطرات العين.
المكونات الأخرى هي: غلوكونات الكالورهكسيدين، كلورور الموديوم،
ماء مصافي.

ماهو كركطول 0,1 في الملة، قطارات للعين و محتوى العلبة الخارجية؟

يأتي هذا الدواء على شكل قطرات للعين - قبة قطرة من سعة 10 مل.

صاحب رخصة التسويق / المصنع:
مختبرات سوتهمما.
عن. ب رقم 1، 27182 بوسكورة - المطربي.

شروط الوصف والتسليم: دواء يصرف بدون وصفة طبية.

تمت مراجعة هذه النشرة لأخر مرة بتاريخ: شتنبر 2019.

نشرة العبوة: معلومات المستخدم
كركتول 0,1 في الملة، قطرات للعين
إينوزين فوسفات ثانوي الصوديوم ثانوي المالي
قارورة من سعة 10 مل

تحتوي هذه النشرة على معلومات هامة من أجلكم، يرجى قراءة
كلة المعلومات الواردة فيها بعناية قبل البدء في استعمال هذا
الدواء.

عند استعمال هذا الدواء ارجواهوا دائمًا على أن تتبعوا دقة التعبيات
الواردة في هذه النشرة أو المعلنة في قبل طبيكم أو الصيدلاني.

* احتفظوا بهذه النشرة، فقد تحتاجون لارجاعها مرة أخرى.
* يرجى استشارة الصيدلاني، من أجل الحصول على أي توجيه أو
معلومات.

* إذا كنت تعانون من أي أعراض جانبية فتحذوا إلى طبيكم أو
الصيدلاني، وشمل هذا أي أعراض جانبية غير مدرجة في هذه النشرة.
وأعراض القرحة.

* يرجى التوجيه إلى طبيكم إذا لم تلاحظوا تحسناً أو إذا أحستم
يذهبوا في حالكم الصحية.
يحفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

على ماذا تحتوي هذه النشرة
1. ما هو كركطول 0,1 في الملة، قطرات للعين وما هي دواعي
استعماله؟

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال كركطول 0,1 في
الملة، قطرات للعين؟

3. ما هي كيفية استعمال كركطول 0,1 في الملة، قطرات للعين؟

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟

5. كيف تقام بحفظ كركطول 0,1 في الملة، قطرات للعين؟

6. معلومات إضافية.

أدوية العيون الأخرى - رمز ATC : S01XA10 : علاج مساعد لاضطرابات الرؤية بالعينين، مكمّل لإعادة تأهيل وظيفة العينين.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال كركطول 0,1 في
الملة، قطرات للعين؟

لا استعملوا أبداً كركطول 0,1 في الملة، قطرات للعين:
إذا كنت تعانون من الحساسية (فرط الحساسية) لإينوزين فوسفات

ثانوي الصوديوم، ثانوي المالي أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء
المذكورة في المقدمة.

تعديلات خاصة واحتياطات الاستعمال
راجعوا طبيكم أو الصيدلاني قبل استعمال كركطول 0,1 في الملة، قطرات
للحال.

تعديلات خاصة
هذا الدواء مخصوص للبالغين فقط، لا يحقن، لا يربع.
إذا اشتبأ حد الأعراض، يجب إعادة تقييم نظام المعالجة.

احتياطات الاستعمال
في حالة العلاج المصاحب مع قطرات للعين أخرى، يجب ترك فاصل زمني
قدره 5 دقائق بين القطارات.

إذا كنت غير والقين يجب عليكم الاستيقاظ من طبيكم أو الصيدلاني.
إذا كنت غير والقين يجب عليكم الاستيقاظ من طبيكم أو الصيدلاني.

الدواء الأخرى و كركطول 0,1 في الملة، قطرات للعين
يمكن أن تأثر فعالية قطرات العين بالتنفس المترافق ل قطرات عينية
أخرى.

في هذه الحالة، انتظروا 5 دقائق قبل الشروع بتنفس الدواء الثاني.

يرجى إبلاغ طبيكم أو الصيدلاني إذا كنت تستعملون أو إذا استعملتم
مثواً أو قد استعملون أي دوارة أخرى.

العمل، الرضاخ والخصوصية
إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعقدن بذلك حامل أو تحفظين بذلك،
استشيري طبيكم أو الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.

يمكن استعمال هذا الدواء أثناء الحمل والإرضاع.

قيادة لمركبات واستعمال الألات
كما هو الحال مع جميع قطرات العين، فإن تقطير كركطول 0,1 في الملة،

قطرات للعين يمكن أن يسبب اضطرابات بصرية مؤقتة.
لذلك يجب عدم قيادة لمركبات أو استعمال الألات حتى رجوع الرؤية
الواضحة.

3. ما هي كيفية استعمال كركطول 0,1 في الملة، قطرات للعين؟

يجب دائمًا استعمال هذا الدواء قاماً كما هو موضح في هذه النشرة
ووفقاً لإجراءات طبيكم المعالج أو الصيدلاني. إذا كنت غير والقين
يجب عليكم الاستيقاظ من طبيكم أو الصيدلاني.

الجرعة الموصى بها:
جرعة ملوكى، مدة 15 يوم، ثم مرة كل يومين.

LOT 240614

EXP 01/2027

18/40

PPV 18/70

Notice : Informations de l'utilisateur
CORRECTOL® 0,1 POUR CENT, collyre
Inosine phosphate disodique dihydraté

Fiacon de 10 ml

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre et dans quelles cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?
3. Comment utiliser CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES MEDICAMENTS OPHTHALMOLOGIQUES - code ATC : S01XA10

Traitements d'appoint des troubles de la vision binoculaire en complément de la rééducation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

N'utilisez jamais CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre :

• si vous êtes allergique (hypersensible) à l'inosine phosphate disodique dihydraté ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre.

Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'adulte.

Ne pas injecter, ne pas avaler.

En cas d'aggravation des symptômes, la conduite à tenir doit être réévaluée.

Précautions d'emploi

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 5 minutes les instillations.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Autres médicaments et CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre

L'efficacité d'un collyre peut être affectée par l'instillation simultanée d'un autre collyre. Dans ce cas, il convient d'attendre 5 minutes avant de pratiquer la deuxième instillation. Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Comme avec tout collyre, l'instillation de CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre peut provoquer des troubles visuels transitoires.

Ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas de machines avant que cet effet ait disparu.

3. COMMENT UTILISER CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

Veuillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les

indications de votre médecin

àuprès de votre médecin ou pharmacien.

Posologie

La dose recommandée est de :
2 gouttes de collyre par jour, pendant

jour sur deux.

Utilisation chez les enfants

Les données actuellement disponibles ne permettent pas de recommander une posologie et une durée de traitement chez les patients âgés de moins de 18 ans.

Mode et voie d'administration

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Ne pas avaler, ne pas injecter.

Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

Éviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout compte-gouttes.

Instiller la solution dans l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas. L'œil fermé, essuyer proprement l'excédent.

Refermer le flacon après utilisation.

Fréquence d'administration

Après les 15 premiers jours de traitement, poursuivre les instillations oculaires au rythme d'un jour sur deux.

Si vous avez utilisé plus de CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Aucun effet toxique n'est à prévoir.

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent se manifester dans votre œil :

- douleur oculaire,
- irritation oculaire (les fréquences ne peuvent être estimées sur la base des données disponibles).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours. Notez sur l'étiquette du flacon la date limite d'utilisation = date d'ouverture + 15 jours après la mention « A utiliser jusqu'à (jour, mois) ».

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Quo contient CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

La substance active est : inosine phosphate disodique dihydraté : 0,1 g pour 100 ml de collyre.

Les autres composants sont : gluconate de chlorhexidine, chlorure de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un collyre - flacon compte-gouttes de 10 ml.

Titulaire de l'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA

B.P. N° 1, 27182 Bouskoura

Maroc.

سوطاما
Sotema

Conditions de prescription et de délivrance :

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Septembre 2019.