

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-003160

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1962 Société : 903777

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Derri Oumaima

Date de naissance : 24/09/2002

Adresse : 55 cité salim Benyoub

Tél. : 0675123995 Total des frais engagés : 250 dh + 166,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

*Dr. Mohamed ALAFIF
O.R.L.
61: 022-82.75.91-Casa*

Date de consultation : 26/6/2024

Nom et prénom du malade : DERSSI OUMAIMA Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Affection O.R.L

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____ Le : _____ / _____ / _____

Signature de l'adhérent(e) : (Signature)



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 26/6/2011 C3 | | | 250.000 | Dr. Mohamed ALAFIF O. R. L. 161-022-8275 91-VI |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|--|-------------------|-----------------------|
| <i>PHARMACIE N° 111 N'Djamena Rue El Houri - Tchad</i> | <i>26/04/2024</i> | <i>166,20</i> |

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|------|------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| | | | | COEFFICIENT DES TRAVAUX |
| | | | | MONTANTS DES SOINS |
| | | | | DEBUT D'EXECUTION |
| | | | | FIN D'EXECUTION |

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

| H | |
|----------|----------|
| 25533412 | 21433552 |
| 00000000 | 00000000 |
| D | |
| 00000000 | 00000000 |
| 35533411 | 11433553 |

(Création, remont, adionction)

Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET SACHETS DU PRATICIEL AFFICHABLE DANS LE DOCUMENT

L'ESTATE GARNIER DU BRATZEN AFFECTANT L'EVOLUTION

Dr Mohamed ALAFIF

Spécialiste des Maladies et Chirurgie

Nez - Gorge - Oreilles

Cou - Face

Exploration de L'audition

Endoscopie

Ancien Médecin à L'hôpital

20 Août de Casablanca

توقيت العمل
من العاشرة صباحا
إلى الثالثة زوالا

الدكتور محمد العفيف

اختصاصي في أمراض و جراحة

الأذن و الأنف و الحنجرة

جراحة الوجه و العنق

الفحص بالمنظار

اختبار السمع

طبيب سابق بمستشفى 20 غشت بالبيضاء

Casablanca, le 26 - 6 - 24

Num

DERSSI

OURMANI



49,60

1

Relax 15,5 ده

58,40

4

Mobie 15

59,10

3

Zyder 15

R

140 - 142 pd 8 J

142 8 J-

166,20 درهم

142 25

Dr. Mohamed ALAFIF
557 Bd. Mohamed VI
Ex Route Mediouna - 1er Etage - CASA
Tél: 022-82.78.91-Casa

إقامة السلام 557 شارع محمد السادس (طريق مدينة سابقا). الطابق الأول. الدار البيضاء

Résidence ESSALAMA 557, Bd. Mohamed VI (Ex Route Mediouna) - 1er Étage - CASA

الهاتف : 0522 82 75 91:

فراص ملوك
أو 5 أو 6 خطوط
ي من هرثون
ربت قوى
في نوع وده
يفتحي من العصبي
عند الصدر
مطردة مطردة
مثل ارتياح
عماشان
بله:
ديوثيك
حرائق
أمري
الرغوب
العنيل
هذا وانا
طريق
ذلك ت
على الـ
د فـ على
ليبيـ جـ عـ
سيـ سـ بـ
مؤثر علىـ
حيـانـاـ شـنـدـ
وابـانـهـ اـرـ
في مـعـدـلـ
لـمـسـسـ

- ١٠- مل إلى شفط (الذئبة المعدية) (صلات)
- ١١- التهور (انفاس)
- ١٢- في حين (عصوبي)
- ١٣- بسب انتفاخ
- ١٤- ملء اهل، راجعوا ط
- ١٥- راجعوا ط لغاية
- ١٦- اعراض وينتهي
- ١٧- سور، الواجد اب
- ١٨- دخول حذف
- ١٩- دخول دعوب
- ٢٠- دخول عباري
- ٢١- دخول نسب
- ٢٢- بدءاً او انته
- ٢٣- ستحدة
- ٢٤- دخول ثانية
- ٢٥- دخول ثانية
- ٢٦- دخول حالي
- ٢٧- دخول الحال
- ٢٨- دخول وذمة
- ٢٩- دخول الدواع
- ٣٠- إلى شخخت
- ٣١- مقال
- ٣٢- يصل إلى إيل
- ٣٣- في الجلد

من بين زيجات
الصياد لاثي.
سبب في ذلك
من قبله.
ضريرات العادات
العادية مع
الناس بعدد
الشيء.
ستنتهي
رغم غوب فيه
فإنه يجيء
اعل خمسين
بعد مدة
من بين كل
واحد من
00 من بين كل
من بين كا
عمر غير طبع
صورة واضحة
والخلق).

ك بروبرية مدة وبايكانه تدريسي

طبيب العا
لبة برايدا في شنط
الراحة، انت
سلب، رعاش

عن تناول طبيبك
أهلاً، رغم أنها

عليكم أهلاً
شيء شديد
أخشى، آخرة
أهلاً، 10 أشخاص

كل بين بين
شخص 10 مش

بن علي يوم وفاته
منه ثباعاً

البلاغ عن
العن العين
المولى.

بباشرة
تناول
ما في

علماء طيبين من خالل الدواء
زوجة يشفيكم النسا
طفرة من ماء حمض الماء
E216
E216
بابيل
بابيل الشفري
بابيل الماء
بروكسيبي
المرويبل 6



Relaxol® 500mg /2mg

Paracétamol/ thiocolchicoside

Comprimés

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE Relaxol et DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un relaxant musculaire. Il est utilisé chez les adultes et les adolescents de plus de 16 ans en tant que traitement d'appoint de contractures musculaires douloureuses. Il doit être utilisé pour des affections aiguës liées à la colonne vertébrale.

Ne pas prendre un autre médicament contenant du paracétamol.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Relaxol ?

Ne prenez jamais Relaxol :

- Si vous avez une hypersensibilité au thiocolchicoside et/ou au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous avez une maladie grave du foie.
- Si vous présentez une affection caractérisée par une perte de contrôle et du mouvement des muscles (paralysie flasque).
- Si vous souffrez d'une faiblesse musculaire (hypotonie musculaire).
- Si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte.
- Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception.
- Si vous allaitez.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. (voir « Posologie » et « Si vous avez pris plus de RELAXOL que vous n'auriez dû »).

Avertissements et précautions : Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre RELAXOL 500 mg/2 mg comprimé.

Si vous remarquez des symptômes pouvant indiquer une atteinte du foie pendant le traitement avec ce médicament (par exemple : perte d'appétit, nausée, vomissement, douleurs abdominales, fatigue, urine foncée, jaunisse, démagénaisons) vous devez arrêter de prendre/et utiliser RELAXOL 500 mg/2 mg, comprimé et demander immédiatement un avis médical si l'un des symptômes apparaît.

En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la dose.

Utilisez ce médicament avec précaution et prévenez votre médecin si vous souffrez de crises épileptiques ou présentez un risque de convulsions, car Relaxol pourrait aggraver ces troubles.

Respectez rigoureusement les doses et la durée du traitement décrites à la rubrique 3. Vous ne devez pas utiliser ce médicament à une dose plus élevée ou pour une durée dépassant 7 jours. Ceci est dû au fait que les produits formés dans votre organisme lorsque vous prenez du thiocolchicoside à des doses élevées peuvent provoquer des lésions sur certaines cellules (nombre anormal de chromosomes). Cela a été mis en évidence lors d'études chez l'animal et d'études

en laboratoire. Chez l'homme, ce type de lésions cellulaires est un facteur de risque de cancer, d'altération de la fertilité masculine et peut être dangereux pour un enfant à naître. Parlez-en à votre médecin si vous avez plus de questions. Votre médecin vous renseignera sur toutes les mesures relatives à une contraception efficace et sur les risques potentiels d'une grossesse.

Vous devez demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

- Si vous pesez moins de 50 kg.
- Si vous avez une maladie du foie ou maladie graves des reins.
- Si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment.
- Si vous souffrez de déshydratation.
- Si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue durée; si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).
- Si vous êtes allergique à l'aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.
- En cas de sevrage récent d'un alcoolisme chronique, le risque d'atteinte hépatique est majoré.
- En cas d'hépatite virale aigüe, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Analyses de sang : Prévenez votre médecin si vous prenez RELAXOL et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les résultats de votre taux d'acide urique (uricémie) et de sucre (glycémie) dans le sang.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants et adolescents : N'administrez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents âgés de moins de 16 ans.

Autres médicaments et RELAXOL 500 mg/2 mg, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Aucun trouble (interaction) n'a été observé lorsque ce médicament est associé à d'autres médicaments.

« Ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage ».

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou antivitamine K AVK), la prise de Paracetamol aux doses maximales (4g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont notamment l'INR. Dans ce cas, consultez votre médecin. L'efficacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des résines chélatrices - médicament qui diminue le taux de cholestérol dans le sang (respectez un intervalle de plus de 2 heure entre les 2 prises).

Si vous recevez, en même temps que du paracétamol, un traitement par flucloxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter une acidose métabolique (sang trop acide à l'origine d'une accélération de la fréquence respiratoire).

La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

- Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie.
- Des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments antiépileptiques (phénobarbital, phénopyntone, carbamazépine, topiramate).
- De la rifampicine (un antibiotique).

En même temps de l'alcool.

RELAXOL 500 mg/2 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l'alcool :

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ne prenez pas ce médicament :

- si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte.
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception.

Ce médicament peut mettre en danger votre enfant à naître.

Ne prenez pas ce médicament si vous allaitez car ce médicament passe dans le lait maternel.

Ce médicament peut entraîner des problèmes de fertilité masculine par altération potentielle des cellules spermatiques (nombre anormal de chromosomes); ceci a



été mis en évidence lors d'études en laboratoire (voir en rubrique 2 « Avertissements et précautions »).

Il est possible que le paracétamol puisse altérer la fertilité des femmes, de façon réversible à l'arrêt du traitement.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

Ce médicament peut provoquer de la somnolence. Vous devez donc éviter de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine lorsque vous prenez ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE Relaxol 500 mg/2mg comprimé ?

RESERVE À L'ADULTE DE PLUS DE 16 ANS

Prenez le médicament en suivant exactement les instructions

données ci-dessous auprès de votre médecin ou

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.I.

Ain sebaâ Casablanca

P.P.V: 49,80 DH

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 060833

6 118000 0608

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges, une somnolence et rarement des troubles de la vue.

Liste des excipients à effet notable :

Lactose

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des anticoagulants oraux, de l'héparine injectable, des antiagrégants plaquettaires, des antihypertenseurs, d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, de l'aspirine à fortes doses, du lithium, du méthotrexate à fortes doses, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

COMMENT PRENDRE MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable ?

Voie orale.

1 à 2 comprimés à 7,5 mg.
soit 7,5 à 15 mg par jour, selon l'indication.
1/2 à 1 comprimé à 15 mg
soit 7,5 à 15 mg par jour selon l'indication.

Dans tous les cas, se conformer à l'ordonnance de votre médecin, et ne jamais dépasser la dose de 15 mg par jour.

Les comprimés doivent être pris en une seule prise par jour, avec de l'eau ou une autre boisson, au cours d'un repas.

Si vous avez pris plus de MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tout médicament, MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- Peuvent survenir des réactions allergiques :

- cutanées : démangeaisons, éruption sur la peau, urticaire, forte réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV. De rares cas de réactions cutanées graves à type de décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre à tout le corps, ont été signalés.
- respiratoires : crise d'asthme,
- générales : brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke).

• Rarement, il est possible que survienne une hémorragie digestive parfois grave (cf. chapitre "prendre des précautions particulières"). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- Peuvent survenir également :

- des troubles digestifs de type digestion difficile, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrées, constipation, flatulences, inflammation de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac ou de l'intestin,
- des sensations ébrieuses, maux de tête, vertiges, bourdonnements d'oreille, somnolence, confusion, troubles de l'humeur, insomnie, cauchemars, troubles de la vue, œdèmes, augmentation de la pression artérielle, palpitations, rougeur brusque du visage,
- rarement, une anomalie de la formule sanguine pouvant se traduire par une fatigue intense, une infection, une fièvre, des saignements de nez ou des gencives.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

- De rares cas d'ulcère, de perforation gastro-intestinale, d'hépatites ont été observés ainsi que des anomalies du bilan sanguin, hépatique et rénal.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

COMMENT CONSERVER MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable ?

A conserver dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

Ne laisser ni à la portée, ni à la vue des enfants

Ne pas utiliser après la date de péremption

N'utilisez pas MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable si vous constatez des signes visibles de détérioration du produit.
Tableau A (Liste I)



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Notice

Mobic

Meloxicam

comprimé

Mobic

Meloxicam

comprimé

Composit:

La substance

meloxicam

Les autres com-

citra de sodium,

microcristalline, p-

crospovidone, sté-

Pour 1 comprimé.

QU'EST CE QUE !

15 mg comprimé

EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament, pris

ou comprimé sécable

non stéroïdien.

Il est indiqué chez l'adulte

(plus de 15 ans), en traitement :

- de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose
- de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires.

INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable

Ne pas utiliser Mobic 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable dans les cas suivants :

- grossesse ou allaitement,
- antécédents d'allergie (crise d'asthme, polyphénol nasaux, brusque gonflement du cou et du visage (œdème de Quincke), urticaire déclenché par ce médicament ou un médicament apparenté tels que d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine,
- antécédents d'allergie à l'un des constituants du produit,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien ayant récidivé ou en évolution,
- maladie grave du foie,
- maladie grave des reins non dialysée,
- maladie grave du cœur,
- saignement de toute nature.

Prendre des précautions particulières avec MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable :

Il n'existe pas de données d'efficacité et de sécurité chez l'enfant de moins de 15 ans.

AVANT LE TRAITEMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS :

- d'antécédents digestifs (œsophagite, gastrite, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
- d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle,

PPV: 57 DH 50

PER: 01/27

LOT: N302

Mobic® 15 mg

Meloxicam

14 comprimés sécables



6 118000 040569

ehringer
elheim

du cœur, du foie ou du rein,
int par diurétiques ou d'intervention
écente.

AS DU TRAITEMENT, ARRETER LE

ENT ET CONTACTER

EMENT UN MEDECIN OU UN

MEDICAL D'URGENCE en cas :

de gastro-intestinale
ang par la bouche, présence de sang
is ou coloration noire des selles).

d'hémorragies fatales sont rapportées

avec l'ensemble des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

- de signes évocateurs d'une allergie à ce médicament, en particulier crise d'asthme, brusque gonflement du visage et du cou, décollement de la peau (cf. effets indésirables éventuels).

Ce médicament existe sous d'autres dosages ou d'autres formes pharmaceutiques qui peuvent être plus adaptés.

Dans tous les cas, la dose maximale recommandée de 15 mg / jour ne doit jamais être dépassée.

Ce médicament contient
un anti-inflammatoire non stéroïdien :
le meloxicam.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

Grossesse - Allaitement

Grossesse

Il est recommandé d'éviter la prise de ce médicament au cours de la grossesse.

Votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament au cours des 6 premiers mois de votre grossesse.

Toutefois, EN AUCUN CAS, CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS A PARTIR DU 3^{ème} TRIMESTRE DE LA GROSSESSE, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela, même avec une seule prise.

Allaitement

Par mesure de précaution, il convient d'éviter d'utiliser ce médicament pendant l'allaitement.