

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **ditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **rmacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **ologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **ique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **éducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **ntaire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## **ladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## **Adresses Mails utiles**

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RC  
60812

Déclaration de Maladie

Nº P19- 0041634 /S164

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 5164 Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : SAMIH ABDELLAH

Date de naissance : 01-07-1961

Adresse : MÉMÉ ...  
Adresse

Tél. : 0661950331 Total des frais engagés : 870.52 DH Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 15/02/2021

Nom et prénom du malade : SAMIH ABDELLAH Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Afct digestifs

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA BLANCA

Signature de l'adhérent(e) : Samih

5 MARS 2021

ALDO 15/02/2021

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/02/2021	Ca		2 500 DH	

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	15/02/2021	222.50

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Chirurgie de l'oreille et de la tête Rue Benoît XVII 65300 Rodez</i>	15/02/21	F <sub>30</sub> C <sub>0</sub>	400 DT

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## **DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE**

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

(éation, remont, adjonction), Thérapeutique, nécessaire à la profession

D	00000000	00000000
	00000000	00000000
	35533411	11433553

The diagram illustrates the 16S rRNA secondary structure, featuring three major domains: the D domain (left), the H domain (top), and the B domain (right). The structure is composed of various RNA segments labeled with numbers 1 through 8, which represent different regions or hairpins within the rRNA molecule.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXERCICE

# Docteur Khaled Hallouly

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif  
Estomac - Intestins - Foie

CHIRURGIE ANALE

HEMORROIDES - FISTULE - FISSURE

Fibroscopie Digestive

Ancien Chef du Service de Gastro-Entérologie

# الدكتور خالد الحلولى

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

المعدة - الأمعاء - الكبد

أمراض وجراحة المخرج

ال بواسير والدمى

الكشف بالمنظار

رئيس سابق لقسم أمراض الجهاز الهضمي

Casablanca, le .....

15 FEV 2009

Mr Sami Alkhalid

190.00



Tunis 40/Jan/2009

190.00 جل العصب - جلundi

30.50



Argo

190.00 à l'offre  
du Drs Regis

Dr. Khaled HALLOULY  
Specialiste des Maladies  
de l'Appareil Digestif  
Chirurgie Anale  
7 Rue Bendahan - Bd. Mohammed V  
Tél. 05 27 861 / 05 27 861  
Fax: 05 27 861 / 05 27 861

PHARMACIE CHOFRANE  
Dr. Khaled HALLOULY  
Rue Bendahan  
Quartier Al Qadsia Sidi Demoussi  
Casablanca

PHARMACIE CHOFRANE  
Dr. Khaled HALLOULY  
Rue Bendahan  
Quartier Al Qadsia Sidi Demoussi  
Casablanca

# ARGO®

Alginate de sodium/Bicarbonate de sodium

## ARGO, suspension buvable en flacon

Alginate de sodium, bicarbonate de sodium

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant les informations fournies dans cette notice par votre médecin, ou votre pharmacien.

Si vous avez des questions, adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Ce médicament contient un colorant rouge cochenille A et peut provoquer des réactions allergiques.

### *Chez l'enfant et le nourrisson*

• Demander un avis médical avant l'utilisation simultanée avec des épaississants. Respecter le mode d'emploi de l'épaississant et les posologies indiquées pour chaque produit.

Consultez votre médecin en cas de modification significative du transit alimentaire de l'enfant, par exemple en cas de diarrhée ou de constipation.

Parallèlement à l'emploi de ce médicament, il est recommandé de suivre certaines règles hygiéno-diététiques :

- Epaissir l'alimentation,
- Eviter les bouillies chocolatées,
- Fractionner les repas,
- Eviter de trop serrer les couches,
- Eviter le tabagisme familial,
- Supprimer le jus d'orange et les boissons gazeuses.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

pharmacien.

### **Si vous oubliez de prendre ARGO suspension buvable en flacon**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **Si vous arrêtez de prendre ARGO suspension buvable en flacon**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets secondaires. Ces effets secondaires ne sont pas systématiques.

### *Chez l'adulte :*

Très rare (moins de 1% des cas). Des réactions allergiques peuvent se manifester par des symptômes cutanés, des démangeaisons, une

**LOT : 5842**

**UT-AV : 12-23**

**P.P.V : 30DH50**



Gélule  
Microgranules  
gastro-résistants  
Par voie orale

# Inéso

ésoméprazole

Deva  
Préparations

- Veillez lire attentivement l'avis.
- Garder cette notice, vous pourrez en avoir besoin.
- Suivez tous les autres conseils de ce médicament, il peut être nécessaire de le prendre à une autre heure.
- Ce médicament n'a pas été pensée pour la femme enceinte.
- Si des effets indésirables dérangent, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inéso contient une substance active : ésoméprazole. Il traite les maladies suivantes :

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Inéso 20 mg, gélule gastro-résistante

### Adultes

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

- L'ulcère de l'estomac ou duodénal en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Inéso peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

- L'ulcère de l'estomac ou duodénal en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Inéso 40 mg, gélule gastro-résistante est utilisé dans le traitement des maladies suivantes

### Adultes

- Le traitement de l'oesophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

### Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

## LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT

Sans objet.

## CONTRE-INDICATIONS

- Si vous êtes allergique à l'ésméprazole ou l'un des autres composants contenus dans ce médicament.  
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons, (par exemple : pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, oméprazole).

- Si vous prenez un médicament contenant du nefiravir.  
Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ; MISES EN GARDE SPÉCIALES

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant toute administration d'Inéso.

- Si vous avez des problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

- Si vous avez des problèmes rénaux, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

**Si vous prenez Inéso vous devez immédiatement contacter votre médecin si :** "vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler", "vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion", "vous vomissez de la nourriture ou du sang", "vous avez des selles noires teintées de sang". La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons (IPIP), tel qu'Inéso, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

## INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, ou si vous avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance.

Vous ne devez pas prendre Inéso si vous prenez le médicament suivant : nefiravir (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants : atazanavir, dapsone, kétocanazole, itraconazole, miconazole, erlotinib, citalopram, imipramine ou clomipramine, diazépam, phénytoïne, warfarine, clopidogrel, ibuprofène, digoxine, méthotrexate, tacrolimus, rifampicin, millepertuis.

## INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou à jeun.

## INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYTOTHERAPIE OU THÉRAPIES ALTERNATIVES :

Sans objet.

## UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre Inéso pendant cette période.

On ne sait pas si Inéso passe dans le lait maternel; en conséquence, vous demandez conseil à votre médecin ou pharmacien lorsque vous allaitez.

## SPORTIFS

Sans objet.

## EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VÉHICULES OU A UTILISER DES MACHINES

### Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Inéso n'est pas susceptible d'entraîner des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, des effets secondaires tels que des étourdissements et une vision trouble peuvent survenir peu fréquemment ou rarement. Si vous êtes affectés par l'un de ces effets, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

## LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose

## POSÉOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT

### Inéso 20 MG :

**Adultes âgés de 18 ans et plus :**

- Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides)

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète. La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour. Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour. Une fois le contrôle des symptômes obtenu, votre médecin peut vous recommander de prendre une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour, en fonction de vos besoins. Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

- En cas d'infection par la bactérie appelée Helicobacter pylori, traitement de l'ulcère du duodénium et prévention de la récidive de l'ulcère de l'estomac ou du duodénium.

La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour pendant une semaine. Votre médecin vous demandera également de prendre des antibiotiques, par exemple de l'amoxicilline et de la clarithromycine.

- Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens

La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

- Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens

La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

- Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû au syndrome de Zollinger-Ellison.

La dose recommandée est Inéso 40mg deux fois par jour. Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de traitement en fonction de vos besoins. La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

### Utilisation chez les adolescents (âgés de 12 ans et plus)

- Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides)

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète. La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

- En cas d'infection par la bactérie appelée Helicobacter pylori, traitement de l'ulcère du duodénium et prévention de la récidive de l'ulcère de l'estomac ou du duodénium.

La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour pendant une semaine. Votre médecin vous demandera également de prendre des antibiotiques par exemple de l'amoxicilline et de la clarithromycine.

### Inéso 40 MG

**Adultes âgés de 18 ans et plus :**

- Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides)

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète. Si vous avez une maladie hépatique grave, votre médecin peut vous donner une dose plus faible.

- Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû au syndrome de Zollinger-Ellison.

La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg deux fois par jour. Votre médecin vous indiquera la durée de traitement selon les besoins. La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

La dose recommandée est d'une gélule de 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

### Utilisation chez les adolescents (âgés de 12 ans et plus) :

- Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides)

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

## MODE D'ADMINISTRATION

- Vous pouvez prendre vos gélules à n'importe quel moment de la journée. Pendant ou en dehors des repas.

## ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 12 ANS

Inéso 20 mg et 40 mg, gélules gastro-résistantes n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

## SIJUETS AGES

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les sujets âgés.

# Docteur Khaled Hallouly

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif  
Estomac - Intestins - Foie

CHIRURGIE ANALE  
HEMORROIDES - FISTULE - FISSURE  
Fibroscopie Digestive

Ancien Chef du Service de Gastro-Entérologie

الدكتور خالد الحلواني

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

المعدة - الأمعاء - الكبد

أمراض وجراحة المخرج

البواسير والدمى

الكشف بالمنظار

رئيس سابق لقسم أمراض الجهاز الهضمي

Casablanca, le .....

02/02/2021

## ECHOGRAPHIE ABDOMINALE DE MR SAMIR ABDER JANE

\* Les différentes coupes réalisées montrent :

\* Un foie d'échostructure homogène et de volume normal.

\* La vésicule biliaire est échotransporeuse, sa paroi est fine.

\* La voie biliaire principale est de calibre normal.

\* Les deux reins, le pancréas et la rate sont échographiques dans le normal.

\* Pas d'édépanchement péritonéal.

\* Pas d'adénopathies profondes.

\* A compléter par Bilan biologique.



# Doctor Khaled Hallouly

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif

Estomac - Intestins - Foie

CHIRURGIE ANALE

HEMORROÏDES - FISTULE - FISSURE

Fibroscopie Digestive

Ancien Chef du Service de Gastro-Entérologie

الدكتور خالد الحلولي

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

المعدة - الأمعاء - الكبد

أمراض وجراحة المخرج

ال بواسير والدمى

الكشف بالمنظار

رئيس سابق لقسم أمراض الجهاز الهضمي

Casablanca, le .....  
15/02/2021

## NOTE D'HONORAIRES DE MR SAMIH ABDERRAHMANE

Echographie abdominale : K30 ..... 400,00 DH

Avec mes meilleures salutations.



