

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET, EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Reclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **1060** Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : **MAKHLOUKI AHMED**

Date de naissance : **21.01.1950**

Adresse : **HAY DOU MA GR. Rue 10 N° 41 81M**

Tél. : **06 41 61 0834** Total des frais engagés : **#6341**

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : **(6)**

Date de consultation : **22/03/2021**

Nom et prénom du malade : **RACHID HASSAN** Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : **ARTHROSIS**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : **ACCIDENT AU TRAVAIL**

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **ACCUEIL** Le : **23 MARS 2021**

Signature de l'adhérent(e) : **RACHID HASSAN**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/03/2021	Acte de consultation	1	100,00	Dr EZZAKI Hassane
				Montant total de la facture : 100,00

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur



Date

8.2
03
28

Montant de la Facture

Dr EZZAKI Hassane
Medecin Dentiste
Radiologue
Montant total de la facture : 100,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d'état de la dent traitée.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412 00000000	21433552 00000000	MONTANTS DES SOINS
	D	00000000 35533411	00000000 11433553	DATE DU DEVIS
	G			DATE DE L'EXECUTION
	B			
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur EZZAKI Hassan

Diplômé du Centre Hospitalier

Ibn Rochd de Casablanca


Ancien Interne de l'Hôpital Mohamed VI

et Service des Urgences

Médecine Générale

Diplôme en Echographie

Casablanca, le :



203,00

ن مواعظ نجاح
الحمد لله

a) Cost oneq 165 / 200

149,20

- 2

130,20

3)

regard

SV

C 11

Dr EZZAKI HASSAN - Casablanca - Tél.: 05 22.71.05.39 - GSM : 06 61 06 28 80
Diplôme en Echographie (GSM : 06 61 06 28 80)
Médécine Générale - Casablanca - Tél.: 05 22.71.05.39

265. شارع للأسماء - المجموعة 6 - سيدى مومن الجديد - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22.71.05.39 - المحمول : 06 61.06.28.80

265, Bd. Lalla Asmaâ - G 6 - Sidi Moumen Jdid - Casablanca - Tél. : 05 22.71.05.39 - GSM : 06 61 06 28 80

28,000/-
Taxes
Net Total
538,40

SV

0522 70 39 39 : 06 28 80
Sidi Moumen - Té: 0522 70 26 46
Pharmacie GENERALE
ELLAKHASSAN



PREZAR® 100 mg

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE 100 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-2908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC ; médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche. PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrira, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants âgés de moins de 6 ans

PREZAR® n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs de l'ACE, les inhibiteurs de l'AT1, les alpha- ou bêta-bloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline, ximelaglutide, sulfamides hypoglycémiants, glibizones et gliclazides.

La dose quotidienne recommandée est de 100 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée à 150 mg par jour la deuxième semaine, puis à 200 mg par jour la troisième semaine. La dose quotidienne recommandée est de 200 mg de losartan une fois par jour. Pour les patients qui ne tolèrent pas la dose quotidienne recommandée de 200 mg de losartan, la dose peut être diminuée à 150 mg par jour la quatrième semaine.

La dose quotidienne recommandée est de 200 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée à 150 mg par jour la deuxième semaine, puis à 200 mg par jour la troisième semaine. La dose quotidienne recommandée est de 200 mg de losartan une fois par jour. Pour les patients qui ne tolèrent pas la dose quotidienne recommandée de 200 mg de losartan, la dose peut être diminuée à 150 mg par jour la quatrième semaine.

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, 1 comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan empêche l'augmentation de la pression dans les artères et augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou un débâloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients souffrant d'insuffisance rénale ou cardiaque. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients porteurs d'un diabète.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à tous les autres composants de ce médicament.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (Il est également préconisé de ne pas prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").

- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'antécédent de diabète est connu.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démagogie, œdème, etc.) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer.

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs patients. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Étouffements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après un repas),

• Réaction allergique sévère (éruption cutanée, démagogie, œdème, etc.) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer.

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs patients. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Frénages (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Étouffements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après un repas),

• Réaction allergique sévère (éruption cutanée, démagogie, œdème, etc.) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer.

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs patients. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Somnolence,

• Maux de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium (maladie rénale),

• Pouvez fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Somnolence,

• Maux de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Essoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

• Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,

• Angio-œdème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite) incluant les artères et les veines,

• Engourdissement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

• Inflammation du foie (hépatite),

• Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT),

• Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des observations)

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippe,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (nécrose musculaire),

• Impuissance,

• Inflammation du pancréas (pancréatite),


• Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, tourbillonnement, fourmillement ou claquement des oreilles,

• Troubles du goût (dysgueusie).



TRE-ZEN®

Chlorhydrate de paroxétine

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

COMPOSITION :

Comprimé pelliculé sécable : la substance active est :

Paroxétine base 20,00 mg

sous forme de chlorhydrate de paroxétine anhydre

pour un comprimé pelliculé sécable.

Les autres composants sont : mannitol, cellulose microcristalline, copovidone, carboxyméthylamidon sodique (type A), silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Pelliculage : hypromellose, talc, dioxyde de titane (E 171).

Excipient à effet notoire : mannitol

1. QU'EST CE QUE TRE-ZEN® 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE : Antidépresseur / inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine.

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable.

Existe en boîte de 15 et de 30 comprimés.

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- Des épisodes dépressifs majeurs, c'est-à-dire caractérisés.
- De la prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie.
- Des troubles obsessionnels compulsifs.
- Du trouble de l'anxiété sociale caractérisé «phobies sociales» lorsqu'il perturbe de manière importante les activités professionnelles ou sociales.
- Du stress post-traumatique
- De l'anxiété généralisée, évoluant depuis au moins 6 mois.

2. INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE TRE-ZEN® 20 mg, comprimé pelliculé sécable:

Ne pas prendre TRE-ZEN® comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- Allergie connue à la paroxétine ou à l'un des excipients,
- Enfants de moins de 15 ans,
- Association avec certains médicaments antidépresseurs de type IMAO (nialamide, iproniazide, moclobémide, toloxatone).

Toutefois, si votre médecin juge indispensable de vous prescrire l'association de la paroxétine avec la toloxatone ou le moclobémide, (IMAO A), vous devez être hospitalisé pour une surveillance de quelques jours.

- En cas d'allaitement sauf avis contraire de votre médecin.

• Prendre des précautions particulières avec TRE-ZEN® 20mg, comprimé pelliculé sécable :

Mises en garde:

Comme avec tous les antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin.

Dans certains cas, une accentuation de l'anxiété ou une angoisse peuvent survenir. Il faut consulter immédiatement votre médecin.

L'absorption d'alcool ou de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

La prise concomitante de millepertuis nécessite une surveillance clinique régulière, les effets indésirables de la paroxétine pouvant être plus fréquents.

Le trouble anxiété sociale «phobies sociales» n'est pas une timidité excessive, mais un trouble caractérisé notamment par l'évitement ou la peur perturbant de manière importante les activités professionnelles ou sociales entraînant une souffrance marquée.

Précautions d'emploi :

Prévenez votre médecin en cas de :

- Insomnie ou nervosité en début de traitement.
- Insuffisance rénale ou insuffisance hépatique
- Épilepsie ou antécédent d'épilepsie, la survie
- Glaucome,
- Antécédent d'anomalies de la coagulation ou risque de saignement (anticoagulant, certains

Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament si vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez le pour suivre.

Allaitement :

Le traitement par la paroxétine est déconseillé. Demandez conseil à votre médecin ou à votre

PPV 1300H20

PER 10722

SUT 02771



ثليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف
ثليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف
ثليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف

كليورات المقوّمين

يجب قراءة هذه النشرة بالكامل قبل تناول هذا الدواء.

احفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لفترةٍ أطولها من جيد، إذا كانت لديك آية استلة أخرى، إذا كان لديك شلل، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلاني.

وصف هذه الدواء لك شخصياً، لا تتعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، إلا ذلك قد يسبب له الضرر.

إذا ظهرت أحد الأعراض غير الموصى به أو إذا لاحظ تأثيراً غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلاني به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

1- ما هو ثليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول ثليكوفاج، قرص مغلف؟

3- ما هي طرق حفظ ثليكوفاج، قرص مغلف؟

4- ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة؟

5- ما هي طرائق تحضير ثليكوفاج، قرص مغلف؟

6- محتوى العلبة وعلومات إضافية.

1- ما هو ثليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

A10BA02 code ATC: A10B

دواعي الاستعمال:

يستخدم ثليكوفاج على مقوّمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة مقوّياغ.

المتوارد في الدم، يستخدم الجسم الغلوكوز بسعة الجسم باستعداد كمية الغلوكوز (السكر) عندما تكون مريضاً بالسكري، لا يتمكن الميكروبات من إنتاج الطاقة أو يخزنه، واستخدامه لاحقاً ليس قادراً على استخدام المضادات المحسنة للسكر الذي ينبع بشكل صحيح يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الملوكيون في دمك حتى يصبح المستوي أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بآية وعائي وذئب وزن زائد، يسمح كذلك تناول ثليكوفاج على المدى الطويل للمساعدة على الحد من انتشار المضادات المحسنة للسكر في الدم، لكن، قد يؤدي إلى انتفاخ معدل السكر في الدم، مما يتطلب تغييرات في الأدوية، الأنسولين، الميلتيبيتين، إلخ.

إذا كنت بآية وعائي وذئب وزان زائد، يسمح كذلك تناول ثليكوفاج على المدى الطويل في الوزن أو يفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها ثليكوفاج؟

يستخدم ثليكوفاج لعلاج السكري في النوع 2 (السمى كذلك "السكري غير المتوقف على الأنسولين") عندما لا يسمح بشكل خاص لدى الوصي والغير الذي يعانون من زيادة الوزن.

يستخدم الرضّي البالغون تناول ثليكوفاج وهذه أو مع آدوية أخرى ضد السكري (أدوية قاتلة للبلع أو أنسولين).

يسقط ضغط الأقطال في سن العاشرة وما فوق والراهقون تناول ثليكوفاج وهذه أو مع

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول ثليكوفاج، قرص مغلف؟

مواضع الاستعمال:

لا تتناول أبداً ثليكوفاج في الحالات التالية:

إذا كنت تعاني من الآرجيغلافيج من الأدوية المفترطة تجاه المقوّمين أو أحد المكونات الأخرى.

لذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

إذا كنت تعاني من مشكلات في الكبد.

إذا كنت تعاني من تهور حاد في وظائف الكلى.

إذا كنت تعاني من سكري غير محكم، وبصاحب مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمعنى

(أنظر "خطر حاضن لبني" أسلحة)، حساسية مثلاً غير ملحوظة، عيوب ملحوظة، مقدار سكر للوزن، حساس لنفس.

أو في تراكم مواد في الدم تسمى "جسم كيتوسي" والتي من شأنه التسبب بسياس سكري.

أو في الأعراض هي تشمل الـ في العدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في التبول، نفس.

LOT 201566
 EXP 11/2023
 PPV 28.00DH



Dénomination du médicament :

COTAREG®

80/12.5 mg, 160/12.5 mg, 160/25 mg

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Valsartan / Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que COTAREG et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COTAREG ?
3. Comment prendre COTAREG ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COTAREG ?

1. Qu'est-ce que COTAREG et dans quel cas est-il utilisé ?

COTAREG



6 118001 030521

COTAREG 160/12.5 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 203.00 DH

COTAREG s'utilise pour traiter l'hypertension légère ou modérée chez des patients lorsqu'un traitement combinant deux substances actives est nécessaire.

Votre médecin en mesurera et en contrôlera l'effet en prenant la pression artérielle.

COTAREG ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COTAREG ?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Pourquoi faut-il traiter une hypertension artérielle ?

Une hypertension artérielle non traitée peut endommager des organes vitaux tels que le cœur, les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir aujourd'hui en parfaite santé, sans aucune manifestation de maladie – mais une hypertension non traitée peut entraîner des séquelles ultérieures telles qu'un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou la cécité.

Quand COTAREG ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devez pas prendre COTAREG si vous avez eu dans le passé une hypersensibilité ou une allergie au valsartan, à l'hydrochlorothiazide ou à un autre composant du médicament. De même, vous ne devez pas prendre COTAREG pendant la grossesse, vous programmez une grossesse ou en période d'allaitement, si vous souffrez d'une destruction des voies biliaires de petit calibre dans la foie (cirrhose biliaire) conduisant à un arrêt de l'écoulement de la bile, si vous souffrez d'un diabète (de type 1 ou 2) ou d'une insuffisance rénale, si vous prenez de l'aliskirène, un principe actif abaissant la pression artérielle, ou encore si vous souffrez d'une forte tension héréditaire, qui a provoqué chez vous un gonflement du visage, une forte douleur à la langue ou du larynx (troubles de la déglutition ou de la respiration). Vous ne devez pas prendre Cotareg.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de COTAREG ?

Comme tout médicament abaissant la pression artérielle, COTAREG peut diminuer votre vigilance et votre concentration. C'est pour-