

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

cique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

Déclaration de Maladie : N° P19- 0007800



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

2466

Société

ROYAL AIR MAROC

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Mme SOUSSI Saïda

Date de naissance :

1954

Adresse :

30 Avenue Amel Bentache, Casablanca - TAFRAOUT - Maroc

Tél. :

066.892.1004

Total des frais engagés :

3

24 MARS 2021

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

18

الدكتور رشيد العراقي
Dr Rachid LARAJI

ACCIFII

Date de consultation :

12/01/2021

Nom et prénom du malade :

Saïda Soussi

Age : 66ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Arthrose HGS

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Le : 24/03/2021

Signature de l'adhérent(e) :

SM

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
٢٠١٧/١١/٢٠١٨	Consultation		100	الدكتور داود العراقي Dr. Daoud AL RA'EE
			10	
			10	
			700	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMA Rue Abd Al-Wahab Bourguiba 53 Tunis 1005 Tunisie Tél 0522 369144	18/01/2018	2873,90

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS
	H 25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	G 00000000 B	DATE DU DEVIS
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

الدكتور رشيد العراقي
DOCTEUR RACHID LARAKI

Ancien résident du Collège de Médecine
des Hôpitaux de Paris

Ancien chef de clinique à la Faculté de
Paris VI (Pitié-Salpêtrière)

18/11/2011

Ne Ben Peche

MÉDECINE INTERNE

F. Jocard 240 1/; S.V.
~~149,20 x 96 net~~

Acards nos (or prejan 100)
1340 x 74 1/; au ordre

Colchicine 1/; S.V.

D'Vescane = 1/; S.V.

D'Coref 1A+13 1/; S.V.

Tandy (no 80 1/; 15/11/11)

28/11/2011
PHARMACIE ISMAILIA
Rue Abou Al Waaq Bourgogne
Lebajima - Casablanca
Casablanca * 05 22 36 97 44
Rue Abou Al Waaq Bourgogne

الدكتور رشيد العراقي
Dr Rachid LARAKI
Bd Brahim Roudani - 20330 Casablanca
Tél : 05 22 98 16 69 - الهاتف : Fax : 05 22 98 14 07
rlaraki.interniste@gmail.com

PPV: 49,60 DH

LOT: 20J13

EXP: 10/2023

PPV: 49,60 DH

LOT: 20J13

EXP: 10/2023

PREZAR

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE.....

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 et prévenir l'insuffisance rénale et une protéinurie, 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans l'urine) confirmée par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'il n'y a pas d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) : médicaments antihypertenseurs de contre-indication. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants ADULTES HYPERINTENDUS

PREZAR® n'est pas

établies dans ce groupe.

Patients adultes hy-

La dose habituelle d'

pelliculé sécable). La

PREZAR® 50 mg, co-

la réponse tensionnelle

Les comprimés de lo-

les inhibiteurs calcique

et les autres médica-

l et inhibiteurs alpha 1

Patients adultes ins-

La dose habituelle d'

par paliers chaque s-

50 mg par jour la tro-

jusqu'à la dose d'entre-

P P V 1 4 9 D H 2 0
P F E R 1 2 / 2 3
L O T J 3 6 8 5

d'emploi et l'efficacité n'étant pas

de PREZAR® 50 mg, comprimé une fois par jour (2 comprimés de comprimé pelliculé) en fonction de

tenseurs (tels que les diurétiques, en centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les hypoglycémiants, glitazos

ment, la dose doit être augmentée par jour la deuxième semaine, par jour la cinquième semaine) de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les personnes.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de 3 mois (Il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique Grossesse).
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérite contenant de l'aliskiren.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, œdème peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs personnes.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

Effets (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Étourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise), surtout sous traitement par des doses élevées de diurétiques.
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle à la position assise,

- Faiblesse,
- Fatigue,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

- Modification de la fonction rénale, y compris l'insuffisance rénale,
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

- Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium.

- Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Somnolence,
- Mauvaise tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),

- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,

- Diarrhée,
- Nausées,

- Vomissements,
- Éruption (urticaire),

- Démarquaisons (prurit),
- Éruption cutanée,

- Gonflement localisé (œdème),

- Toux,
- Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,

- Angio-oedème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite) incluant

- Engourdissement ou picotements (paresthesies),

- Évanouissement (syncope),

- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation atriale),
- Attaque cérébrale (AVC),

- Inflammation du foie (hépatite),

- Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT),

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des observations)

- Diminution du nombre de plaquettes,

- Migraine,

- Anomalies de la fonction hépatique,

- Douleurs musculaires et articulaires,

- Syndrome pseudo-grippal,

- Douleur dorsale et infection urinaire,

- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,

- Impuissance,

- Inflammation du pancréas (pancréatite),

- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

- Dépression,

- Sensation générale de malaise,

- Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,

- Troubles du goût (dysgueuseuse).

PREZAR

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE.....

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 et prévenir l'insuffisance rénale et une protéinurie, 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans l'urine) confirmée par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'il n'y a pas d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) : médicaments antihypertenseurs de contre-indication. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants ADULTES HYPERINTENDUS

PREZAR® n'est pas

établies dans ce groupe.

Patients adultes hy-

La dose habituelle d'

pelliculé sécable). La

PREZAR® 50 mg, co-

la réponse tensionnelle

Les comprimés de lo-

les inhibiteurs calcique

et les autres médica-

l et inhibiteurs alpha 1

Patients adultes ins-

La dose habituelle d'

par paliers chaque s-

50 mg par jour la tro-

jusqu'à la dose d'entre-

P P V 1 4 9 D H 2 0
P F E R 1 2 / 2 3
L O T J 3 6 8 5

d'emploi et l'efficacité n'étant pas

de PREZAR® 50 mg, comprimé une fois par jour (2 comprimés de comprimé pelliculé) en fonction de

teuseurs (tels que les diurétiques, en centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les hypoglycémiants, glitazos

ment, la dose doit être augmentée par jour la deuxième semaine, par jour la cinquième semaine) de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de 3 mois (Il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérielle contenant de l'aliskiren.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus pro-

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démarcation peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs personnes.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence. Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR®

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Étouffements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise),
- Sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques,
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle à la position assise,
- Faiblesse,
- Fatigue,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- Modification de la fonction rénale, y compris l'insuffisance rénale,
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),
- Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium,
- Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :
- Somnolence,
- Mauvaise tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Éruption (urticaire),
- Démarcations (prurit),
- Éruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux,
- Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :
- Hypersensibilité,
- Angio-oedème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant l'artérite),
- Engourdissement ou picotements (paresthesies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation atriale),
- Attaque cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élevation du taux de lalanine amino-transférase (ALAT),
- Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de l'observation) :
- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,
- Impuissance,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,
- Problèmes du goût (dysgueuseuse).



PREZAR

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE.....

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 et prévenir l'insuffisance rénale et une protéinurie, 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans l'urine) confirmée par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'il n'y a pas d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) : médicaments antihypertenseurs de contre-indication. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants ADULTES HYPERINTENDUS

PREZAR® n'est pas

établies dans ce groupe.

Patients adultes hy-

La dose habituelle d'

pelliculé sécable). La

PREZAR® 50 mg, co-

la réponse tensionnelle

Les comprimés de lo-

les inhibiteurs calcique

et les autres médica-

l et inhibiteurs alpha 1

Patients adultes ins-

La dose habituelle d'

par paliers chaque s-

50 mg par jour la tro-

jusqu'à la dose d'entre-

P P V 1 4 9 D H 2 0
P F E R 1 2 / 2 3
L O T J 3 6 8 5

d'emploi et l'efficacité n'étant pas

de PREZAR® 50 mg, comprimé une fois par jour (2 comprimés de comprimé pelliculé) en fonction de

tenseurs (tels que les diurétiques, en centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les hypoglycémiants, glitazos

ment, la dose doit être augmentée par jour la deuxième semaine, par jour la cinquième semaine) de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les personnes.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de 3 mois (Il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérielle contenant de l'aliskiren.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démarcation peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs personnes.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

Effets (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Étourdissements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise de comprimé),

• Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle à la position assise,

• Faiblesse,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris l'insuffisance rénale,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium (au moins 1 patient sur 100).

Fraux (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Somnolence,

• Maux de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Essoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant

• Engourdissement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

• Attaque cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT),

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des observations)

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,

• Impuissance,

• Inflammation du pancréas (pancréatite),

• Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,

• Troubles du goût (dysgueuseuse).

PREZAR

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE.....

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 et prévenir l'insuffisance rénale et une protéinurie, 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans l'urine) confirmée par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'il n'y a pas d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) : médicaments antihypertenseurs de contre-indication. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants ADULTES HYPERINTENDUS

PREZAR® n'est pas

établies dans ce groupe.

Patients adultes hy-

La dose habituelle d'

pelliculé sécable). La

PREZAR® 50 mg, co-

la réponse tensionnelle

Les comprimés de lo-

les inhibiteurs calcique

et les autres médica-

l et inhibiteurs alpha 1

Patients adultes ins-

La dose habituelle d'

par paliers chaque s-

50 mg par jour la tro-

qu'à la dose d'entre-

P P V 1 4 9 D H 2 0
P F E R 1 2 / 2 3
L O T J 3 6 8 5

d'emploi et l'efficacité n'étant pas

de PREZAR® 50 mg, comprimé une fois par jour (2 comprimés de comprimé pelliculé) en fonction de

teuseurs (tels que les diurétiques, en centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les hypoglycémiants, glitazone

ment, la dose doit être augmentée par jour la deuxième semaine, par jour la cinquième semaine) de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les personnes.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de 3 mois (Il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique Grossesse).
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérite contenant de l'aliskiren.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démarcation peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs personnes.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

Effets (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Étourdissements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise de comprimé),

• Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle à la position assise,

• Faiblesse,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris l'insuffisance rénale,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium,

• Pou fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Somnolence,

• Maux de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Essoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant

• Engourdissement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation),

• Attaque cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• Élevation du taux de lalanine amino-transférase (ALAT),

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de l'observation) :

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,

• Impuissance,

• Inflammation du pancréas (pancréatite),

• Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,

• Troubles du goût (dysgueusie).

PREZAR

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE.....

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 et prévenir l'insuffisance rénale et une protéinurie, 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans l'urine) confirmée par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'il n'y a pas d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) : médicaments antihypertenseurs de contre-indication. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants ADULTES HYPERINTENDUS

PREZAR® n'est pas

établies dans ce groupe.

Patients adultes hy-

La dose habituelle d'

pelliculé sécable). La

PREZAR® 50 mg, co-

la réponse tensionnelle

Les comprimés de lo-

les inhibiteurs calcique

et les autres médica-

l et inhibiteurs alpha 1

Patients adultes ins-

La dose habituelle d'

par paliers chaque s-

50 mg par jour la tro-

qu'à la dose d'entre-

P P V 1 4 9 D H 2 0
P F E R 1 2 / 2 3
L O T J 3 6 8 5

d'emploi et l'efficacité n'étant pas

de PREZAR® 50 mg, comprimé une fois par jour (2 comprimés de comprimé pelliculé) en fonction de

teuseurs (tels que les diurétiques, en centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les hypoglycémiants, glitazos

ment, la dose doit être augmentée par jour la deuxième semaine, par jour la cinquième semaine) de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de 3 mois (Il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérielle contenant de l'aliskiren.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démarcation peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs personnes.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

Effets (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Étourdissements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise de comprimé),

• Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle à la position assise,

• Faiblesse,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris l'insuffisance rénale,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium,

• Pou fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Somnolence,

• Maux de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Essoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant

• Engourdissement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

• Attaque cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• Élevation du taux de lalanine amino-transférase (ALAT),

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des observations)

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,

• Impuissance,

• Inflammation du pancréas (pancréatite),

• Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,

• Troubles du goût (dysgueusie).

PREZAR

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE.....

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 et prévenir l'insuffisance rénale et une protéinurie, 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans l'urine) confirmée par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'il n'y a pas d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) : médicaments antihypertenseurs de contre-indication. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants ADULTES HYPERINTENDUS

PREZAR® n'est pas

établies dans ce groupe.

Patients adultes hy-

La dose habituelle d'

pelliculé sécable). La

PREZAR® 50 mg, co-

la réponse tensionnelle

Les comprimés de lo-

les inhibiteurs calcique

et les autres médica-

l et inhibiteurs alpha 1

Patients adultes ins-

La dose habituelle d'

par paliers chaque s-

50 mg par jour la tro-

qu'à la dose d'entre-

P P V 1 4 9 D H 2 0
P F E R 1 2 / 2 3
L O T J 3 6 8 5

d'emploi et l'efficacité n'étant pas

de PREZAR® 50 mg, comprimé une fois par jour (2 comprimés de comprimé pelliculé) en fonction de

teuseurs (tels que les diurétiques, en centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les hypoglycémiants, glitazos

ment, la dose doit être augmentée par jour la deuxième semaine, par jour la cinquième semaine) de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de 3 mois (Il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérielle contenant de l'aliskiren.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démarcation peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs personnes.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

Effets (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Étourdissements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise de comprimé),

• Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle à la position assise,

• Faiblesse,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris l'insuffisance rénale,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium,

• Pou fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Somnolence,

• Maux de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Essoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant

• Engourdissement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation),

• Attaque cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• Élevation du taux de lalanine amino-transférase (ALAT),

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de l'observation) :

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,

• Impuissance,

• Inflammation du pancréas (pancréatite),

• Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,

• Troubles du goût (dysgueusie).

PREZAR

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE.....

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 et prévenir l'insuffisance rénale et une protéinurie, 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans l'urine) confirmée par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'il n'y a pas d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) : médicaments antihypertenseurs de contre-indication. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants ADULTES HYPERINTENDUS

PREZAR® n'est pas

établies dans ce groupe.

Patients adultes hy-

La dose habituelle d'

pelliculé sécable). La

PREZAR® 50 mg, co-

la réponse tensionnelle

Les comprimés de lo-

les inhibiteurs calcique

et les autres médica-

l et inhibiteurs alpha 1

Patients adultes ins-

La dose habituelle d'

par paliers chaque s-

50 mg par jour la tro-

qu'à la dose d'entre-

P P V 1 4 9 D H 2 0
P F E R 1 2 / 2 3
L O T J 3 6 8 5

d'emploi et l'efficacité n'étant pas

de PREZAR® 50 mg, comprimé une fois par jour (2 comprimés de comprimé pelliculé) en fonction de

teuseurs (tels que les diurétiques, en centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les hypoglycémiants, glitazos

ment, la dose doit être augmentée par jour la deuxième semaine, par jour la cinquième semaine) de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de 3 mois (Il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérielle contenant de l'aliskiren.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démarcation peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs personnes.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

Effets (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Étourdissements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise de comprimé),

• Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle à la position assise,

• Faiblesse,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris l'insuffisance rénale,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium.

Frs fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Somnolence,

• Maux de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Essoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant

• Engourdissement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),

• Attaque cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• Élevation du taux de lalanine amino-transférase (ALAT),

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données)

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,

• Impuissance,

• Inflammation du pancréas (pancréatite),

• Taux bas de sodium dans le sang (hypotonie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,

• Troubles du goût (dysgueuseuse).

PREZAR

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE.....

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 et prévenir l'insuffisance rénale et une protéinurie, 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans l'urine) confirmée par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'il n'y a pas d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) : médicaments antihypertenseurs de contre-indication. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants ADULTES HYPERINTENDUS

PREZAR® n'est pas

établies dans ce groupe.

Patients adultes hy-

La dose habituelle d'

pelliculé sécable). La

PREZAR® 50 mg, co-

la réponse tensionnelle

Les comprimés de lo-

les inhibiteurs calcique

et les autres médica-

l et inhibiteurs alpha 1

Patients adultes ins-

La dose habituelle d'

par paliers chaque s-

50 mg par jour la tro-

qu'à la dose d'entre-

P P V 1 4 9 D H 2 0
P F E R 1 2 / 2 3
L O T J 3 6 8 5

d'emploi et l'efficacité n'étant pas

é de PREZAR® 50 mg, comprimé une fois par jour (2 comprimés de comprimé pelliculé) en fonction de

tenseurs (tels que les diurétiques, en centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les hypoglycémiants, glitazos

ment, la dose doit être augmentée par jour la deuxième semaine, par jour la cinquième semaine) de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les personnes.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de 3 mois (Il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérite contenant de l'aliskiren.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, œdème) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer.

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs personnes.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

Effets (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Étourdissements,

• Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise), surtout sous traitement par des doses élevées de diurétiques.

• Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle à la position assise,

• Faiblesse,

• Fatigue,

• Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

• Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

• Modification de la fonction rénale, y compris l'insuffisance rénale,

• Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

• Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium.

Fraux fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Somnolence,

• Maux de tête,

• Troubles du sommeil,

• Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

• Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

• Essoufflement (dyspnée),

• Douleurs abdominales,

• Constipation opiniâtre,

• Diarrhée,

• Nausées,

• Vomissements,

• Éruption (urticaire),

• Démangeaisons (prurit),

• Éruption cutanée,

• Gonflement localisé (œdème),

• Toux,

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

• Hypersensibilité,

• Angio-oedème,

• Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant

l'engourdissement ou picotements (paresthesies),

• Évanouissement (syncope),

• Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation),

• Attaque cérébrale (AVC),

• Inflammation du foie (hépatite),

• Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT),

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de l'observation) :

• Diminution du nombre de plaquettes,

• Migraine,

• Anomalies de la fonction hépatique,

• Douleurs musculaires et articulaires,

• Syndrome pseudo-grippal,

• Douleur dorsale et infection urinaire,

• Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

• Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,

• Impuissance,

• Inflammation du pancréas (pancréatite),

• Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

• Dépression,

• Sensation générale de malaise,

• Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,

• Troubles du goût (dysgueuseuse).

PREZAR

Losartan

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

La substance active est :

LOSARTAN POTASSIQUE.....

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégalatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique type A, opadry II OY-LS-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notable : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 et prévenir l'insuffisance rénale et une protéinurie, 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans l'urine) confirmée par des examens biologiques.
- Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'il n'y a pas d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) : médicaments antihypertenseurs de contre-indication. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
- Chez les patients présentant une hypertension et un épaissement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants ADULTES HYPERINTENDUS

PREZAR® n'est pas

établies dans ce groupe.

Patients adultes hy-

La dose habituelle d'

pelliculé sécable). La

PREZAR® 50 mg, co-

la réponse tensionnelle

Les comprimés de lo-

les inhibiteurs calcique

et les autres médica-

l et inhibiteurs alpha 1

Patients adultes ins-

La dose habituelle d'

par paliers chaque s-

50 mg par jour la tro-

jusqu'à la dose d'entre-

P P V 1 4 9 D H 2 0
P F E R 1 2 / 2 3
L O T J 3 6 8 5

d'emploi et l'efficacité n'étant pas

de PREZAR® 50 mg, comprimé une fois par jour (2 comprimés de comprimé pelliculé) en fonction de

tenseurs (tels que les diurétiques, en centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les hypoglycémiants, glitazos

ment, la dose doit être augmentée par jour la deuxième semaine, par jour la cinquième semaine) de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan augmente le passage de l'eau à travers le rein) et/ou l'efficacité) et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier chez ceux traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de 3 mois (Il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérielle contenant de l'aliskiren.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus pro-

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démarcation peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs personnes.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence. Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR®

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Étouffements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une prise),
- Sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques,
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression artérielle à la position assise,

Faiblesse,

Fatigue,

Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),

Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),

Modification de la fonction rénale, y compris l'insuffisance rénale,

Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),

Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium,

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

Somnolence,

Mauvaise tête,

Troubles du sommeil,

Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),

Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),

Essoufflement (dyspnée),

Douleurs abdominales,

Constipation opiniâtre,

Diarrhée,

Nausées,

Vomissements,

Éruption (urticaire),

Démarcations (prurit),

Éruption cutanée,

Gonflement localisé (œdème),

Toux,

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

Hypersensibilité,

Angio-oedème,

Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite incluant

Engourdissement ou picotements (paresthesies),

Évanouissement (syncope),

Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation),

Attaque cérébrale (AVC),

Inflammation du foie (hépatite),

Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALAT),

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de l'essai)

Diminution du nombre de plaquettes,

Migraine,

Anomalies de la fonction hépatique,

Douleurs musculaires et articulaires,

Syndrome pseudo-grippal,

Douleur dorsale et infection urinaire,

Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),

Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,

Impuissance,

Inflammation du pancréas (pancréatite),

Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),

Dépression,

Sensation générale de malaise,

Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement de tête,

Problèmes du goût (dysgueuseuse).

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétoxydrosomique.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones)
- Si vous prenez les bisphosphonates
- Si vous prenez les articulations (l'acétaminophène)
- Si vous prenez la thyroïde (la levothyroxine)
- Si vous prenez l'entacapone,
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie



6 118001 103041

Tardyferon® 80mg
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

PPV : 40.50 DH

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠

كولشيسين ميلور

تحذيرات

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، مع أو بدون الغثيان والقيء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

- إذا كانت لديك أسلطة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك.

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

سواغات ذات التأثير المركب المعروف: الألكتوز، السكرورز سواغات الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط

M04AC01 ٢. الفتة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال:

يتنصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال الإصابة الأولى بها

الجرعة ٤. احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترس الحاد

يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصف فرقن دون تجاوز ١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص) لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من ١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية. ينبغي أن تؤخذ ١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة (٢ ملخ)

في بعض الحالات، يمكن رصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم.

٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الثاني والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم.

١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية

في حالة الإسهال، احصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضرورياً

الوقاية من الهجمات الحادة هي التقرس / الوصول إلى العوزة / هولسين الحاد | مرض بريجت

١ ملخ كولشيسين يومياً

خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في حالة الإسهال

المرض الدوري

بالغ

١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً

قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات ٠.٥ ملخ (١/٢ قرص) إلى حد أقصى ٢ ملخ من الكولشيسين يومياً اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

يظل

٠.٥ ملخ إلى ٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ حبة) في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى بها) هنا الإصابة أو أثناء تكرارها

يوصى الكولشيسين بالاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكتير

يجب تحديد الجرعة لتناسب وزن المريض

٢. تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة

عنة هي ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتين يومياً)

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى بها) بهذا الإلتهاب

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

٣. لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ قرص قابل للكسر

إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، أو بدون الفحص والقىء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

٢. الغلاف ذات التأثير المدлен والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال: ينصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت.

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة: احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترات الحادة يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصفيف قرص أو تحصل قرص دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. بينما في أن تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائنة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم**.

- **٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والتالي من العلاج، موزعة على مدار اليوم** ،

- **١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية** في حالة الإسهال، احصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

٦. الآثار الجانبية: في هذه الحالة هي **القرص / الوصول إلى العروق / هولسين الحادة** | مرض بريجت

٧. تحذيرات: خفض الجرعة إلى **٠.٥ ملخ من الكولشيسين يومياً (١/٢ قرص)** في حالة الإسهال

المرض الدوري

٨. بالغ:

٩. ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمخبرية

١٠. ملخ إلى ٢ يوم من الكولشيسين (١/٢ حبة) في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجه التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، وهذا تكرارها

بوصف الكولشيسين بالاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكتاب يجب تتعديل الجرعة لتتناسب وزن المريض

، تكون الجرعة **٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص)** في اليوم الواحد بجرعة واحدة

، **٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)**

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى) بهذا الإلتهاب

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، أو بدون الفحص والقىء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

٢. الغلاف ذات التأثير المدлен والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال: ينصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت.

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة: احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترات الحادة يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصفيف قرص أو تحصل قرص دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. بينما في أن تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائنة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم**.

٥. ملخ من الكولشيسين في اليوم الثاني والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم ، **١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية**

في حالة الإسهال، احصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا **١ ملخ كولشيسين يومياً**

٦. خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في حالة الإسهال

المرض الدوري

٧. بالغ

٨. ١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمخبرية

٩. طفل ملخ إلى **٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ حبة)** في جرعة واحدة أو جرعتين. سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجه التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، وهذا تكرارها يوصى الكولشيسين بالاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكosteroid)

١٠. الكبار يجب تتعديل الجرعة لتتناسب وزن المريض

١١. تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة

١٢. عة هي ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)

١٣. الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى) بهذا الإلتهاب

١٤. لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ قرص قابل للكسر

١٥. إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

L O T 200842

E X P 05/2022

P P V 13.40D H

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، أو بدون الفحص والقىء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

٢. الغلاف ذات التأثير المدлен والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال: ينصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت.

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال الإصابة الأولى بها

٤. الجرعة: احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

النفوس الحاد يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل فرض أو تصف فرض كل اليوم. دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. بينما في أن تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائنة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم**.

- **٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والتالي من العلاج، موزعة على مدار اليوم** ،

- **١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية** في حالة الإسهال، احصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

٦ ملخ كولشيسين يومياً خفض الجرعة إلى **٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص)** في حالة الإسهال

المرض الدوري

بالغ

٧ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

٠.٥ ملخ إلى ٢ يوم من الكولشيسين (١/٢ حبة) في جرعة واحدة أو جرعتين. سيتم تكثيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجه التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، وهذا تكرارها يوصى الكولشيسين بالاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid) الكبار

يجب تحديد الجرعة لتناسب وزن المريض، تكون الجرعة **٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** في اليوم الواحد بجرعة واحدة، عة هي **٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)**

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (**الإصابة الأولى**) بهذا الإلتهاب

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، أو بدون الفحص والقىء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

- إذا كانت لديك أسلطة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك.

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، سواغات: السكرور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

سواغات ذات التأثير المركب المعروف: الالكتوز، السكرور

٢. الفئة الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال:

يتنصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترة الدوائية يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصفيف قرص كل اليوم. دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة

في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. ينبعي أن تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائمة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

- **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية** في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

الوقاية من الهجمات الحادة هي التقرس / الوصول إلى العوزة / هولسين الحاد | مرض بريجت

٥. خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين يومياً

المرض الدوري

بالغ

٦. ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

مثقل ملخ إلى **٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (٢/١ قرص)** إلى **٢ حبة** في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجه التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، وهذا تكرارها

بوصف الكولشيسين بالإضافة إلى الاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكبار يجب تحديد الجرعة لتتناسب وزن المريض

٧. تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة

٨. عة هي ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى) بهذا الإلتهاب

بال

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، أو بدون الفحص والقىء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

٢. الغلاف ذات التأثير المدлен والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال: ينصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت.

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال الإصابة الأولى بها

٤. الجرعة: احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

النفوس الحاد يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل فرض أو تصف فرض كل اليوم. دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. بينما في أن تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائنة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم**.

- **٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والتالي من العلاج، موزعة على مدار اليوم** ،

- **١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية** في حالة الإسهال، احصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

٦ ملخ كولشيسين يومياً خفض الجرعة إلى **٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص)** في حالة الإسهال

المرض الدوري

بالغ

٧ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

٠.٥ ملخ إلى ٢ يوم من الكولشيسين (١/٢ حبة) في جرعة واحدة أو جرعتين. سيتم تكثيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجه التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، وهذا تكرارها يوصى الكولشيسين بالاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid) الكبار

يجب تحديد الجرعة لتناسب وزن المريض، تكون الجرعة **٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** في اليوم الواحد بجرعة واحدة، عة هي **٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)**

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (**الإصابة الأولى**) بهذا الإلتهاب

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٥**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، مع أو بدون الغثيان والقيء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

- إذا كانت لديك أسلطة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك.

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، سواغات: السكرور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

سواغات ذات التأثير المركب المعروف: الألكتوز، السكرور

٢. الفئة الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط

M04AC01 **المز المتشريحي العلاجي الكيميائي**

٣. دواعي الاستعمال:

يتنصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للإلتهاب وذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفقرة الخامسة

يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصفيف قرص كل اليوم. دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. بينما في أن تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائمة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن رصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

- **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الثاني والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية**

في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضرورياً

الوقاية من الهجمات الحادة هي التقرس / الوصول إلى العوزة / هولسين الحاد | مرض ميخت

٦. خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين يومياً

المرض الدوري

بالغ

٧. ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً

قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

٨. طفل

٠.٥ ملخ إلى **٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ حبة)** في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاج إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، وهذا تكرارها

بوصف الكولشيسين بالإضافة إلى الاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للإلتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكتير

يجب تحديد الجرعة لتتناسب وزن المريض

٩. تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة

عنة ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى) بهذا الإلتهاب

بال

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٥**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، مع أو بدون الغثيان والقيء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

- إذا كانت لديك أسلطة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك.

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، سواغات: السكرور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

سواغات ذات التأثير المركب المعروف: الألاكتوز، السكرور

٢. الفئة الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال:

يتنصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترة الدوائية يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تحصل فرقن خلال اليوم. دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة

في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. بينما في **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود خطر لجرعة زائدة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم.

٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم.

١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

الوقاية من الهجمات الحادة هي التقرس / الوصول إلى العوزة / هولسين الحاد | مرض بريجت

١ ملخ كولشيسين يومياً خفض الجرعة إلى **٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص)** في حالة الإسهال

المرض الدوري

بالغ

١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

طفلي **٠.٥ ملخ إلى ٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ إلى ٢ حبة)** في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها إذا انتهت أو أثنت تكرارها

بوصف الكولشيسين بالإضافة إلى الاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكتير يجب تتعديل الجرعة لتتناسب وزن المريض

٢. تكون الجرعة **٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة**

عنة **٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)**

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى) بهذا الإلتهاب

بال

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠

كولشيسين ميلور

تحذيرات

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، مع أو بدون الغثيان والقيء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

- إذا كانت لديك أسلطة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك.

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

سواغات ذات التأثير المعرفة: الالكتوز، السكرور

٢. الفئة الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال:

يتنصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت

- في حالة ألمات إنتهازية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال الإصابة الأولى بها

الجرعة ٤

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترة الدوائية

يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصفيف قرص كل اليوم. يجب استخدام جرعات منخفضة من ١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية. ينبغي أن

تؤخذ ١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائمة

في بعض الحالات، يمكن رصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم.

٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم.

١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية

في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيف الجرعة أو تتعليق العلاج ضرورياً

الوقاية من الهجمات الحادة هي التقرس / الوصول إلى العوزة / هولسين الحاد | مرض بريجت

١ ملخ كولشيسين يومياً

خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين يومياً

بالرغبة

١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً

قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات ٠.٥ ملخ (١/٢ قرص) إلى حد أقصى ٢ ملخ من الكولشيسين يومياً اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

يطلب

٠.٥ ملخ إلى ٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ قرص) في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجي التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى بها) هنا الإصابة أو أثناء تكرارها

يوصى الكولشيسين بالاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكتير

يجب تحديد الجرعة لتتناسب وزن المريض

، تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة

عنة هي ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتين يومياً)

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى بها) بهذا الإلتهاب

الذال

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ قرص قابل للكسر

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء ، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، أو بدون الفحص والقىء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

٢. الغلاف ذات التأثير المدлен والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال: ينصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت.

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة: احرص دائمًا علىتناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

النفوس الحاد يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصف فرقن دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. ينبعي أن

تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائنة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم**.

٥. ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والتالي من العلاج، موزعة على مدار اليوم

٦. ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

٧. خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين يومياً في حالة **الجرعة المفرطة** التي **الوصول إلى العوزة** | **الحوادث** | **الحالات** | **مرض مهدت**

بالغ

٨. ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمخترية

٩. ملخ إلى ٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ حبة) في جرعة واحدة أو جرعتين. سيتم تكثيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجه التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، **أثناء تكرارها** يوصى الكولشيسين بالاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكبار

يجب تحديد الجرعة لتناسب وزن المريض، تكون الجرعة **٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص)** في اليوم الواحد بجرعة واحدة، تكون الجرعة **٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتين يومياً)**

الذين يعانون من **التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب** (**الإصابة الأولى**) بهذا الالتهاب

LOT 200842**EXP 05/2022****PPV 13.40DH**

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، أو بدون الفحص والقىء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

٢. الغلاف ذات التأثير المدлен والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال: ينصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت.

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة: احرص دائمًا علىتناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

النفوس الحاد يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصف فرقن دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. ينبعي أن

تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائنة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم**.

٥. ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والتالي من العلاج، موزعة على مدار اليوم

٦. ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

٧. خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين يومياً في حالة **الجرعة المفرطة** التي **الوصول إلى العوزة** | **الحوادث** | **الحالات** | **مرض مهدت**

بالغ

٨. ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمخترية

٩. ملخ إلى ٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ حبة) في جرعة واحدة أو جرعتين. سيتم تكثيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجه التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، **أثناء تكرارها** يوصى الكولشيسين بالاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكبار

يجب تحديد الجرعة لتناسب وزن المريض، تكون الجرعة **٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص)** في اليوم الواحد بجرعة واحدة، **عده هي ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)**

الذين يعانون من **الإسهال** **غشاء القلب الحاد** **مجهول السبب** (**الإصابة الأولى**) بهذا الإلتهاب

LOT 200842**EXP 05/2022****PPV 13.40DH**

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ** قرص قابل للكسر

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، مع أو بدون الغثيان والقيء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

٢. الفئة الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط سواغات ذات التأثير المركب، سواغات مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي M04AC01

٣. دواعي الاستعمال: ينصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس
- مرض دوري
- مرض بريجت.

- في حالة ألمات إنتهازية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال الإصابة الأولى بها

٤. الجرعة

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترة الحادة يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تحصل فرقن خالٍ اليوم. دون تجاوز ١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص) لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من ١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية. ينبغي أن تؤخذ ١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائنة

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم، ٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الثاني والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم،

١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية

في حالة الإسهال، احصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

١ ملخ كولشيسين يومياً

خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في حالة الإسهال

المرض الدوري

بالغ

١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً

قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات ٠.٥ ملخ (١/٢ قرص) إلى حد أقصى ٢ ملخ من الكولشيسين يومياً اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

يطلب

٠.٥ ملخ إلى ٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ قرص) إلى ٢ حبة في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجي التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى بها) هنا الإصابة أو أثناء تكرارها

بوصف الكولشيسين بالإضافة إلى الاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكتير

يجب تتعديل الجرعة لتتناسب وزن المريض

، تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة

عنة هي ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتين يومياً)

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى بهذا الإلتهاب

بال

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ قرص قابل للكسر

إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء ، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، أو بدون الفحص والقىء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

- إذا كانت لديك أسلطة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك.

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، سواغات: السكرور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

سواغات ذات التأثير المركب المعروف: الألاكتوز، السكرور

٢. الفئة الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال:

يتنصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترة الدوائية يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصفيف قرص كل اليوم. دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة

في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. ينبعي أن تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائمة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

- **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية** في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

الوقاية من الهجمات الحادة في التقرس / الوصول إلى العوزة / هولسين الحاد | مرض ميخت

٥. خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين يومياً

المرض الدوري

بالغ

٦. ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

مثقل ملخ إلى **٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (٢/١ قرص)** في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجه التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، وهذا تكرارها

بوصف الكولشيسين بالإضافة إلى الاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكتير يجب تحديد الجرعة لتتناسب وزن المريض

٧. تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة، **عنة ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)**

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى) بهذا الإلتهاب

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، أو بدون الفحص والقىء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

- إذا كانت لديك أسلطة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك.

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، سيفورات المغنيسيوم، الأرثروسين (اك الألوستين)، بوليغيفدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

سواقات ذات التأثير المعرفة: الالكتوز، السكرورز

٢. الفئة الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط

M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال:

يتنصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال الإصابة الأولى بها

٤. الجرعة

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترة الدوائية

يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصفيف قرص كل اليوم. دون تجاوز ١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص) لكل جرعة

في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من ١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية. ينبغي أن

تؤخذ ١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة (أداة)

في بعض الحالات، يمكن رصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

- ٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم.

- ٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الثاني والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم.

- ١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية

في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيف الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

الوقاية من الهجمات الحادة هي التقرس / الوصول إلى العوزة / هولسين الحاد | مرض بريجت

١ ملخ كولشيسين يومياً

خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في حالة الإسهال

المرض الدوري

بالغ

١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً

قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات ٠.٥ ملخ (١/٢ قرص) إلى حد أقصى ٢ ملخ من الكولشيسين يومياً اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

مُطلِّع

٠.٥ ملخ إلى ٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ قرص) في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى بها) هنا الإصابة أو أثناء تكرارها

يوصى الكولشيسين بالاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكosteroid)

الكتير

يجب تحديد الجرعة لتتناسب وزن المريض

، تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة

، عة هي ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتين يومياً)

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى بها) بهذا الإلتهاب

بال

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ قرص قابل للكسر

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء ، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٠**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، مع أو بدون الغثيان والقيء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

- إذا كانت لديك أسلطة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك.

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، سواغات: السكرور، ستيروات المغنيسيوم، الأرثريوسين (لاك الألوستيور)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

سواغات ذات التأثير المركب المعروف: الألكتوز، السكرور

٢. الفئة الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط

M04AC01 **المز المتشريحي العلاجي الكيميائي**

٣. دواعي الاستعمال:

يتنصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للإلتهاب وذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفقرة الخامسة

يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصفيف قرص كل اليوم. دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. بينما في أن تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائمة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن رصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

- **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الثاني والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية**

في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضرورياً

الوقاية من الهجمات الحادة هي التقرس / الوصول إلى العوزة / هولسين الحاد | مرض بريجت

٥. خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين يومياً

المرض الدوري

بالغ

٦. ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً

قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمختربة

مثقل

٧. ملخ إلى ٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (١/٢ حبة) في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجي التهاب، غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، وهذا تكرارها

بوصف الكولشيسين بالإضافة إلى الاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للإلتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكبار

يجب تحديد الجرعة لتتناسب وزن المريض

٨. تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة

٩. عة هي ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتين يومياً)

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى) بهذا الإلتهاب

بال

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١

كولشيسين أوبوكالسيوم ١ ملخ، قرص قابل للكسر، علبة من فئة ٥**كولشيسين ميلور****تحذيرات**

فظور الإسهال (البراز المائي أكثر من ٣ مرات يومياً) أثناء العلاج، مع أو بدون الغثيان والقيء، قد تكون أولى علامات **الجرعة الزائدة**، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

إذا لاحظت هذه العلامات، اتصل فوراً بالطبيب الذي سيخفض الجرعة أو يوقف العلاج بالكولشيسين.

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء فيتناول هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرايتها مرة أخرى.

- إذا كانت لديك أسلطة، فاطلب من طبيبك أو المسيدري.

- تم وصف هذا الدواء لك، لا تعطيه لآخرين. يمكن أن يكون ضاراً لهم. حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس أعراضك.

- إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

الفقرة ٦

١. تركيبة الدواء

كولشيسين ميلور، ستيروات المغنيسيوم، الأريثروسين (اك الألوستي)، بولييفيدون ك ٣٠، الالاكتوز ك لقرص قابل للكسر

سواغات ذات التأثير المركب المعروف: الألكتروز، السكروز

٢. الفئة الدوائية والعلاجية أو نوع النشاط
M04AC01

الفترة الدوائية والعلاجية مكافحة التقرس، مضادة للالتهابات، الرمز التشريحي العلاجي الكيميائي

٣. دواعي الاستعمال:

يتنصح بهذا الدواء في:

- العلاج والوقاية من هجمات التقرس

- مرض دوري

- مرض بريجت.

- في حالة ألمات إنتهاجية حادة أخرى ناجمة عن تواجد البولورات في المفاصل علاج التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب، إذا كان مرافقاً بالعلاج بالأدوية المعروفة المضادة للالتهاب و ذلك خلال **الإصابة الأولى** بها

٤. الجرعة

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في تلك

الفترات الحادة يجب تقييم جرعات كولشيسين أوبوكالسيوم لكل جرعة أو تصفيف قرص كل اليوم. دون تجاوز **١ ملخ من الكولشيسين (١ قرص)** لكل جرعة

في حالة العلاج المبكر، يجب استخدام جرعات منخفضة من **١ ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج في الأيام التالية**. ينبعي أن تؤخذ **١ ملخ كولشيسين في حالة عدم وجود عامل خطر لجرعة دائمة** لا تتجاوز أبداً

في بعض الحالات، يمكن وصف جرعات أعلى بشكل استثنائي، لا تتجاوز أبداً

- **٣ ملخ كولشيسين في اليوم الأول من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **٢ ملخ من الكولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والثالث من العلاج، موزعة على مدار اليوم.**

- **١ ملخ كولشيسين في اليوم الرابع من العلاج والأيام التالية** في حالة الإسهال، اتصل فوراً بالطبيب. قد يكون تخفيض الجرعة أو تتعليق العلاج ضروريًا

الوقاية من الهجمات الحادة هي التقرس / الوصول إلى العوزة / هولسين الحاد | مرض بريجت

٥. خفض الجرعة إلى ٠.٥ ملخ من الكولشيسين يومياً

المرض الدوري

بالغ

٦. ملخ إلى ٢ ملخ كولشيسين يومياً قد يزيد الطبيب الجرعة بزيارات **٠.٥ ملخ (١/٢ قرص)** إلى حد أقصى **٢ ملخ من الكولشيسين يومياً** اعتقاداً على الاستجابة السريرية والمخبرية

مثقل ملخ إلى **٢ ملخ / يوم من الكولشيسين (٢/١ قرص)** في جرعة واحدة أو جرعتين.

سيتم تكيف الجرعة حسب العمر والاستجابة السريرية. سيتم زيادة جرعة الكولشيسين من قبل الطبيب تدريجياً

علاجه التهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب **الإصابة الأولى** بها، وهذا تكرارها

بوصف الكولشيسين بالإضافة إلى الاشتراك مع الأدوية التقليدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الكورتيكoid)

الكتير يجب تحديد الجرعة لتتناسب وزن المريض

٧. تكون الجرعة ٠.٥ ملخ من الكولشيسين (١/٢ قرص) في اليوم الواحد بجرعة واحدة

٨. عة هي ٠.٥ ملجم من الكولشيسين بجرعتين (١/٢ قرص مرتبتين يومياً)

الذين يعانون من إلتهاب غشاء القلب الحاد مجهول السبب (الإصابة الأولى) بهذا الإلتهاب

LOT 200842

EXP 05/2022

PPV 13.40DH

لا تأخذ كولشيسين أوبوكالسيوم **١ ملخ قرص قابل للكسر**

- إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لل المادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، في الفقرة ١



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs du Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne,appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com



CHAIRMAN, VITABIOTICS

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace®

Vitabiotics
La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. La gamme comprend :

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

Cardioace®

Vitabiotics
la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poisssons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.



Ingrediënten: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, amidon de pommes & d'olide, Diluants: Cellulose microcristalline et Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintérigrant: Sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Sulfate de zinc, Vitamine D3, Transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, huile colloidale anhydre, Talc purifié, Maltodextrose, BHA, Éthylcellulose)

MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

- d'une excitation.
- Également disponible sous forme de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modéré.

Vitabiotics® wellwoman

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



La gamme complète de compléments alimentaires pour la santé et à répondre aux besoins spécifiques des femmes de leur style de vie.

Original capsules Formule contenant 24 éléments minéraux, l'ail et de l'huile de Bourrache qui apportent énergie, santé et une prise par jour.

Detoxifiant nettoyant en profondeur destiné à aider le processus d'oxydation de l'organisme.

50+ Un large éventail de nutriments incluant les esters de thé vert qui vont permettre de soutenir les fonctions de l'organisme pour les femmes de 50 ans et plus.

Sport Comprimés contenant du Prébiotique et des fibres d'inuline pour l'absorption et l'amélioration de la santé intestinale.

Effervescent pour les jours où votre organisme a le plus besoin

association avec Wellwoman Original.

wellman® Boisson énergisante à base de Canneberge et du jus de grenade.



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs du Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne,appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com



CHAIRMAN, VITABIOTICS

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace®

Vitabiotics
La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. La gamme comprend :

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

Cardioace®

Vitabiotics
la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poisssons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.



MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

- d'une excitation.
- Également disponible sous forme de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modérée.

Vitabiotics® wellwoman

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



La gamme complète de compléments alimentaires pour la santé et à répondre aux besoins spécifiques des femmes de leur style de vie.

Original capsules Formule contenant 24 éléments minéraux, l'ail et de l'huile de Bourrache qui apportent énergie, santé et une prise par jour.

Cleanse détoxifiant en profondeur destiné à aider le processus d'élimination de l'organisme.

50+ Un large éventail de nutriments incluant les esters de thé vert qui vont permettre de soutenir les fonctions de l'organisme pour les femmes de 50 ans et plus.

Sport Comprimés contenant du Prébiotique et des fibres d'inuline pour l'élimination d'énergie et l'amélioration de la santé intestinale.

Effervescent pour les jours où votre organisme a le plus besoin

association avec Wellwoman Original.

Boisson rafraîchissante à base de Canneberge et du jus de grenade.



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs du Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne,appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com



CHAIRMAN, VITABIOTICS

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace®

Vitabiotics
La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. La gamme comprend :

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

Cardioace®

Vitabiotics
la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poisssons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.



MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

- d'une excitation.
- Également disponible sous forme de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modérée.

Vitabiotics® wellwoman

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



La gamme complète de compléments alimentaires pour la santé et à répondre aux besoins spécifiques des femmes de leur style de vie.

Original capsules Formule contenant 24 éléments minéraux, l'ail et de l'huile de Bourrache qui apportent énergie, santé et une prise par jour.

Cleanse détoxifiant en profondeur destiné à aider le processus d'élimination de l'organisme.

50+ Un large éventail de nutriments incluant les esters de thé vert qui vont permettre de soutenir les fonctions de l'organisme pour les femmes de 50 ans et plus.

Sport Comprimés contenant du Prébiotique et des fibres d'inuline pour l'élimination d'énergie et l'amélioration de la santé intestinale.

Effervescent pour les jours où votre organisme a le plus besoin

association avec Wellwoman Original.

Boisson rafraîchissante à base de Canneberge et du jus de grenade.



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs du Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne,appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com



CHAIRMAN, VITABIOTICS

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace®

Vitabiotics
La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. La gamme comprend :

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

Cardioace®

Vitabiotics
la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poisssons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.



MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

- d'une excitation.
- Également disponible sous forme de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modérée.

Vitabiotics® wellwoman

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



La gamme complète de compléments alimentaires pour la santé et à répondre aux besoins spécifiques des femmes de leur style de vie.

Original capsules Formule contenant 24 éléments minéraux, l'ail et de l'huile de Bourrache qui apportent énergie, santé et une prise par jour.

Detoxifiant nettoyant en profondeur destiné à aider le processus d'oxydation de l'organisme.

50+ Un large éventail de nutriments incluant les esters de thé vert qui vont permettre de soutenir les fonctions de l'organisme pour les femmes de 50 ans et plus.

Sport Comprimés contenant du Prébiotique et des fibres d'inuline pour l'absorption et l'amélioration de la santé intestinale.

Effervescent pour les jours où votre organisme a le plus besoin

association avec Wellwoman Original.

wellman® Boisson énergisante à base de Canneberge et du jus de grenade.



FIBROCARD®

DENOMINATION :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

DCI :

Chlorhydrate de vérapamil.

COMPOSITION :

FIBROCARD 180 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 180 mg
Excipients q.s.p une gélule

FIBROCARD 240 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 240 mg
Excipients q.s.p une gélule

FORMES PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg de chlorhydrate de vérapamil.

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg de chlorhydrate de vérapamil.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antiangoreux-antagoniste du calcium.

INDICATIONS :

Le traitement de l'hypertension artérielle.

La forme orale n'est pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONTRE INDICATIONS :

Il est important d'exposer au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés, notamment un infarctus récent avec complications.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES :

Prévenir votre médecin traitant en cas de :

- prise simultanée d'autres médicaments,
- grossesse ou allaitement,
- maladie ancienne du cœur ou maladie du foie,
- mauvais fonctionnement des reins

INCOMPATIBILITÉS :

Aucune incompatibilité physico-chimique n'est connue à ce jour.


INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

Il faut avertir le médecin si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'at ou les troubles du rythme du cœur et de l'alpha-méthyldopa.

Si vous prenez d'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

La prudence est à conseiller pendant les 3 premiers mois.





FIBROCARD®

DENOMINATION :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

DCI :

Chlorhydrate de vérapamil.

COMPOSITION :

FIBROCARD 180 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 180 mg

Excipients q.s.p une gélule

FIBROCARD 240 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 240 mg

Excipients q.s.p une gélule

FORMES PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg de chlorhydrate de vérapamil.

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg de chlorhydrate de vérapamil.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antiangoreux-antagoniste du calcium.

INDICATIONS :

Le traitement de l'hypertension artérielle.

La forme orale n'est pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONTRE INDICATIONS :

Il est important d'exposer au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés, notamment un infarctus récent avec complications.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES :

Prévenir votre médecin traitant en cas de :

- prise simultanée d'autres médicaments,
- grossesse ou allaitement,
- maladie ancienne du cœur ou maladie du foie,
- mauvais fonctionnement des reins

INCOMPATIBILITÉS :

Aucune incompatibilité physico-chimique n'est connue à ce jour.


INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

Il faut avertir le médecin si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'at ou les troubles du rythme du cœur et de l'alpha-méthyldopa.

Si vous prenez d'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

La prudence est à conseiller pendant les 3 premiers mois.





FIBROCARD®

DENOMINATION :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

DCI :

Chlorhydrate de vérapamil.

COMPOSITION :

FIBROCARD 180 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 180 mg

Excipients q.s.p une gélule

FIBROCARD 240 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 240 mg

Excipients q.s.p une gélule

FORMES PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg de chlorhydrate de vérapamil.

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg de chlorhydrate de vérapamil.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antiangoreux-antagoniste du calcium.

INDICATIONS :

Le traitement de l'hypertension artérielle.

La forme orale n'est pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONTRE INDICATIONS :

Il est important d'exposer au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés, notamment un infarctus récent avec complications.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES :

Prévenir votre médecin traitant en cas de :

- prise simultanée d'autres médicaments,
- grossesse ou allaitement,
- maladie ancienne du cœur ou maladie du foie,
- mauvais fonctionnement des reins

INCOMPATIBILITÉS :

Aucune incompatibilité physico-chimique n'est connue à ce jour.


INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

Il faut avertir le médecin si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'at ou les troubles du rythme du cœur et de l'alpha-méthyldopa.

Si vous prenez d'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

La prudence est à conseiller pendant les 3 premiers mois.





FIBROCARD®

DENOMINATION :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

DCI :

Chlorhydrate de vérapamil.

COMPOSITION :

FIBROCARD 180 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 180 mg

Excipients q.s.p une gélule

FIBROCARD 240 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 240 mg

Excipients q.s.p une gélule

FORMES PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg de chlorhydrate de vérapamil.

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg de chlorhydrate de vérapamil.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antiangoreux-antagoniste du calcium.

INDICATIONS :

Le traitement de l'hypertension artérielle.

La forme orale n'est pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONTRE INDICATIONS :

Il est important d'exposer au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés, notamment un infarctus récent avec complications.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES :

Prévenir votre médecin traitant en cas de :

- prise simultanée d'autres médicaments,
- grossesse ou allaitement,
- maladie ancienne du cœur ou maladie du foie,
- mauvais fonctionnement des reins

INCOMPATIBILITÉS :

Aucune incompatibilité physico-chimique n'est connue à ce jour.


INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

Il faut avertir le médecin si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'at ou les troubles du rythme du cœur et de l'alpha-méthyldopa.

Si vous prenez d'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

La prudence est à conseiller pendant les 3 premiers mois.





FIBROCARD®

DENOMINATION :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

DCI :

Chlorhydrate de vérapamil.

COMPOSITION :

FIBROCARD 180 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 180 mg
Excipients q.s.p une gélule

FIBROCARD 240 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 240 mg
Excipients q.s.p une gélule

FORMES PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg de chlorhydrate de vérapamil.

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg de chlorhydrate de vérapamil.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antiangoreux-antagoniste du calcium.

INDICATIONS :

Le traitement de l'hypertension artérielle.

La forme orale n'est pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONTRE INDICATIONS :

Il est important d'exposer au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés, notamment un infarctus récent avec complications.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES :

Prévenir votre médecin traitant en cas de :

- prise simultanée d'autres médicaments,
- grossesse ou allaitement,
- maladie ancienne du cœur ou maladie du foie,
- mauvais fonctionnement des reins

INCOMPATIBILITÉS :

Aucune incompatibilité physico-chimique n'est connue à ce jour.


INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

Il faut avertir le médecin si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'at ou les troubles du rythme du cœur et de l'alpha-méthyldopa.

Si vous prenez d'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

La prudence est à conseiller pendant les 3 premiers mois.





FIBROCARD®

DENOMINATION :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

DCI :

Chlorhydrate de vérapamil.

COMPOSITION :

FIBROCARD 180 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 180 mg

Excipients q.s.p une gélule

FIBROCARD 240 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 240 mg

Excipients q.s.p une gélule

FORMES PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg de chlorhydrate de vérapamil.

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg de chlorhydrate de vérapamil.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antiangoreux-antagoniste du calcium.

INDICATIONS :

Le traitement de l'hypertension artérielle.

La forme orale n'est pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONTRE INDICATIONS :

Il est important d'exposer au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés, notamment un infarctus récent avec complications.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES :

Prévenir votre médecin traitant en cas de :

- prise simultanée d'autres médicaments,
- grossesse ou allaitement,
- maladie ancienne du cœur ou maladie du foie,
- mauvais fonctionnement des reins

INCOMPATIBILITÉS :

Aucune incompatibilité physico-chimique n'est connue à ce jour.


INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

Il faut avertir le médecin si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'at ou les troubles du rythme du cœur et de l'alpha-méthyldopa.

Si vous prenez d'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

La prudence est à conseiller pendant les 3 premiers mois.





FIBROCARD®

DENOMINATION :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

DCI :

Chlorhydrate de vérapamil.

COMPOSITION :

FIBROCARD 180 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 180 mg

Excipients q.s.p une gélule

FIBROCARD 240 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 240 mg

Excipients q.s.p une gélule

FORMES PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg de chlorhydrate de vérapamil.

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg de chlorhydrate de vérapamil.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antiangoreux-antagoniste du calcium.

INDICATIONS :

Le traitement de l'hypertension artérielle.

La forme orale n'est pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONTRE INDICATIONS :

Il est important d'exposer au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés, notamment un infarctus récent avec complications.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES :

Prévenir votre médecin traitant en cas de :

- prise simultanée d'autres médicaments,
- grossesse ou allaitement,
- maladie ancienne du cœur ou maladie du foie,
- mauvais fonctionnement des reins

INCOMPATIBILITÉS :

Aucune incompatibilité physico-chimique n'est connue à ce jour.


INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

Il faut avertir le médecin si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'at ou les troubles du rythme du cœur et de l'alpha-méthyldopa.

Si vous prenez d'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

La prudence est à conseiller pendant les 3 premiers mois.





FIBROCARD®

DENOMINATION :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

DCI :

Chlorhydrate de vérapamil.

COMPOSITION :

FIBROCARD 180 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 180 mg

Excipients q.s.p une gélule

FIBROCARD 240 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 240 mg

Excipients q.s.p une gélule

FORMES PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg de chlorhydrate de vérapamil.

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg de chlorhydrate de vérapamil.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antiangoreux-antagoniste du calcium.

INDICATIONS :

Le traitement de l'hypertension artérielle.

La forme orale n'est pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONTRE INDICATIONS :

Il est important d'exposer au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés, notamment un infarctus récent avec complications.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES :

Prévenir votre médecin traitant en cas de :

- prise simultanée d'autres médicaments,
- grossesse ou allaitement,
- maladie ancienne du cœur ou maladie du foie,
- mauvais fonctionnement des reins

INCOMPATIBILITÉS :

Aucune incompatibilité physico-chimique n'est connue à ce jour.


INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

Il faut avertir le médecin si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'autre médicaments ou les troubles du rythme du cœur et de l'alpha-méthyldopa.

Si vous prenez d'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

La prudence est à conseiller pendant les 3 premiers mois.





FIBROCARD®

DENOMINATION :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

DCI :

Chlorhydrate de vérapamil.

COMPOSITION :

FIBROCARD 180 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 180 mg

Excipients q.s.p une gélule

FIBROCARD 240 mg Gélules de minigranules à libération prolongée

Chlorhydrate de vérapamil 240 mg

Excipients q.s.p une gélule

FORMES PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRESENTATIONS :

FIBROCARD 180 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 180 mg de chlorhydrate de vérapamil.

FIBROCARD 240 mg Gélule de minigranules à libération prolongée

Boîte de 30 gélules contenant des minigranules à libération prolongée dosées à 240 mg de chlorhydrate de vérapamil.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antiangoreux-antagoniste du calcium.

INDICATIONS :

Le traitement de l'hypertension artérielle.

La forme orale n'est pas indiquée dans les troubles du rythme du cœur.

CONTRE INDICATIONS :

Il est important d'exposer au médecin prescripteur tous les troubles cardiaques présents et passés, notamment un infarctus récent avec complications.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES :

Prévenir votre médecin traitant en cas de :

- prise simultanée d'autres médicaments,
- grossesse ou allaitement,
- maladie ancienne du cœur ou maladie du foie,
- mauvais fonctionnement des reins

INCOMPATIBILITÉS :

Aucune incompatibilité physico-chimique n'est connue à ce jour.


INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS :

Il faut avertir le médecin si vous prenez en même temps que le FIBROCARD d'at ou les troubles du rythme du cœur et de l'alpha-méthyldopa.

Si vous prenez d'autres médicaments avertissez-en également votre médecin traitant.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT :

La prudence est à conseiller pendant les 3 premiers mois.



DOCTEUR Rachid LARAKI
MÉDECINE INTERNE

400 Bd Brahim Roudani -Maarif - 20330 - Casablanca - Maroc

Tél : 05 22 98 16 69 - Fax : 05 22 98 14 07 - Email : rlarak.iinterniste@gmail.com

M, Mme Soussi Sawsan
Casablanca le 18/01/2021

DYNAMAP

Sp = 99.

	SYST	MOY	DIAST	POULS
Bras droit	215	140	121	82
Bras gauche	170	127	91	85
2 mn				
4 mn				
6 mn				
Debout 1 mn	144	128	105	105
Debout 3 mn				

CONCLUSION : HTA

Sp = 99.

الدكتور رشيد لارaki
Dr Rachid LARAKI
M.D.
400 Bd Brahim Roudani
Casablanca
Tél : 05 22 98 16 69
Fax : 05 22 98 14 07
Email : rlarak.iinterniste@gmail.com

DOCTEUR RACHID LARAKI
MÉDECINE INTERNE

400 Bd Brahim Roudani -Maarif – 20330 – Casablanca- Maroc
Tél : 05 22 98 16 69 - Fax : 05 22 98 14 07 – Email :rlaraki.interniste@gmail.com

M. Mme

Casablanca le

Sous les Seal
18/01/2021

**EXAMEN DES URINES
A LA BANDELETTE**

UROBILINOGENE : ✓

GLUCOSE : ✓

BILIRUBINE : ✓

CETONES : ✓

DENSITE : 1020

SANG : ✓

PH : 6

PROTEINES : ✓

NITRITE : ✓

LEUCOCYTES : ✓

CONCLUSION :

Dr RACHID LARAKI
Casablanca

DOCTEUR RACHID LARAKI

Ancien Résident du Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris

Ancien Chef de Clinique à la Faculté de Paris VI (Pitié-Salpêtrière)

MÉDECINE INTERNE

Note d'honoraires

Mme Soussi Saida

Casablanca, le 18/01/2021

Acte	Montant
Consultation spécialisée en médecine interne	500,00 DH
Examen des urines bandelette Cybow 10	50,00 DH
Dynamap + SpO2	150,00 DH
Total	700,00 DH

Arrêtée la présente note d'honoraires à la somme de 700,00 DH (Sept cents dirhams)

الدكتور رشيد لارaki
Dr Rachid LARAKI
Médecin Interniste
Boulevard Brahim Roudani - 20330 Casablanca
Tél : 05 22 98 16 69 - Fax : 05 22 98 14 07 - Email : rlaraki.interniste@gmail.com
IF: 40701909 - INPE: 091092551- ICE: 001681227000058