

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ▪ Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| ▪ Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| ▪ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**60917**

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **11037**

Société : **RAM**

**Actif**

**Pensionné(e)**

**Autre**

Nom & Prénom :

**BEN MAKHLOUF LATILA**

Date de naissance :

**25-10-74**

Adresse :

**80, Lot HAMZA N°6 Sidi Maârouf Casablanca**

Tél. :

**0661 74 95 99**

Total des frais engagés :

Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**(AB)**

Date de consultation :

**04/02/2011**

Nom et prénom du malade :

**INES CHERKAUI**

Age : **26 ans**

Lien de parenté :

**Lui-même**

**Conjoint**

**Enfant**

Nature de la maladie :

**Bronchite**

**Virus**

**Rhume**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration et déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Casablanca**

Le : **04/02/2011**

Signature de l'adhérent(e) :

**ff**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/08/2011	c		KARTH	INP : 6911R163178
				

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien et du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Nouvelle - 131-03-2019 DI: SA TRIA V. 15161 Despouy - 131-03-2019	04/02/2021	2478

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

Docteur EL ATOUANI Hind

Médecine Générale

Diplômée de la Faculté de Médecine  
de Casablanca



الدكتورة العطوانى هند

الطب العام

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

Casablanca, le ..... 04/10/2024 الدار البيضاء، في

L'enfant INES CHERKAOUI

29/9  
KL → clarulan 500 mg N° 15  
JG x 30

31/9  
Lindan  
JG x 30

1/10  
Fibre infant  
JG x 30

31/10  
Peridys  
Idose de 1/2 + 3/4 la heure avant repas  
247.8

# CLAVULIN

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE

500 mg/62,50 mg

CLAVULIN

CLAVULI

CLAVULIN

## Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement la notice.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des doutes, consultez votre médecin.
- Ce médicament n'est jamais à prendre sans avis de votre médecin.
- Si l'un des effets secondaires mentionnés ci-dessous vous survient, parlez-en à votre médecin.

## Sommaire de la notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CLAVULIN ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CLAVULIN ?

3. COMMENT PRENDRE CLAVULIN ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER CLAVULIN ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE CLAVULIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

CLAVULIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactivés). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

### Indications thérapeutiques

CLAVULIN est utilisé chez les nourrissons et les enfants pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CLAVULIN ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications

#### Ne donnez jamais CLAVULIN à votre enfant :

- S'il est allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans CLAVULIN.
- S'il a déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- S'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.
- Ne donnez pas CLAVULIN à votre enfant s'il est dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.
- En cas de doute, demandez conseil à son médecin ou au pharmacien avant d'administrer CLAVULIN.

### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Faites attention avec CLAVULIN :

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant de lui administrer ce médicament s'il :

- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'administrer CLAVULIN à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent de CLAVULIN ou un autre médicament.

### Réactions nécessitant une attention particulière

CLAVULIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque votre enfant prend CLAVULIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

### Tests sanguins et urinaires

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière(ier) qu'il prend CLAVULIN. En effet, CLAVULIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

### Interactions avec d'autres médicaments

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si votre enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin.

# CLAVULIN

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE

500 mg/62,50 mg

CLAVULIN

CLAVULI

CLAVULIN

## Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement la notice.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des doutes, consultez votre médecin.
- Ce médicament n'est jamais à prendre sans avis de votre médecin.
- Si l'un des effets secondaires mentionnés ci-dessous vous survient, parlez-en à votre médecin.

## Sommaire de la notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CLAVULIN ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CLAVULIN ?

3. COMMENT PRENDRE CLAVULIN ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER CLAVULIN ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE CLAVULIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

CLAVULIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactivés). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

### Indications thérapeutiques

CLAVULIN est utilisé chez les nourrissons et les enfants pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CLAVULIN ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications

#### Ne donnez jamais CLAVULIN à votre enfant :

- S'il est allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans CLAVULIN.
- S'il a déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- S'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.
- Ne donnez pas CLAVULIN à votre enfant s'il est dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.
- En cas de doute, demandez conseil à son médecin ou au pharmacien avant d'administrer CLAVULIN.

### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Faites attention avec CLAVULIN :

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant de lui administrer ce médicament s'il :

- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'administrer CLAVULIN à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent de CLAVULIN ou un autre médicament.

### Réactions nécessitant une attention particulière

CLAVULIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque votre enfant prend CLAVULIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

### Tests sanguins et urinaires

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière(ier) qu'il prend CLAVULIN. En effet, CLAVULIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

### Interactions avec d'autres médicaments

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si votre enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin.

# FEBRE

# FEBRE

FEBREX® Enfant



6 118000 310617

PHARMED

LOT : 6894  
UT.AV: 11-22  
PPV: 19DH00

Sachets de granules

pour enfant de l'organisme.

**INDICATIONS :**

- Traitement de courte durée de la fièvre et de l'écoulement nasal au cours des rhumes et rhinopharyngites de l'enfant.

**CONTRE-INDICATIONS :**

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ** dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Insuffisance hépatocellulaire.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
- Adénome prostatique.
- Enfant de moins de 6 ans.
- Phénylcétoneurie en raison de la présence de l'aspartam.
- En raison de la présence du saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase isomaltase.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

En cas de fièvre élevée ou persistante, de survenue de signes de surinfection ou de persistance des symptômes au-delà de 3 jours, une réévaluation du traitement doit être faite.

**Mises en garde :**

- Le risque de dépendance essentiellement psychique n'apparaît que pour des posologies supérieures à celles recommandées et pour des traitements au long cours.
- Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.

**Précautions d'emploi :**

- L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs (barbituriques en particulier) qui potentialisent l'effet sédatif des antihistaminiques est à éviter pendant le traitement.
- Tenir compte, dans la ration journalière, de la teneur en saccharose en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :**

L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs est déconseillée pendant le traitement.

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT :**

En l'absence de données, par mesure de prudence, l'utilisation de ce médicament est à éviter en cas de grossesse ou d'allaitement.

**D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT**

Péridys



~~PERIND 1MG/ML  
SUSP BUV F200ML~~

P.P.V : 37DH10

10 of 10

5 118000 011255

## Romperiaone

1 mg/ml

## SUSPENSION BUVABLE

Où sont contenues cette notice :

1. Qu'est-ce que PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable ?  
quel cas est-il utilisé ?
  2. Comment prendre PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable ?
  3. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  4. Comment conserver PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable ?
  5. Informations supplémentaires

**1. QU'EST-CE QUE PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable  
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

**Ce médicament contient de la dompéridone, substance appartenant à la famille des antagonistes de la dopamine. Il agit sur la motricité intestinale.**

Ce médicament est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les nausées et les vomissements.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERIDYS 1 mg/ml suspension buvable?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucreS, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **Contre-indications**

**Ne prenez jamais PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable dans les cas suivants :**

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
  - si vous avez des saignements de l'estomac ou de l'intestin, une observation mécanique ou une perforation digestive ;
  - si vous souffrez d'un prolactinome (maladie de la glande hypophysaire) ;
  - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
  - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
  - si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur

ne peut pas pomper le sang da  
aussi bien qu'il le devrait (affec  
cardiaque) ;

- si vous avez un problème qui est ou de magnésium dans votre sang, certains médicaments et PER

UTE, IL EST IN  
RE MEDECIN C  
**et précautions**  
à médicament e  
ntolérance au f  
contient du soc  
ol par dose ad