

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothétique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Déclaration de Maladie

N° M20- 0004084

Optique

65050

Autres

caire

vé à l'adhérent(e)
A1608

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

AZZOUZI EL IDRISI MY TAHAR

Date de naissance :

1950

Adresse :

Rue Ahmed Kaddouri Ros Madia Im D Apt 18 Casablanca

Tél. : 0663082895

Total des frais engagés : 182,00 Dhs

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. I. SIBAI
CARDIOLOGUE
Angle 38, Bd Lalla Yacout et
1 Rue El Araij - Casablanca
Tél: 05 22 46 79 79 - 05 22 46 78 88

Date de consultation :

01 MARS 2021

Nom et prénom du malade :

TALEB ép AZZOUZI EL IDRISI AICHA

Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 13/03/2021

Signature de l'adhérent(e) :

MA

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01 MARS 2021				<p><i>[Signature]</i> DR. T. STIBAI CARDIOLOGIE Angle 38. Bd Lalla Yacout et T, Rue El Araar - Casablanca tel.: 02 22 46 79 79 - 05 22 46 78 90</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>[Signature]</i>	01/03/2021	482,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECU

Docteur Jamal SIBAI

CARDIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris

Explorations cardio-vasculaires

(ECG, Holter, Epreuve d'Effort,

Echo Cardiographie et Doppler Couleur)

الدكتور جمال السباعي

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

خريج كلية الطب بباريس

الفحص الآلي للقلب والشرايين

N° d'identification du praticien : 091129718 الرقم الوطني الإستدلالي :

Casablanca, le 01 MARS 2021

الدار البيضاء، في

J. SIBAI
CARDIOLOGUE
Angle 38 Bd. Lalla Yacout et
1, Rue El Araar - Casablanca
Tél.: 05 22 48 79 79 - 05 22 48 78 90

MME TALEB EP AZZOUZI EL IDRISI AICHA

REGIME SANS SEL

13150x3



STARVAL 80mg

1cp/j
Traitement de 3 mois

87,50 NEBILET 5mg



1/2cp/j

Traitement de 3 mois

T = 472,00

Dr. J. SIBAI
CARDIOLOGUE
Angle 38, Bd. Lalla Yacout et
1, Rue El Araar - Casablanca
Tél.: 05 22 48 79 79 - 05 22 48 78 90

زاوية 1، زنقة العرعار (كي لوساك سابقا) و 38 شارع للا ياقوت - عمارة بنسى - الطابق الأول - الدار البيضاء 20090
Angle 1, Rue El Araar (ex.Gay Lussac) et 38, Bd. Lalla Yacout - Imm.BMCI - 1^{er} Etage - Casablanca 20090

الهاتف : 05 22 48 79 79 / 05 22 48 78 90

Pour Prendre RDV appeler le : 06 22 180 812 لأخذ موعد اتصلوا ب :

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un inconvénient non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

1. DENOMINATION

STARVAL® 160 mg
STARVAL® 80 mg

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

STARVAL® 160 mg

La substance active est :

Valsartan..... 160 mg

STARVAL® 80 mg

La substance active est :

Valsartan..... 80 mg

Pour un comprimé pelliculé

Les autres composants :

Noyau (en commun) : Cellulose microcristalline, Crospovidone, colloïdale anhydre, Stéarate de magnésium, Amidon prégalatinisé, purifié.

Pelliculage : Opadry 03G52389 Jaune (pour STARVAL® 80 mg), Opadry 03G54386 Rose (pour STARVAL® 160 mg)

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente en boîtes de 14 & 28 comprimés pelliculés.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antagonistes de l'angiotensine II, non associés (code ATC : C09CA03).

5. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

STARVAL®, comprimé pelliculé, peut être utilisé pour trois affections différentes:

• Pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes, les enfants et les adolescents âgés de 6 à 18 ans. L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition de ces pathologies.

• Pour le traitement de patients adultes ayant récemment subi une crise cardiaque (infarctus du myocarde). « Récemment » signifie ici entre 12 heures et 10 jours.

• Pour traiter les patients adultes atteints d'insuffisance cardiaque symptomatique. STARVAL®, comprimé pelliculé, est utilisé lorsqu'une famille de médicaments appelés les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) (médicaments utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque) ne peut être utilisée ou bien peut être administré en plus des IEC quand d'autres médicaments ne peuvent pas être utilisés pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque comporte les symptômes suivants : souffle court et gonflement des pieds et des jambes par accumulation de liquide. Elle survient lorsque le muscle cardiaque ne parvient pas à pomper suffisamment de sang pour fournir la quantité de sang nécessaire à l'organisme.

6. POSOLOGIE & MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin afin d'obtenir les meilleurs résultats et réduire le risque d'effets indésirables. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ne remarquent souvent aucun signe de la présence de cette maladie. La plupart des personnes peuvent se sentir plutôt normales. C'est pourquoi il est d'autant plus important que vous respectiez les rendez-vous avec le médecin, même si vous vous sentez bien.

- **Hypertension artérielle chez les patients adultes:** La dose recommandée est de 80 mg par jour. Dans certains cas, votre médecin peut prescrire des doses plus fortes (ex. 160 mg ou 320 mg). Il pourrait également associer STARVAL®, comprimé pelliculé, à un autre médicament (ex. un

PPV :

131 DH 50

Lot n° :

Exp. :

a (âges de 6 à 18 ans)
soitogie habituelle est de 40

gic habituelle est de 80 mg

prescrire des doses plus
mg et jusqu'à un maximum

patients adultes:

inégalement débuté dès la
Votre médecin augmentera
ines suivantes jusqu'à une
dose finale dépend de votre

à avec un autre traitement de
quel traitement est approprié

but(s):

mg, deux fois par jour. Votre

dose à cours des semaines

suivantes jusqu'à une dose maximale de 160 mg, deux fois par jour. La dose finale dépend de votre tolérance individuelle.

STARVAL®, comprimé pelliculé peut être donné avec un autre traitement de l'insuffisance cardiaque si votre médecin décidera que ce traitement est approprié dans votre cas.

Si vous avez pris plus de STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû

Si vous avez des sensations vertigineuses sévères et/ou des événements, consultez immédiatement votre médecin et allongez-vous. Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés, consultez votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, ne prenez pas la dose oubliée si le moment de votre prochaine prise est proche.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé

L'arrêt de votre traitement par STARVAL® peut entraîner une aggravation de votre maladie. N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre STARVAL®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments. Prenez STARVAL®, comprimé pelliculé avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Prenez STARVAL®, comprimé pelliculé à peu près au même moment tous les jours.

7. CONTRE-INDICATION

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

• si vous êtes allergique (hypersensible) au Valsartan ou à l'un des autres

composants contenus dans STARVAL®, comprimé pelliculé,

• si vous avez une maladie grave du foie,

• si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter

de prendre STARVAL® en début de grossesse).

• si vous souffrez de diabète ou d'insulino-résistance ou d'un antihypertenseur appelé Aliskiren. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

8. EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut entraîner des effets indésirables, mais ils sont rarement graves.

Certains effets indésirables peuvent être de nature à nécessiter une interruption temporaire ou permanente de la prise médicale immédiate ;
En cas de symptômes d'angoisse-audition tels que :

• gonflement du visage, des lèvres, des paupières et des mains,

- difficultés à respirer ou à avaler,
- urticaire, démangeaisons.

Si vous ressentez l'un de ces symptômes immédiatement votre médecin (voire votre pharmacien) et/ou employeur. Mises en garde spéciales

Autres effets indésirables :
Frequent (peut affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- sensations vertigineuses,
- pression artérielle basse accompagnée de sensations vertigineuses et des sensations d'engourdissements,
- fonction rénale diminuée (signes d'urine foncée).

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :
• angio-oedème (voir rubrique « Certains effets indésirables »),

- perte de connaissance soudaine (syncope),
- sensation de tête qui tourne (vertige),
- importante diminution de la fonction rénale (œdème aigu de la jambe),

- spasmes musculaires, anomalies d'hyperkaliémie),
- essoufflement, difficulté à respirer pieds ou des jambes (signes d'insuffisance cardiaque),

- céphalées,
- toux,
- douleurs abdominales,

- nausée,
- diarrhée,
- fatigue,
- faiblesse.

Fréquence indéterminée (la fréquence donnée n'est pas disponible) :

- apparition de cloques sur la peau (syndrome de Stevens Johnson),
- réactions allergiques avec éruption cutanée, symptômes de fièvre, gonflement des yeux, douleur musculaire, gonflement des articulations, symptômes grippaux peuvent survenir.

- taches violacées à rougettes, d'inflammation des vaisseaux sanguins (angio-oedème),

- saignements ou ecchymoses inhabituels, douleurs musculaires (maladie de rhabdomysie),

- fièvre, mal de gorge ou aphtes causés par le virus de l'herpès simplex, taux faible de globules blancs, éhémolyse et diminution du taux d'hémoglobine et de sang (ce qui peut, dans des cas sévères, entraîner mort subite),

- augmentation du taux de potassium sérique, provoquer des spasmes musculaires (hypertonie),

- augmentation des valeurs de la fonction hépatique y compris une augmentation de la transaminase sérique (peau et des yeux),

- augmentation du taux d'urée sanguine (peau et des yeux),

- augmentation des valeurs de la fonction rénale (peau et des yeux),

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un inconvénient non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

1. DENOMINATION

STARVAL® 160 mg
STARVAL® 80 mg

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

STARVAL® 160 mg

La substance active est :

Valsartan..... 160 mg

STARVAL® 80 mg

La substance active est :

Valsartan..... 80 mg

Pour un comprimé pelliculé

Les autres composants :

Noyau (en commun) : Cellulose microcristalline, Crospovidone, colloïdale anhydre, Stéarate de magnésium, Amidon prégalatinisé, purifié.

Pelliculage : Opadry 03G52389 Jaune (pour STARVAL® 80 mg), Opadry 03G54386 Rose (pour STARVAL® 160 mg)

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente en boîtes de 14 & 28 comprimés pelliculés.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antagonistes de l'angiotensine II, non associés (code ATC : C09CA03).

5. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

STARVAL®, comprimé pelliculé, peut être utilisé pour trois affections différentes:

• Pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes, les enfants et les adolescents âgés de 6 à 18 ans. L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition de ces pathologies.

• Pour le traitement de patients adultes ayant récemment subi une crise cardiaque (infarctus du myocarde). « Récemment » signifie ici entre 12 heures et 10 jours.

• Pour traiter les patients adultes atteints d'insuffisance cardiaque symptomatique. STARVAL®, comprimé pelliculé, est utilisé lorsqu'une famille de médicaments appelés les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) (médicaments utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque) ne peut être utilisée ou bien peut être administré en plus des IEC quand d'autres médicaments ne peuvent pas être utilisés pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque comporte les symptômes suivants : souffle court et gonflement des pieds et des jambes par accumulation de liquide. Elle survient lorsque le muscle cardiaque ne parvient pas à pomper suffisamment de sang pour fournir la quantité de sang nécessaire à l'organisme.

6. POSOLOGIE & MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin afin d'obtenir les meilleurs résultats et réduire le risque d'effets indésirables. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ne remarquent souvent aucun signe de la présence de cette maladie. La plupart des personnes peuvent se sentir plutôt normales. C'est pourquoi il est d'autant plus important que vous respectiez les rendez-vous avec le médecin, même si vous vous sentez bien.

- **Hypertension artérielle chez les patients adultes:** La dose recommandée est de 80 mg par jour. Dans certains cas, votre médecin peut prescrire des doses plus fortes (ex. 160 mg ou 320 mg). Il pourrait également associer STARVAL®, comprimé pelliculé, à un autre médicament (ex. un

PPV :

131 DH 50

Lot n° :

Exp. :

a (âges de 6 à 18 ans)
soitogie habituelle est de 40

gic habituelle est de 80 mg

prescrire des doses plus
mg et jusqu'à un maximum

patients adultes:

inégalement débuté dès la
Votre médecin augmentera
ines suivantes jusqu'à une
dose finale dépend de votre

à avec un autre traitement de
quel traitement est approprié

but(s):

mg, deux fois par jour. Votre

dose à cours des semaines

suivantes jusqu'à une dose maximale de 160 mg, deux fois par jour. La dose finale dépend de votre tolérance individuelle.

STARVAL®, comprimé pelliculé peut être donné avec un autre traitement de l'insuffisance cardiaque si votre médecin décidera que ce traitement est approprié dans votre cas.

Si vous avez pris plus de STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû

Si vous avez des sensations vertigineuses sévères et/ou des événements, consultez immédiatement votre médecin et allongez-vous. Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés, consultez votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, ne prenez pas la dose oubliée si le moment de votre prochaine prise est proche.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé

L'arrêt de votre traitement par STARVAL® peut entraîner une aggravation de votre maladie. N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre STARVAL®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments. Prenez STARVAL®, comprimé pelliculé avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Prenez STARVAL®, comprimé pelliculé à peu près au même moment tous les jours.

7. CONTRE-INDICATION

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

• si vous êtes allergique (hypersensible) au Valsartan ou à l'un des autres

composants contenus dans STARVAL®, comprimé pelliculé,

• si vous avez une maladie grave du foie,

• si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter

de prendre STARVAL® en début de grossesse).

• si vous souffrez de diabète ou d'insulino-résistance ou d'un antihypertenseur appelé Aliskiren. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

8. EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut entraîner des effets indésirables, mais ils sont rarement graves.

Certains effets indésirables peuvent être de nature à nécessiter une interruption temporaire ou permanente de la prise médicale immédiate ;
En cas de symptômes d'angoisse-audition tels que :

• gonflement du visage, des lèvres, des paupières et des mains,

- difficultés à respirer ou à avaler,
- urticaire, démangeaisons.

Si vous ressentez l'un de ces symptômes immédiatement votre médecin (voire votre pharmacien) et/ou employeur. Mises en garde spéciales

Autres effets indésirables :

Frequent (peut affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- sensations vertigineuses,
- pression artérielle basse accompagnée de sensations vertigineuses et des sensations d'engourdissements,
- fonction rénale diminuée (signes d'urine foncée).

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• angio-oedème (voir rubrique « Certains effets indésirables »),

- perte de connaissance soudaine (syncope),
- sensation de tête qui tourne (vertige),
- importante diminution de la fonction rénale (œdème),
- spasmes musculaires, anomalies d'hyperkaliémie,
- essoufflement, difficulté à respirer pieds ou jambes (signes d'insuffisance cardiaque),

• céphalées,

- toux,
- douleurs abdominales,
- nausées,
- diarrhée,
- fatigue,
- faiblesse.

Fréquence indéterminée (la fréquence donnée n'est pas disponible) :

• apparition de cloques sur la peau (syndrome de Stevens Johnson),

- réactions allergiques avec éruption cutanée, symptômes de fièvre, gonflement des yeux, douleur musculaire, gonflement des articulations, symptômes grippaux peuvent survenir.

• taches violacées à rougettes, inflammation des vaisseaux sanguins (angio-oedème),

- saignements ou ecchymoses inhabituelles,
- douleurs musculaires (maladie de rhabdomysie),
- fièvre, mal de gorge ou aphtes causés par le virus de l'herpès simplex, tache faible de globules blancs, érythème et diminution du taux d'hémoglobine et de sang (ce qui peut, dans des cas sévères, entraîner une insuffisance cardiaque),

• augmentation du taux de potassium sérique, provoquer des spasmes musculaires (hypertonie),

- augmentation des valeurs de la fonction hépatique y compris une augmentation du taux de bilirubine dans des cas sévères, peau et des yeux),

• augmentation des valeurs de la fonction rénale (augmentation du taux d'urée sanguine et/ou de créatinine),

- augmentation de la tension artérielle (hypertension),

• augmentation des valeurs de la fonction rénale (augmentation du taux d'urée sanguine et/ou de créatinine),

- augmentation de la tension artérielle (hypertension),

• augmentation des valeurs de la fonction rénale (augmentation du taux d'urée sanguine et/ou de créatinine),

- augmentation de la tension artérielle (hypertension),

• augmentation des valeurs de la fonction rénale (augmentation du taux d'urée sanguine et/ou de créatinine),

- augmentation de la tension artérielle (hypertension),

• augmentation des valeurs de la fonction rénale (augmentation du taux d'urée sanguine et/ou de créatinine),

- augmentation de la tension artérielle (hypertension),

• augmentation des valeurs de la fonction rénale (augmentation du taux d'urée sanguine et/ou de créatinine),

- augmentation de la tension artérielle (hypertension),

• augmentation des valeurs de la fonction rénale (augmentation du taux d'urée sanguine et/ou de créatinine),

- augmentation de la tension artérielle (hypertension),

• augmentation des valeurs de la fonction rénale (augmentation du taux d'urée sanguine et/ou de créatinine),

- augmentation de la tension artérielle (hypertension),

NEBILET® 5 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autre, même en cas de identiques, cela pourrait lui être néfaste.

NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

La substance active est :

Nébivolol

Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg pour un comprimé quadrisécable

Les autres composants sont :

Poly sorbate 80, hypromellose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrisécable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

Ne prenez jamais NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable dans les cas suivants :

- Allergie au nébivolol ou à l'un des constituants de ce médicament.
- Insuffisance hépatique (*du foie*) ou altération de la fonction hépatique.
- Grossesse ou allaitement (cf. rubriques Grossesse et Allaitement).
- Insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique ou dé compensation de l'insuffisance cardiaque.
- Certains troubles de la conduction cardiaque (blocs auriculo-ventriculaires des 2ème et 3ème degrés sans pace-maker, bloc sino-auriculaire).
- Asthme ou problèmes respiratoires sévères (actuels ou passés).
- Phéochromocytome non traité (*atteinte de la glande surrénale provoquant une hypertension artérielle sévère*).
- Acidose métabolique.
- Bradycardie (rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute) ou rythme cardiaque irrégulier (*mala die du si nus*).
- Hypotension (pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg).

Troubles sévères de la circulation sanguine

(un médicament protecteur utilisé dans le traitement du cancer);

Médicaments pour traiter un excès d'acidité dans l'estomac ou les ulcères (médicament antiacide), par exemple la cimétidine ; NEBILET 5 mg doit être pris pendant les repas et l'antiacide entre les repas.

L'utilisation de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf à votre médecin.

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés O

PPV 87DH50

PRENDRE NEBILET 5 mg, quadrisécable ?

également d'un comprimé par jour.

âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie est de 1/2 comprimé par jour.

L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, puis 5 mg (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines selon la prescription de votre médecin, et enfin à 10 mg (2 comprimés en une prise) par jour.

La posologie maximale recommandée est de 10 mg une fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

Les comprimés peuvent être pris pendant les repas.

L'initiation du traitement et les augmentations successives de la dose doivent être réalisées par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

Si votre médecin vous a prescrit 1/4 de comprimé ou 1/2 comprimé une fois par jour, NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable doit être cassé comme indiqué ci-après :

Pour obtenir 1/2 comprimé, tenir le comprimé - face présentant les barres de sécabilité vers le haut - entre le pouce et l'index de chacune des mains, puis appliquer une pression vers le bas avec les pouces, le long d'une des barres de sécabilité (voir le dessin). Pour obtenir 1/4 de comprimé, recommencer la même opération à partir d'1/2 comprimé.

