

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

ND: 13768

**Déclaration de Maladie : N° P19-0017117**

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2761 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TANANI BOUCHAIR Date de naissance : 01.01.1975

Adresse : C. a. p ECHABAB N° 14 BERRCHID

Tél. : 06 27 75 03 62 Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 9.12.19 Nom et prénom du malade : A-TANANI WIAD Age : 17

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Neuvalgodynsthésie après fracture 3 doigt

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Signature de l'adhérent(e) :



#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
9/12/19	5		300 M	Dr Saïd RAMY RHUMATOLOGUE 33, Rue Omar BENJOUR Casablanca Tél: 0522.26.68.78

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Réf.	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Mosquée Riad Dr. Sihem TAMIR N° 12 Mosquée Riad Riad (A coté du Star Sport) Béchar Tél: 05 22 33 63 22		05/12/19	389,80

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
<i>LOCAMED SERVICE MATERIEL MEDICAL</i> <i>Vente en Magasin Ville de Casablanca Quartier des Hopitaux Casablanca 02-27-05-224444</i>	09-12-19					780,20 DH


#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la date et l'heure de l'examen et l'événement en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'OD.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION




O.D.F  
PROTHÉSES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**DOCTEUR SAÏD RAMY****Spécialiste**

Diplômé de la faculté de Médecine de Clermont

Ferrand (France)

Ancien interne et assistant des Hôpitaux  
de FranceEnseignant à la haute Ecole  
de Kinésithérapie (H.E.K)**Rhumatalogue**Maladie des Os, Articulations, Muscles et  
Colonnes vertébrales  
Radiologie Osseuse**دكتور سعيد الراسي****(اختصاصي)**

خريج كلية للطب بالجامعة نيراث فرنسا

طبيب ماهر سابق مستشفى فرنسيا

لماه بالجامعة العليا

للترخيص الطبي

**أمراض الروماتيزم**

النظام العائلي، العضلات

المعدة للمرأة والرجل

للفحص بالأشعة

Casablanca, le 9/12/119

N° TANANJI WI A7

19360

Fosavance 5600 mg / semaine  
31u-h avant le péril de fer

4330

- Abacina 15mg : 1ap le m' au

milieu du repas 20 f

8600 mg / 20 : 1ap 1 f

- Prost 20 : 1ap 1 f

56,30 - D-cine : 1ap 118 f

4 ap/f

\_\_\_\_\_

T, 389, 80

**Dr. Saïd RAMY**  
**RHUMATOLOGUE**  
39, Rue Omar Slaoui Casablanca  
Tél: 0522.26.68.78

GSM: 0661 42 78 23

0522 26 68 78 زفقة عمر السلاوي الطابق الثاني رقم 6 المركز التجاري ترقية الدار البيضاء - الهاتف :

39, Rue Omar Slaoui 2 ème étage N°6 Centre Commercial Taofik - Casablanca - Tél/Fax : 05 22 26 68 78

E-mail : saidram@hotmail.fr

الراسي  
Dr. Siham TAMIR  
N°: 1-2 Mosquée Riad  
Pharmacie Riad  
Dr. Siham Mosque Riad  
Tel / Fax: 05 22 33 68 22  
Riad (Ancien) du Stade Sportif) Bencheir

**DOCTEUR SAÏD RAMY**  
**Spécialiste**

Diplômé de la faculté de Médecine de Clermont  
Ferrand (France)

Ancien interne et assistant des Hôpitaux  
de France

Enseignant à la haute Ecole  
de Kinésithérapie (H.E.K)

**Rhumatalogue**

Maladie des Os, Articulations, Muscles et  
Colones vertébrale  
Radiologie Osseuse



**الدكتور سعيد الرامي**  
**اختصاصي**

خريج كلية الطب بلجيكوست نيلز فرنسا

طبيب معنٍ سابقاً مستشفى فرنسا

أستاذ بالجامعة العليا

للتربية الطبية

**أمراض الروماتيزم**

المفاصيل، التضليلات

العمرو المفقر والرجل

الشخص بالأشعة

Casablanca, le 9/12/11 B.

^ TANAN i wi A9

Attelle articulée montée sur  
chausseur.

780,00 DT

**LOCAMED SERVICE**  
**MATERIEL MEDICAL**

Vente en Magasin  
Non valide pour toute transaction  
46, Rue des Hôpitaux, Quartier des Hôpitaux  
Casablanca  
TEL: 05 22 47 57 - 05 22 47 58

**Dr. Saïd RAMY**  
**RHUMATOLOGUE**  
39, Rue Omar Slaoui Casablanca  
Tél: 05 22 26 68 78

GSM : 0661 42 78 23

39 زنقة عمر السلاوي الطابق الثاني رقم 6 المركز التجاري ترقق الدار البيضاء - الهاتف : 0522 26 68 78

39, Rue Omar Slaoui 2 ème étage N°6 Centre Commercial Taofik - Casablanca - Tél/Fax : 05 22 26 68 78

E-mail : saidram@hotmail.fr



# FOSAVANCE® 70 mg/5 600 U

Acide alendronique/colécalcique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
3. Comment prendre FOSAVANCE
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver FOSAVANCE
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé ?

### Qu'est-ce que FOSAVANCE ?

FOSAVANCE est un comprimé contenant deux substances actives, l'acide alendronique (communément appelé alendronate) et le colécalciférol connu sous le nom de vitamine D3.

### Qu'est-ce que l'alendronate ?

L'alendronate appartient à une classe de médicaments non hormonaux appelés bisphosphonates. L'alendronate prévient la perte osseuse qui survient chez les femmes ménopausées, et aide la reconstruction de l'os. Il réduit le risque de fractures vertébrales et de la hanche.

### Qu'est-ce que la vitamine D ?

La vitamine D est un nutriment indispensable, nécessaire à l'absorption du calcium et au bon état des os. L'absorption du calcium provenant des aliments ne peut se faire correctement par l'organisme qu'en présence d'une quantité suffisante de vitamine D. Très peu d'aliments contiennent de la vitamine D. La source principale est l'exposition au soleil estival, permettant la production de vitamine D dans la peau. En vieillissant, la peau fabrique moins de vitamine D. Une quantité insuffisante de vitamine D peut entraîner une perte osseuse et une ostéoporose. Un déficit sévère en vitamine D peut provoquer une faiblesse musculaire qui peut entraîner des chutes et un plus grand risque de fractures.

### Pourquoi FOSAVANCE est-il utilisé ?

Votre médecin vous a prescrit FOSAVANCE pour traiter votre ostéoporose et parce que vous présentez un risque d'insuffisance en vitamine D. Il réduit le risque de fractures de la colonne vertébrale et de la hanche chez la femme après la ménopause.

### Qu'est-ce que l'ostéoporose ?

L'ostéoporose est caractérisée par une diminution de la densité et une fragilisation des os. Elle se produit fréquemment chez les femmes après la ménopause. À la ménopause, les ovaires arrêtent leur production d'hormones féminines, les estrogènes qui aident les femmes à conserver leur squelette sain. Il en résulte une perte osseuse et les os deviennent fragiles. Plus une femme est ménopausée tôt, plus le risque d'ostéoporose est grand.

Au début, l'ostéoporose n'entraîne généralement aucun symptôme. Cependant, si l'ostéoporose n'est pas traitée, des fractures peuvent survenir. Bien que celles-ci fassent mal la plupart du temps, les fractures osseuses vertébrales peuvent passer inaperçues jusqu'à ce qu'elles entraînent une diminution de la taille. Les fractures peuvent survenir lors des activités normales, quotidiennes telles que porter quelque chose, ou à la suite d'un traumatisme léger qui normalement ne provoquerait pas de fracture de l'os. Les fractures surviennent généralement au niveau de la hanche, des vertèbres ou du poignet, et peuvent non seulement provoquer des douleurs mais peuvent aussi entraîner des problèmes considérables tels qu'une posture bloquée (« bosse de la douairière »), et une perte de mobilité.

# ALOXIA® 7,5 mg, comprimé et comprimé sécable Méloxicam

43,90

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce  
avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALOXIA, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?
3. COMMENT PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALOXIA, COMPRIMÉ ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE ALOXIA, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALOXIA, comprimé contient une substance active dénommée méloxicam. Le méloxicam appartient à un groupe de médicaments appelés anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS), qui sont utilisés pour réduire l'inflammation et la douleur dans les articulations et les muscles.

ALOXIA, comprimé est utilisé dans :

- le traitement de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose,
- le traitement de longue durée :
- de la polyarthrite rhumatoïde,
- de la spondylarthrite ankylosante (également appelée maladie de Bechterew)

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais ALOXIA, comprimé dans les cas suivants :

- pendant le 3<sup>ème</sup> trimestre de grossesse,
- enfants et adolescents de moins de 16 ans,
- allergie (hypersensibilité) au méloxicam,
- allergie (hypersensibilité) à l'aspirine ou à d'autres médicaments anti-inflammatoires (AINS),
- allergie (hypersensibilité) à l'un des composants de Aloxia (voir rubrique 6 «Informations supplémentaires» pour la liste des autres composants),
- si vous avez présenté l'un des signes suivants après avoir pris de l'aspirine ou d'autres AINS :
- respiration sifflante, oppression respiratoire, difficulté à respirer (asthme),
- obstruction nasale due à des petits renflements de la muqueuse nasale (polypes nasaux),
- éruptions cutanées / urticaire,
- gonflement soudain des tissus sous la peau et les muqueuses, tel qu'un gonflement autour des yeux, du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge, rendant éventuellement la respiration difficile (œdème de Quincke),
- si vous avez déjà présenté, après un traitement avec des AINS :
- un saignement de l'estomac ou des intestins,

Aloxia® 15 mg  
10 comprimés sécables



6 118000 022756

sanguins (anticoagulants),  
Les : • médicaments qui désagrègent une l' (thrombolytiques),  
infarctus : • médicaments pour traiter les risques : • corticostéroïdes (médicaments élevés) l'inflammation et les réactions Ne pas : • ciclosporine - utilisée après traiter la polyarthrite rhumatoïde ou la comp. : • médicaments diurétiques. Votre médecin peut être amené à facteur : • médicaments utilisés pour traiter discut. : • exemple les bêta-bloquants), pharm. : • lithium - utilisé pour traiter le • inhibiteurs sélectifs de la rec. : • utilisés dans le traitement de l' (hyperthyroïdie), • méthotrexate - utilisé pour traiter les affections cutanées sévères et rhumatoïde active, : • cholestyramine - utilisée pour : • si vous êtes une femme qui avec un dispositif intra-utérin (DIU). Arêtez : EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ VOTRE PHARMACIEN.

vous re : selles et Grossesse (provoquant En cas de découverte d'une g ALOXIA par ALOXIA, vous devez en ALOXIA. En cas de nécessité, votre m exemple prescrire, de façon limitée, ce vous devrez prendre les premiers mois de votre grossesse ALOXIA. Au cours des 3 derniers mois, vous devez en aucun cas prendre ou si vous avez des conséquences graves po effets cardiopulmonaires et r

Précautions : Comme il est important d'allaitement prendre A La prise de ce produit n'est pas antécédent d'allaitement. d'inflammation : Demandez conseil à votre m affection devant de prendre tout médicament hémorragique. Conduite de véhicules et u : Des troubles visuels, une so maladie du : (étourdissements) ou d'autre nerf central peuvent surtaux élevé : ne conduisez pas ou n'utilisez volume : produire si Informations importantes été brûlé, ou de ALOXIA, Comprimé d'apport insuffisant. Ce produit contient du lactose que vous présentez une intolérance

# Prazol® 20

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Si une autre personne prend ce médicament en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez quelque chose de suspect dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Prazol® 20 mg  
omeprazole

28 gélules



6 118000 041009

PPV : 96DH 0

PER : 03/22

LOT : I1717-2

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol® 20 mg :

Oméprazole (DCI) .....

Excipients qsp .....

## FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastrorésistants.

- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

## COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

- Maladie ulcéreuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours.

Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

- Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :





ICE : 001526686000016  
FACTURE N°: UF9132149

CASABLANCA Le, 09/12/19

DEPOT HOPITAUX

Agent commercial : ILYASSE

Mode de règlement : CB/4442

ICE CLIENT :  
INP CLIENT :  
N° CLIENT : CL000009  
Clients Comptoirs Hopitaux  
MLLE TANANI WIAM

Code Article	Code TVA	Désignation	Qté	P.U.TTC	Remise	P.U.net. TTC	Montant TTC
U83022C1	2	ATTELLE ARTICULEE MONTEE SUR CHAUSSURE WALKER ROM COURT TS	1,00	780,00	0%	780,00	780,00

LOCAMED SERVICE  
 MATERIEL MEDICAL  
 Vente en Magasin  
 On valide pour toute autre  
 6, Rue des Hôpitaux, Quartier des Hôpitaux  
 Casablanca - Maroc  
 Tel: 05 22 47 42 70 / 05 22 47 42 71

Code	Base	Taux	Montant
2	650,00	20%	130,00
<b>Total</b>	<b>650,00</b>		<b>130,00</b>

**Total HT** 650,00  
**Total TVA** 130,00  
**Total TTC** 780,00

Arrêtée la présente Facture à la somme de TTC :  
Sept cent quatre-vingts Dirhams

Call Center 05 37 63 27 28 / 05 22 86 22 22 - info@locamed.ma - www.locamed.ma

LOCAMED SERVICE S.A.R.L AU CAPITAL 17.800.000 DHS - C.N.S.S : 2445642 - R.C. : 30269 - Patente : 25103476 - I.F. : 3315150

Siège Social : 11, rue Mamounia [ex CTM] - Rabat Siège Administratif : Angle Av. Med VI et Av. El Haouz - Rabat - Maroc

Tél. : 05 37 63 08 07 / 05 37 63 26 00 - Fax : 05 37 63 00 86 - ICE : 001526686000016 - info@locamed.ma - www.locamed.ma

**CASABLANCA**  
Arjoun: 7, rue Lahcen Arjoun [face hôpital 20 Août], quartier des Hôpitaux.  
Tél : 05 22 86 39 89 / 05 22 86 16 83 / 05 22 86 37 17.

Ghandi: 60, Boulevard Ghandi, quartier Essalam Tél : 05 22 94 20 43 / 05 22 86 22 22

Goulmima: 627, rue Goulmima Casa-Anfa [à proximité hôpital My Youssef] Tél : 05 22 20 20 98 / 05 22 20 21 04

Hôpitaux: 46, rue des hôpitaux. Tél : 05 22 47 63 70 / 05 22 47 48 30

**RABAT** Zaers: Angle Av. Mohamed VI et Av El Haouz Tél : 05 37 63 27 28 / 05 37 63 26 05  
Mamounia: 11, rue Mamounia, [ex CTM] centre ville. Tél : 05 37 70 40 40 / 05 37 70 00 77

**MARRAKECH** Avenue, Yaacoub el Mansour N° 2 Résidence Ahlam Guéliz [près de centre Américain] Tél : 05 24 43 15 00 / 05 24 43 14 30  
6, résidence Saghina 2, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah Quartier Iberia, Tanger Tél : 05 39 33 55 40 / 05 39 37 23 67

**TANGER** Angle Av des FAR et rue Ahmed Chbibi [en face de central banque chabib] Tél : 05 35 62 51 62 / 05 35 62 51 61

**FÈS** Angle Avenue Ahmed Diori et Avenue Moulay Abderrahmane Tél : 05 37 36 74 28 / 05 37 37 74 75

**KÉNITRA**