

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS



Déclaration de Maladie

N° W19-503381

14098

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'engagement préalable est exigé pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Reéducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

☐ Maladie

☐ Dentaire

CH

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 12327

Société

RAM

☒ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom

MDAGHRI FILALI MOUNIR

Date de naissance

02/09/1985

Adresse

RD AL FIR DAODS GHES A44 APPT 22 OULFA

Tél.

0661087775


Total des frais engagés

706,5

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin



Date de consultation

23.12.19

Nom et prénom du malade

MDAGHRI FILALI

Age

RAYHAN

Lien de parenté

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☒ Enfant

Nature de la maladie

Ben Sulphon + Vase Whan

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 25/12/2019

Signature de l'adhérent(e) :

[Handwritten signature]

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : 14, rue Abdelhak Ben Abdellah - Casablanca - Maroc
Tél : 05 22 22 22 22 - Fax : 05 22 22 22 22 - Email : contact@mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/12/15	C2	1	212	INP 091138659

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	22/12/15	456,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOILET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.				
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement caninaires, ainsi que le bilan de l'O.D.F.				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
				COEFFICIENT DES TRAVAUX []
				MONTANTS DES SOINS []
				DATE DE L'EXECUTION []
				INP DE L'EXECUTION []
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 41433552 00000000 G B 00000000 35533411			COEFFICIENT DES TRAVAUX []
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la prothèse			MONTANTS DES SOINS []
				DATE DU DEVIS []
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur YSSEF Boujemaa

PEDIATRE

Diplômé de la Faculté de Médecine
de Grenoble

Echographie

Lauréat de la Faculté
de Médecine de Montpellier

D.U. Pédiatrie en Maternité
Faculté de Médecine Paris-Sud

190, Rue Mostafa El Maâni. Casablanca

الدكتور يسف بوجمعة

اختصاصي في أمراض الأطفال والرضع

خريج كلية الطب باكرنويل

الفحص بالصدى

خريج ممتاز من كلية الطب بمونبولي

طب الطفل عند الولادة

كلية الطب - باريس

190، زنقة مصطفى المعاني. الدار البيضاء

Tél. Cabinet { 05 22 20 72 10 }
 { 05 22 22 01 46 } هاتف العيادة
 { 05 22 22 21 48 }

GSM : 06 68 79 27 94 : المتنقل

Sur rendez-vous بالموعد

Casablanca, le 13.12.19 في الدار البيضاء،

MD AGRI- FILALI RAYAN

PHARMACIE PRINCIPALE
Mohamed SALIMBAR
Pharmacie
Rond Point 2000 Casablanca
Tél : 05 22 22 72 10 - 05 22 22 01 46
CNSS : 118164 - IF : 5300002 - 000000000000000000
ICE N° : 001897771000000000
INPE : 0920400261

17.12

Doct



8/6A 8' 0 > 38

439

456



Docteur YSSEF Boujemaa
190, Rue Mostafa El Maâni
CASABLANCA

Doli®

PARACETAMOL

PPV 17 DH 50
PER 06/22
LOT 11528

17,50

COMPOSITION

Paracétamol 3 g

Excipients : macrogol 6000, solution de saccharose, saccharine sodique, acide sorbique (E 200), parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E 219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E 217), arôme caramel vanille, eau purifiée q.s.p. 100 ml de soluté buvable.

FORME PHARMACEUTIQUE

Soluté buvable, flacon de 90 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antalgique, antipyrétique.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de **douleur et/ou fièvre** telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Cette présentation est réservée à l'enfant de 3 à 30 kg (environ de la naissance à 10 ans); lire attentivement la rubrique «Posologie». Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

ATTENTION!

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

Ce médicament **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol ou à l'un des autres constituants,
- Maladie grave du foie.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre posologie).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

- En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sucre : 0,167 g de sucre par graduation de 1 kg figurant sur le système doseur.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Signalez que votre enfant prend ce médicament si votre médecin prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Sucre (saccharose) : 0,167 g de sucre par graduation de 1 kg figurant sur la seringue par administration orale).



el organismo durante un largo tiempo, y finalmente puede dañar el hígado.

provocada por virus que afectan los nervios. Puede dar lugar a la parálisis de los músculos que controlan la

(a menudo denominada simplemente Hib) son infecciones (inflamación de las membranas que envuelven el cerebro o la médula espinal). La infección puede causar dificultad para tragar y respirar, almorranas, la piel, los huesos y

proporcionada

lados si son causadas por las

medicaciones con síntomas similares.

y no puede provocar ninguna de

las por otros tipos de Hemofilia.

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

patitis causada por otros agentes como

3. Cómo usar HEXAXIM

HEXAXIM se le administrará a su hijo por un médico o enfermero debidamente capacitado y que estén equipados para reaccionar ante cualquier reacción alérgica grave poco frecuente (ver sección 4 "Posibles efectos adversos").

Se administrará por inyección en un músculo (vía intramuscular) en la parte superior del brazo. La vacuna nunca debe aplicarse en un vaso sanguíneo. La técnica de administración es la siguiente:

Vacunación (vacunación primaria)
Las inyecciones administradas en un intervalo de dos meses o tres meses (esta vacuna debe administrarse a los niños).

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Después de la última dosis del primer ciclo de vacunación, su hijo recibirá una dosis de refuerzo.

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1.

Aln sebâ Casablanca

HEXAXIM 0.5ML 1F 2AIG

P.P.V: 439.00 DH

082063

5118001

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, esta vacuna puede producir efectos adversos, algunos de los cuales pueden ser graves.

Reacciones alérgicas graves (reacción anafiláctica)
Si cualquiera de estos síntomas ocurre después de abandonar el lugar donde su hijo recibió la vacuna, consulte a su médico inmediatamente:

- dificultad para respirar
- coloración azulada de la lengua o los labios
- erupción
- hinchazón de la cara o la garganta
- malestar repentino y grave con caída de tensión arterial que causa mareos y pérdida de conciencia asociado con trastornos respiratorios.

Cuando estos signos y síntomas (signos y síntomas de reacción anafiláctica) se presenten rápidamente tras la administración de la inyección y mientras el niño todavía está en la clínica del médico.

La posibilidad de que ocurran reacciones alérgicas graves tras recibir esta vacuna es rara (de cada 1.000 personas).

Otros efectos adversos

Si su hijo experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos, consulte a su médico:

- Efectos adversos muy frecuentes (podrían afectar a más de 1 de cada 10 personas) son:
 - pérdida del apetito (anorexia)
 - llanto
 - adormecimiento (somnolencia)
 - vómitos
 - dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de inyección
 - irritabilidad
 - fiebre (temperatura de 38 °C o más)
- Efectos adversos frecuentes (podrían afectar hasta 1 de cada 10 personas) son:
 - llanto anormal (llanto prolongado)
 - diarrea
 - endurecimiento en el lugar de inyección (induración)
- Efectos adversos poco frecuentes (podrían afectar hasta 1 de cada 100 personas) son:
 - reacción alérgica
 - nódulo en el lugar de inyección
 - fiebre (temperatura de 39,6 °C o más)
- Efectos adversos raros (podrían afectar hasta 1 de cada 1.000 personas) son:
 - erupción
 - reacciones extensas en el lugar de inyección (mayores de 5 cm), incluyendo hinchazón que se extiende desde el lugar de la inyección hasta más allá de una o ambas articulaciones
 - comienzan en las 24-72 horas posteriores a la vacunación, pueden estar asociadas con sensibilidad o dolor en el lugar de la inyección y remiten en 3 a 5 días sin necesidad de tratamiento
 - ataques (convulsiones) con o sin fiebre.
- Efectos adversos muy raros (podrían afectar hasta 1 de cada 10.000 personas) son:
 - episodios en los que su hijo entra en un estado similar al shock o se pone pálido
 - período de tiempo (reacciones hipotónicas o episodios de hipotonia-hiporreflexia)

Efectos adversos potenciales

Se han comunicado ocasionalmente otros efectos adversos no mencionados anteriormente que incluyen:

- Se ha notificado después de la administración de vacunas que contienen tetanos, los nervios que provocan dolor, parálisis y trastornos en la sensibilidad (Síndrome de Guillain-Barré) o disminución de la movilidad en el brazo y hombro (neuritis braquial).
- Se ha notificado después de la administración de vacunas que contienen el antígeno de los nervios que provocan trastornos sensoriales o debilidad de los brazos y/o piernas, parálisis facial, trastornos visuales, oscurecimiento o pérdida repentina de la visión (inflamación del cerebro y la médula espinal) (desmielinización del sistema nervioso central).
- Hinchazón o inflamación del cerebro (encefalopatía/encefalitis).
- En los niños nacidos muy prematuramente (a las 28 semanas de gestación o antes) se han observado respiraciones más largas de lo normal durante 2-3 días después de la vacunación.

B, es posible que una infección no idéntica a la hepatitis B. En dichos casos, es posible que la vacuna no evite la infección por

la vacuna HEXAXIM no protege al 100% de los niños vacunados.

Administre HEXAXIM a su hijo

Para su hijo, es importante que informe a su médico o enfermero de cualquier reacción adversa o efecto secundario.

Si hay algo que no entiende, consulte a su médico.

Después de la administración de la vacuna, su hijo puede experimentar

de la cara (reacción anafiláctica) tras la administración de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.

En la sección 6, se describen los efectos adversos de la vacuna.