

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Thérapie :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Reclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3078 Société : NB = 30769

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Bouyounis A bdelaziz

Date de naissance : 30/09/1947

Adresse : Résidence ottadamous Rue 6 n 64 El oufia

Tél. : 0650394134 Total des frais engagés : 1748,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. BENNIS Khalid
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE
Rés. Mawlid 4 angle Bd Abdelloumen
et Bd Anoual Casablanca
Tél. 05 22 98 41 10

Date de consultation : 23/08/2020 Nom et prénom du malade : Bouhanda (Maha) Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : anophase biliaire II ane

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/06/2020	consult	at	2000	DR. BENJAMIN KHAN
23/06/2020	consult	at	2000	HERATO - ANTRC - CHIRURGICAL PROCTOLOGIE MEDICO 4 Avenue Bd. Abdellatif 883. Mezouid 4 Avenue Bd. Abdellatif 10 Bd. Anoual Casablanca Tel 05 22 98 41 18

• EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>HARMONIE SAINT-JOSEPH 140, av. de l'Étang de Cergy 95000 Cergy Tél. : 01 34 55 70 00</i>	28/06/06	1384,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

ctionnel. Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'

Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Échographie Abdominale - Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

الدكتور بن尼斯 خالد

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والبواسير

خريج كلية الطب بأنجور وباريس

شهادة التشخيص بالمنظار الباطني (باريس)

شهادة التشخيص في أمراض وجراحة المخرج (باريس)

عضو الجمعية الفرنسية في أمراض المخرج والمصارين

عضو الجمعية الفرنسية في الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, le

23/06/2020

65. 20.9

S mirror .

Brahima Khadidj

11/2 gr jeu min

1/4 gr jeu min

Duphalac

racine - 31;

^ 6ans

122.45.45

32.200.9

138.488

Seroplex

15

^ 6ans

N = 2453

300

RESIDENCE AL MAWLID 4
140 Lot S. A. R. S. A. R. A. N. C. A.
Km 10, Route Côtier 111.
Q1 Zenata Ain sebaa Casablanca
05.22.98.41.16

Dr. BENNIS Khalid
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE
Rés. Mawlid 4
et Bd. An
Tél:

Maphar
Km 10, Route Côtier 111.
Q1 Zenata Ain sebaa Casablanca
Seroplex 10mg cp sec b28
P.P.V : 240,00 DH

6 116001 184989

Maphar
Km 10, Route Côtier 111.
Q1 Zenata Ain sebaa Casablanca
Seroplex 10mg cp sec b28
P.P.V : 240,00 DH

Maphar
Km 10, Route Côtier 111.
Q1 Zenata Ain sebaa Casablanca
Seroplex 10mg cp sec b28
P.P.V : 240,00 DH

الموعد : 05.22.98.41.16 - راية شارع عبد المؤمن وشارع أنوال - الطابق الثاني شقة رقم "241" - الدار البيضاء - الهاتف :

Résidence "AL Mawlid 4 " Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual 2e Etage "A 24" - CASABLANCA - Tél. : 05.22.98.41.16

Duphalac

66,5% Lactulose

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après plusieurs jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?
3. Comment prendre DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : DUPHALAC contient un laxatif appelé lactulose. Il rend les selles molles et plus faciles à éliminer, en attirant l'eau dans l'intestin. Il n'est pas absorbé dans votre corps.

- DUPHALAC est utilisé pour traiter la constipation (selles peu fréquentes, dures et sèches) en rendant les selles molles.
- DUPHALAC est utilisé dans le traitement de

l'encéphalopathie provoquant une tremblements, pouvant aller jusqu'à 6. 2. QUELLES CONNAÎTRE 66,5 POUR CENT

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

Cas particulier
Chez l'enfant, mesures d'hygiène d'utilisation d'infantiles, et adjonction

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

sur des t de lait étale,

Si votre médecine sucre, contactez-moi. Ne prenez jamais buvable en flacon :
• si vous êtes à d'autres compléments mentionnés ;
• en cas de poussées, ;
• en cas d'ordures ;
• en cas de ;
• en cas de indéterminé

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

certains ertains ution

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

de

DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

s ou en ration ; de cause

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

de la

Avertissements
Adressez-vous à votre pharmacien pour prendre DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon.

**DANS LES
D'UTILISATION
JOURS**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

t de buvable en

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

ts

Constipation
Elle peut être liée à d'autres causes. Elle peut être liée à d'autres causes.

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

aidé en quée par le compagnie : faire

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

plus ité de la dose

Constipation
Elle peut être liée à d'autres causes. Elle peut être liée à d'autres causes.

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

aidé en quée par le compagnie : faire

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

oubles

Constipation
Elle peut être liée à d'autres causes. Elle peut être liée à d'autres causes.

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

aidé en quée par le compagnie : faire

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

stiques

Constipation
Elle peut être liée à d'autres causes. Elle peut être liée à d'autres causes.

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

aidé en quée par le compagnie : faire

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

le

Constipation
Elle peut être liée à d'autres causes. Elle peut être liée à d'autres causes.

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

aidé en quée par le compagnie : faire

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

iron 1,5

Constipation
Elle peut être liée à d'autres causes. Elle peut être liée à d'autres causes.

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

aidé en quée par le compagnie : faire

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

mar

Constipation
Elle peut être liée à d'autres causes. Elle peut être liée à d'autres causes.

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

aidé en quée par le compagnie : faire

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

mar

Constipation
Elle peut être liée à d'autres causes. Elle peut être liée à d'autres causes.

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

aidé en quée par le compagnie : faire

**DUPHALAC 66,5%
SOL BUV 200 ML**
P.P.V : 45DH40
6 118000 010494

mar

PPV

Exp

N° Lot

20,00

n'y a pas de res
ou boire.

Grossesse et allaitement

DUPHALAC peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

DUPHALAC n'a pas d'influence sur une influence négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon contient certains sucres.

DUPHALAC peut contenir de petites quantités de sucre du lait (lactose), de galactose, d'épilactose ou de fructose (voir section Précautions d'emploi).

3. COMMENT PRENDRE DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Constipation :

Ce médicament peut être administré en une prise par jour, par exemple au petit déjeuner ou en deux prises par jour.

Après quelques jours, en fonction de votre réponse au traitement, la dose d'attaque peut être ajustée pour atteindre la dose d'entretien. Plusieurs jours (2 à 3) peuvent être nécessaires avant que le traitement n'agisse.

La posologie moyenne :

Enfants et nourrissons

Nourrissons de 0 à 12 mois : jusqu'à 5 ml par jour

Enfants de 1 à 6 ans : 5 à 10 ml par jour

Enfants de 7 à 14 ans :

- Traitement d'attaque : 15 ml par jour.
- Traitement d'entretien : 10 ml par jour.

Adultes et adolescents

- Traitement d'attaque : 15 à 45 ml par jour.
- Traitement d'entretien : 10 à 25 ml par jour.

Si une diarrhée se manifeste, diminuer la posologie.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Chez le nourrisson et l'enfant, la prescription de DUPHALAC doit être exceptionnelle car elle peut entraîner le fonctionnement normal du réflexe d'exonération.

PPV

Exp

N° Lot

20,00

Ne pas consulter pour une prescription et sans surveillance
étroite.

Chez le patient âgé et le patient atteint d'insuffisance rénale ou hépatique, aucune adaptation posologique n'est nécessaire car l'exposition au lactulose est négligeable.

Encéphalopathie hépatique

Dans tous les cas, la dose idéale est celle qui conduit à deux selles molles par jour.

Utilisation chez les adultes : la posologie moyenne est de 15 à 30 ml, 3 fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents : aucune donnée n'est disponible pour le traitement des enfants (des nouveaux nés jusqu'à 18 ans) atteints d'une encéphalopathie hépatique.

Mode d'administration

Voie orale.

Prenez les doses chaque jour, aux mêmes moments.

Avez le médicament rapidement, sans le conserver dans votre bouche.

DUPHALAC 66,5 POUR CENT peut être pris pur ou dilué dans une boisson.

Durée de traitement

La durée du traitement varie en fonction de la symptomatologie.

Si vous avez pris plus de DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage, des diarrhées ou des douleurs abdominales peuvent apparaître.

Si vous avez pris plus de DUPHALAC que vous n'auriez dû, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés :

- Très fréquents (ils affectent plus d'1 personne sur 10 utilisant ce médicament)
 - diarrhées.
- Fréquents (ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 utilisant ce médicament)
 - flatulence (ballonnement),
 - nausées,

PPV

Exp

N° Lot

20,00

20,00

sur ce méd

- déséquilibre électrolytique provoqué par la diarrhée. Des ballonnements peuvent survenir en début de traitement en général ils cessent après quelques jours.

Lorsque des doses supérieures à la posologie recommandée sont utilisées, des douleurs abdominales et des diarrhées peuvent apparaître.

Si des doses élevées sont administrées pendant une période prolongée (habituellement en cas d'encéphalopathie hépatique), un déséquilibre électrolytique peut apparaître fait de la diarrhée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration. En signalant les effets indésirables, vous contribuez davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver à une température ne dépassant 25°C, mettre au réfrigérateur (risque de cristallisation).

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou aux ordures ménagères. Demandez à votre pharmacie les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon

- La substance active est : Lactulose 66,5 g
Sous forme de lactulose liquide.

Pour 100 ml de solution

Qu'est-ce que DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable incolore à jaune brunâtre, visqueuse et limpide.

Ce médicament est disponible en flacon de 200 ml.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 19/09/2017

PPV

Exp

N° Lot

20,00

PPV

Exp

N° Lot

PPV

Exp

N° Lot

20,00

20,00

sur ce méd

- déséquilibre électrolytique provoqué par la diarrhée. Des ballonnements peuvent survenir en début de traitement en général ils cessent après quelques jours.

Lorsque des doses supérieures à la posologie recommandée sont utilisées, des douleurs abdominales et des diarrhées peuvent apparaître.

Si des doses élevées sont administrées pendant une période prolongée (habituellement en cas d'encéphalopathie hépatique), un déséquilibre électrolytique peut apparaître fait de la diarrhée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver à une température ne dépassant 25°C, mettre au réfrigérateur (risque de cristallisation).

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou aux ordures ménagères. Demandez à votre pharmacie les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon

- La substance active est : Lactulose 66,5 g
Sous forme de lactulose liquide.

Pour 100 ml de solution

Qu'est-ce que DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable incolore à jaune brunâtre, visqueuse et limpide.

Ce médicament est disponible en flacon de 200 ml.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 19/09/2017

PPV

Exp

N° Lot

20,00

20,00

sur ce méd

- déséquilibre électrolytique provoqué par la diarrhée. Des ballonnements peuvent survenir en début de traitement en général ils cessent après quelques jours.

Lorsque des doses supérieures à la posologie recommandée sont utilisées, des douleurs abdominales et des diarrhées peuvent apparaître.

Si des doses élevées sont administrées pendant une période prolongée (habituellement en cas d'encéphalopathie hépatique), un déséquilibre électrolytique peut apparaître fait de la diarrhée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver à une température ne dépassant 25°C, mettre au réfrigérateur (risque de cristallisation).

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou aux ordures ménagères. Demandez à votre pharmacie les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon

- La substance active est : Lactulose 66,5 g
Sous forme de lactulose liquide.

Pour 100 ml de solution

Qu'est-ce que DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable incolore à jaune brunâtre, visqueuse et limpide.

Ce médicament est disponible en flacon de 200 ml.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 19/09/2017

PPV

Exp

N° Lot

20,00

20,00

sur ce méd

- déséquilibre électrolytique provoqué par la diarrhée. Des ballonnements peuvent survenir en début de traitement en général ils cessent après quelques jours.

Lorsque des doses supérieures à la posologie recommandée sont utilisées, des douleurs abdominales et des diarrhées peuvent apparaître.

Si des doses élevées sont administrées pendant une période prolongée (habituellement en cas d'encéphalopathie hépatique), un déséquilibre électrolytique peut apparaître fait de la diarrhée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver à une température ne dépassant 25°C, mettre au réfrigérateur (risque de cristallisation).

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou aux ordures ménagères. Demandez à votre pharmacie les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon

- La substance active est : Lactulose 66,5 g
Sous forme de lactulose liquide.

Pour 100 ml de solution

Qu'est-ce que DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable incolore à jaune brunâtre, visqueuse et limpide.

Ce médicament est disponible en flacon de 200 ml.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 19/09/2017

PPV

Exp

N° Lot

20,00

20,00

sur ce méd

- déséquilibre électrolytique provoqué par la diarrhée. Des ballonnements peuvent survenir en début de traitement en général ils cessent après quelques jours.

Lorsque des doses supérieures à la posologie recommandée sont utilisées, des douleurs abdominales et des diarrhées peuvent apparaître.

Si des doses élevées sont administrées pendant une période prolongée (habituellement en cas d'encéphalopathie hépatique), un déséquilibre électrolytique peut apparaître fait de la diarrhée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver à une température ne dépassant 25°C, mettre au réfrigérateur (risque de cristallisation).

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou aux ordures ménagères. Demandez à votre pharmacie les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon

- La substance active est : Lactulose 66,5 g
Sous forme de lactulose liquide.

Pour 100 ml de solution

Qu'est-ce que DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable incolore à jaune brunâtre, visqueuse et limpide.

Ce médicament est disponible en flacon de 200 ml.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 19/09/2017

PPV

Exp

N° Lot

20,00

20,00

sur ce méd

- déséquilibre électrolytique provoqué par la diarrhée. Des ballonnements peuvent survenir en début de traitement en général ils cessent après quelques jours.

Lorsque des doses supérieures à la posologie recommandée sont utilisées, des douleurs abdominales et des diarrhées peuvent apparaître.

Si des doses élevées sont administrées pendant une période prolongée (habituellement en cas d'encéphalopathie hépatique), un déséquilibre électrolytique peut apparaître fait de la diarrhée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver à une température ne dépassant 25°C, mettre au réfrigérateur (risque de cristallisation).

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou aux ordures ménagères. Demandez à votre pharmacie les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon

- La substance active est : Lactulose 66,5 g
Sous forme de lactulose liquide.

Pour 100 ml de solution

Qu'est-ce que DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable incolore à jaune brunâtre, visqueuse et limpide.

Ce médicament est disponible en flacon de 200 ml.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 19/09/2017

PPV

Exp

N° Lot

20,00

20,00

sur ce méd

- déséquilibre électrolytique provoqué par la diarrhée. Des ballonnements peuvent survenir en début de traitement en général ils cessent après quelques jours.

Lorsque des doses supérieures à la posologie recommandée sont utilisées, des douleurs abdominales et des diarrhées peuvent apparaître.

Si des doses élevées sont administrées pendant une période prolongée (habituellement en cas d'encéphalopathie hépatique), un déséquilibre électrolytique peut apparaître fait de la diarrhée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver à une température ne dépassant 25°C, mettre au réfrigérateur (risque de cristallisation).

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou aux ordures ménagères. Demandez à votre pharmacie les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger

DOCTEUR BENNIS KHALID

SPECIALISTE en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplômé d'Echographie Abdominale Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale Paris (St Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

23/06/2020

BOUHMIDA Khadija

Clinique

CIRRHOSIS BILIAIRE SECONDAIRE SOUS TTT. FATIGUE IMPORTANTE SANS DOULEURS ABDOMINALES. ATCD DE CHOLECYSTECTOMIE.

Examen

Foie de taille normale (FH= 12 cm), d'échostructure hyperéchogène et homogène et de contours réguliers. Absence d'ascite.

Dilatation importante localisée des VBIH. Absence d'ascite. Absence de cholangiocarcinome.

TP vu partiellement et semble thrombosé. VBP fine (2 mm).

Vésicule biliaire absente (cholécystectomisée).

Pancreas semble normal et homogène dans sa totalité.

Rate homogène, de taille normale (grand axe de 10 cm).

Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles.

Vessie et utérus normaux.

Conclusion

CHOLECYSTECTOMISEE. THROMBOSE PARTIELLE DU TRONC PORTE.

FOIE DE STEATOSE SANS GREFFE CHOLANGIOPANCREATIQUE.

DILATATION IMPORTANTE LOCALISEE DES VBIH SEQUELLAIRE.

Dr. BENNIS Khalid
HEPATO GASTRO ENDOLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE
Rés Mawlid 4 Angle Bd. Abdelmoumen
et Bd. Anoual 2ème étage Appart. "A24" - Casablanca
Tél 05 22 98 41 16

Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Echographie Abdominale - paris

Diplômé de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

Casablanca, le

23/06/2020

Souhni da
khalid

Facture

2 200,-
(2200,-) 630

Dr. BENNIS Khalid
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE
Rés. Mawlid 4 angle Bd. Abdelmoumen
et Bd. Anoual Casablanca
Tél 05.22.98.41.16

Résidence " AL Mawlid 4 " Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual
2eme Etage " A24 " - CASABLANCA - Tél. : 05.22.98.41.16