

Déclaration de Maladie

Nº P19- 0033459

ND: 30704
 Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 671 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : KAALLAD ABDESELAM

Date de naissance : 01/01/1948

Adresse : Rue hadj en msemeh immeuble 5 A, marif.
Casablanca

Tél : 0619 908683 Total des frais engagés : _____ Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

AL Amal
Centre de Néphrologie Dialyse
127 Bd. Victor Hugo - Casablanca
Tél: 0522 80 20 01 - Fax: 05 22 88 34 35



Date de consultation : 15/05/2020

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Age :
 Enfant

Nature de la maladie : Maladie dentaire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____ Le : _____ / _____ / _____

Signature de l'adhérent(e) : al Amal

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/05/2020	3		300 DH	<p><i>AL Amal</i> <i>Centre de Néphrologie Dialyse</i> <i>127 Bd Victor Hugo - Casablanca</i> <i>Tel: 0522 80 2001 Fax: 0522 83 34 35</i></p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Centre de Néphrologie Dialyse</i> <i>127 Bd Victor Hugo - Casablanca</i> <i>Tel: 0522 80 2001 Fax: 0522 83 34 35</i>	22/05/2020	196,30

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Centre de Néphrologie Dialyse</i> <i>127 Bd Victor Hugo - Casablanca</i> <i>Tel: 0522 80 2001 Fax: 0522 83 34 35</i>	16/05/2020	270+	900 DH
	18/05/2020	31080 + tlc	1476,20

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

Al Amal

Centre de Néphrologie - Dialyse
Adulte et pédiatrique



الاعمال

مركز أمراض الكلية وتصفية الدم
كبار ونفط

Professeur Amal Bourquia
Néphrologie - Dialyse

Mr ABDERPAUL
Khaled

22/05/2020

F.TRENKA

Lot: 3542A
EXP: 06.2024
PV: 91.000HS

91,00

91,00

③ en sel 3m

1kg x 3 / jour

52,80

② oedés 20 kg

2 sel / jour

32,00

③ No - 50g

1kg x 2 / jour

21,40

④ Li Rmax

1kg x 2 / jour

196,30



AL Amal
Centre de Néphrologie Dialyse
127 Bd. Victor Hugo - Casablanca
Tel: 0522 80 20 01 - Fax: 0522 83 34 35

127, Boulevard Victor Hugo - Casablanca - Consultation Tél. : 05 22 80 20 01

Fax : 05 22 83 34 35 - Email : amal.bourquia@gmail.com



AL AMAL

الأمل

مركز أمراض الكلى و تصفية الدم للكبار و الصغار
Centre des Maladies Rénale et Dialyse Adulte et Pédiatrique

بروفيسور أمال بورقية
أمراض الكلى و تصفية الدم

Professeur Amal BOURQUIA

Néphrologie - Dialyse

Ordonnance

Khalida AB. Deslaml.

- Di-Indo 50 mg effut/5 x 30
 vitanev 500 mg s.p. matin.
 28.8.23

- Zan Flug 500 mg s.p.
 24.8.23

- Shengy 500 mg s.p. a boire
 13.0.23

-
 126.80

Le
 Pharmacie du CEDRE

N.P.E. 092017342
 14.07.2022
 Dr. Bourquin et associés
 Centre de dialyse et maladies rénales
 Casablanca

mg :
 L'at :
 r.jour :
 01/2023 PPC 84,70
 médicamente

AL AMAL CENTRE DES MALADIES RENALE
 ET DIALYSE ADULTE & PEDIATRIQUE
 PROFESSEUR AMAL BOURQUIA
 Tél. 0522 83 34 35

Signature :



127, Boulevard Victor Hugo - Casablanca

Consultation Tel. : 05 22 80 20 01 - Dialyse Tel. : 05 22 83 34 35 - Fax. : 05 22 83 34 35

Email : amal.bourquia@gmail.com - Site Web : www. amalbourquia.com

RC : 410599 - ICE : 00208391800003 - IF : 25291487 - Parente : 34450197 - CNSS : 2601294

VITANEVRIL FORT 100 mg

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quiconque d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et eau purifiée..... qsp un comprimé
Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du bêtré-béti.
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polynévrites.
- proposé, dans d'autres polynévrites supposées d'origine toxicotensive.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

- Durée du traitement :

se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.
 - Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HESITEZ PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GÉNANT.

PPV
D 1
En
mè
SYN
sucr
en l
VOT
EXCI
Sac
Parlo
EN O
FTR

88,80

ARTICULIERES
onhydrate, ce
u fructose, de
à de déficit en
L'AVIS DE

si vous aviez une intolérance au fructose.
NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitemt : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

11. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITE A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet.

12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Sans objet.

13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

14. MENTION, SI NECESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC
20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam
Roches Noires
20300 Casablanca
Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

ستيروجيل 15 هـ "00

محلول للحقن عبر العضلة في إرغوكلاسيفير

LOT: 190036
EXP: 06/2024
PPU: 13,000H

- المرجو قراءة محتوى هذه النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء
فهي تحتوى على معلومات هامة تتعلق بعلاجك.
- إن كانت لديك أسئلة أخرى أو إن كان لديك شك، اطلب مزيداً من المعلومات من طبيبك أو من صيدليك.
 - احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى إعادة قرائتها.
 - إذا كنت تحتاج لمزيد من المعلومات أو النصائح، استشر صيدليك.
 - إذا أصبحت الأعراض خطيرة أو ظلت مستمرة، استشر طبيبك.
 - إذا لاحظت تأثيرات غير مرغوب فيها غير مذكورة في هذه النشرة أو شعرت بأحد التأثيرات غير المرغوب فيها الخطيرة المذكورة في هذه النشرة أخبر طبيبك أو صيدليك.

في هذه النشرة:

1. ما هو ستيروجيل 15 هـ "000 600 و دا.5 مل. محلول للحقن عبر العضلة في أمبولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ستيروجيل 15 هـ "000 600 و دا.5 مل، محلول للحقن عبر العضلة في أمبولة؟
3. كيف يجب استعمال ستيروجيل 15 هـ "000 600 و دا.5 مل. محلول للحقن عبر العضلة في أمبولة؟
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يجب حفظ ستيروجيل 15 هـ "000 600 و دا.5 مل. محلول للحقن عبر العضلة في أمبولة؟
6. معلومات إضافية.

1. ما هو ستيروجيل 15 هـ "000 600 و دا.5 مل. محلول للحقن عبر العضلة في أمبولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟
- فيتامين د. (أ: الجهاز الهضمي والإستقلابي).

هذا الدواء يحتوى على الفيتامين د الذي تسمح بتنبيه الكالسيوم في العظام.

يستخدم هذا الدواء في العلاج والوقاية من حالات النقص في الفيتامين د عند الشخص البالغ.

3. كيف يجب
استعمال
محلول للحقن
الجرعات:
خاص بالبالغ
هذا المقدار

LOT 191188
EXP 04/2022
PPV 52.80 DH

20 mg

résistants en gélules

notice avant de prendre ce médicament.
oïn de la relire.
ez un doute, demandez plus d'informations

à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DÉNOMINATION DU MEDICAMENT :

OEDES® 20 mg

COMPOSITION :

Chaque gélule contient 20mg de substance active : oméprazole.

Excipients : qsp 1 gélule.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :

Microgranules gastro-résistants en gélules. Disponibles en boîtes de 7, 14, 28 et 56

CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THÉRAPEUTIQUE :

Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule contient une substance appelée oméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications :

Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcèreuse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- œsophagite érosive ou ulcérale symptomatique par reflux gastro-œsophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

Enfant à partir de 1 an :

- œsophagite érosive ou ulcérale symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Contre-indications :

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule:

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux
tension psychique.

LOT:19131 PER:10/2022
PPU: 21,00 DH

Composition :

Composition :
5 mg de chlordiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-1,3-dihydro-1-méthyl-5-oxo-1,5-dihydro-2H-1,4-benzodiazépine,
oxyde et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl-3-benzoyloxytoxycu...
par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

Propriétés :

Propriétés : Le chlordiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlordiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétante. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0.3-0.5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démoxépam, desméthyldiazepam. Le démoxépam et le desméthyldiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

No-Spa® 40mg

Chlorhydrate de drotavérine

Comprimé

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

1. Qu'est-ce que No-Spa 40 mg comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?

No-Spa 40 mg comprimé est un antispasmodique. Il peut être utilisé dans les situations suivantes :

Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine biliaire : calcul biliaire, inflammation de la vésicule biliaire ou des voies biliaires.

Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine urinaire : calcul urinaire (dans les reins ou les uretères), pyélique (inflammation du bassinet), cystite (inflammation de la vessie), ténèse vésical (tension douloureuse de la vessie avec sensation de brûlure et envie continue d'uriner).

Traitements d'appoint des troubles suivants :

- spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine digestive : ulcère gastrique (de l'estomac) ou ulcère duodénal (du duodénum), inflammation de la muqueuse gastrique, spasmes du sphincter (anneau musculaire) du cardia ou du pylore (orifice supérieur ou inférieur de l'estomac), inflammation de l'intestin grêle ou du gros intestin ;
- affections gynécologiques : règles douloureuses ou crampes menstruelles.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre No-Spa 40 mg comprimé ?

Ne prenez jamais No-Spa 40 mg comprimé

si vous compossez la rubrique
si vous Faites attention à Adresser à prendre Ce médicament présente

NO - SPA 40MG

CP B20

P.P.V : 32DH00


6 118000 061342

Utilisation d'autres médicaments

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. L'utilisation simultanée de la drotavérine et de la lévodopa entraîne une diminution de l'effet de la lévodopa, à savoir l'atténuation des symptômes de la maladie de Parkinson, ainsi qu'une accentuation de la rigidité des muscles squelettiques et des tremblements.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Les études effectuées chez l'animal gravide et celles réalisées chez la femme enceinte n'ont pas mis en évidence d'effet délétère pour le foetus ou pour la mère. Si vous êtes enceinte, votre médecin déterminera si l'utilisation de ce médicament est pertinente pour vous.

Allaitement

En l'absence de données cliniques suffisantes, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée durant l'allaitement.

Fertilité

Aucune donnée n'est disponible concernant un éventuel effet sur la fertilité chez l'homme.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'administration de No-Spa 40 mg comprimé aux posologies habituelles n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, en cas d'apparition de vertiges suite à la prise d'un comprimé, les activités en environnement à risque, ainsi que la conduite de véhicules et l'utilisation de machines, sont à éviter.

No-Spa 40 mg comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a prévenu que vous présentez une intolérance à certains sucrels, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre No-Spa 40 mg comprimé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou de votre pharmacien.. Vérifiez auprès de



AL AMAL

الامل

مركز أمراض الكلى و تصفية الدم للكبار و الصغار
Centre des Maladies Rénale et Dialyse Adulte et Pédiatrique

بروفيسور أمال بورقية
أمراض الكلى و تصفية الدم

Professeur Amal BOURQUIA

Néphrologie - Dialyse

Ordonnance

Xhalbad ABD est l'ame.

- Echographie rénale
et vesico prostataique

- Rx. pulmonal.

RADIOLOGIE Abou Madi
27, Rue Ilya Abou Madi
Appt N°3 - Gauthier - Casablanca
Tél: 0522 20 34 57 / 0522 20 34 57
Fax: 0522 47 40 00

Le 16 MAI 2020

AMAL CENTRE DES MALADIES RENALE
ET DIALYSE ADULTE & PEDIATRIE
PROFESSEUR Amal BOURQUIA
Tél: 0522 80 20 01

Signature :



127, Boulevard Victor Hugo - Casablanca

Consultation Tel. : 05 22 80 20 01 - Dialyse Tel. : 05 22 83 34 35 - Fax. : 05 22 83 34 35

Email : amal.bourquia@gmail.com - Site Web : www. amalbourquia.com

RC : 410599 - ICE : 00208391800003 - IF : 25291487 - Parente : 34450197 - CNSS : 2601294

BILAN BIOLOGIQUE

Le _____

Nom Mhalleb

Prénom Abdelhame

Sang

- Urée
- Crétaténémie
- Acide Urique
- Glycémie à Jeun
- Glycémie post prandiale
- Hémoglobine Glyquée
- NA+ K+ RA Cl -
- Calcémie
- Phosphorémie
- Protides totaux
- Albuminémie
- Eléctrophorèse des protides
- Oxalates
- NFS+ Plaquettes
- Fer sérique
- Ferritine
- CRP
- SGOT
- Gamma GT
- Phosphatases alcalines
- Vitamine D

- PTH
- TSH
- T3
- Cholestérol
- Triglycérides
- Bilirubine
- VS
- Groupage
- Phénotypage
- Antigène HBS
- Anticorps Anti HBS
- Sérologie HVC
- Dosage quantifié de l'ARN (HVC)
- PSA
- Complément C3 - C4
- Anti DNA Natif
- ANCA
- Ciclosporine T0
- Bilan d'hémostase
- TP TCK
- T2

Urinés

- ECBU + ATB
- Compte d'Addis
- Microalbuminurie
- Protéinurie de 24 H
- Urée de 24 H

- Crétaténurie de 24 H
- Clearance de la crétaténine
- NA+ K+ Cl - Ca+
- Acide Urique
- Glycosurie de 24 H

AL AMAL CENTRE DES MALADIES RENALES
ET DIALYSE - CLINIQUE & PEDIATRIE
PROFESSEUR Amal BOURQUIA
Tél: 05 22 80 20 01
18/05/2020
Laboratoire SENTISSI
Dr. Abdelfattah SENTISSI
Rés. Rumanie II - Tour 2 - Casa
Tél: 05 22 36 62 50 / 39 64 15

Signée : PR.A.BOURQUIA



127, Boulevard Victor Hugo - Casablanca

Consultation Tel. : 05 22 80 20 01 - Dialyse Tel. : 05 22 83 20 31 - Fax. : 05 22 83 34 35

Email : amal.bourquia@gmail.com



Nom & prénom : KHALLAD ABDELEM

FACTURE N° : 20/007444

Date : 16/05/2020

<u>Examen</u>	<u>Montant</u>
ECHOGRAPHIE VESICO-PROSTATIQUE	700,00
RX. POUMONS DE FACE	200,00
Total Montant	
900,00	

Arrêtée la présente Facture à la somme de:

NEUF CENT DIRHAMS

REGLEMENT : TPE Le 16/05/2020

Relevé d'identité bancaire
Banque Centrale Populaire
Agence Massira
88, bd massira el khadra Casablanca
Compte n°: 190 780 21211 9307191 000 7 73

radiologie abou madi
Rue Ilya Abou Madi - Casablanca
0522.20.34.57/0522.20.34.58
Fax: 0522.47.40.09

Laboratoire d'Analyses Médicales Sentissi

Dr A. SENTISSI
Pharmacien Biologiste



Ancien Interne CHU de Toulouse
Spécialisé en Hématologie, Biochimie
Bactériologie, Parasitologie, Pathologie Médicale
D.U. Assurance Qualité en B.M.

FACTURE N° : 2005180016
ICE : 001578364000055

Casablanca le 18-05-2020

Mr Abdeslem KHALLAD

Demande N° 2005180016
Date de l'examen : 18-05-2020

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement sang adulte	E25	E
	URICEMIE	B30	B
	Calcium	B30	B
	CRP	B100	B
	NF	B80	B
	PSA Total	B300	B
	Vitamine D 25-OH (D2+D3)	B450	B
	Vitesse de sédimentation	B30	B
	Urée plasmatique:	B30	B
	Créatininémie	B30	B

Total des B : 1080

TOTAL DOSSIER : 1472.2 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille quatre cent soixante-douze dirhams vingt centimes

INPE: 093000271

Laboratoire SENTISSI
Dr. Abdelfattah SENTISSI
Rés. Romandie 2 - Tour 2 - Casa
Tél.: 05 22 36 62 50 / 05 22 39 64 15

Reçu patient

Dossier N° : AK355988



Examen (s) 16/05/2020

ECHOGRAPHIE VESICO-PROSTATIQUE
RX. POUmons DE FACE

Total : 900,00

Payé : 900,00 TPE

Solde : 0,00

Cachet et signature du cabinet

RADIOLOGIE ABOUMADI
www.radiologie-aboumadi.com

27,Rue Ilya Abou Madi - Quartier Gautier - Casablanca 20000 Maroc

Tél : 0522.20.34.57/58 Fax: 0522.47.40.09 E-mail:

contact@radiologie-aboumadi.com

Patente : 35509523 IF : 01086163 CNSS : 2623884

ICE : 001342320000052

**Veuillez acquitter votre facture à la caisse
avant tout retrait de résultats et de
réclamer votre reçu.**

Reçu imprimé le 16/05/2020 à 12:45 par :

RAJAA

Patient : **KHALLAD ABDESLEM**

Age : 72 ans

Organisme :

N° CIN :

Médecin prescripteur : PR. BOURQUIA AMAL

Médecin radiologue : DR_AKIKI_M