

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

radiologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



ND: 31523

Déclaration de Maladie : N° P19- 0001079

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2792 Société : RTM Retraité

Actif Pensionné(e) Autre : Retraité

Nom & Prénom : Boujemd Abdellah Date de naissance : 06-01-1953

Adresse : Kasbah El Hawa 14 1037 Nis Al Guelidi Casablanca

Tél. : 6643039901 Total des frais engagés : 296,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. BENALOUN M.KAMAL
Diplômé en Chirurgie et Nutrition de Bordeaux
Diplômé en Médecine d' Sport de Rennes
Diplômé en Endocrinologie générale de Montpellier
Résidence El Manzouri à Casablanca
Télé 0222357877 GSM 06 777200

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Boujemd Abdellah

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Nature de la maladie : OPLC

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : Boujemd Abdellah

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/05/2017	Visite	1	150,-	ENJELLOUN 17 05-22-35-78-1
14/05/2017	Visite	1	150,-	
14/05/2017	Visite	1	150,-	
14/05/2017	Visite	1	150,-	

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Formateur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE HAKIM ET FILS CARAÏBES MANAGUARÉ 360806	14/12/2020	146,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	-
00000000	00000000
35533411	11433553
	T

[Création, remont, adjonction]

COEFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DEBUT D'EXECUTION	
FIN D'EXECUTION	
COEFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DATE DU DEVIS	

DR. BENJELLOUN EL MOSTAFA KAMAL

Omnipraticien

Diplômé en Diabétologie et Nutrition
de L'Université de Bordeaux

Membre de la Société Francophone
de Diabétologie

Diplômé en Echographie Générale
de la Faculté de Médecine de Montpellier

Diplômé en Médecine de Sport
de la Faculté de Médecine de Rennes

Electrocardiogramme

Résidence El Mansour N° 12 - Bd. Ghandi
Cabinet : 05 22 36 78 77 - Casablanca

Urgences : 06 61 32 74 20

الدكتور بن جلون المصطفى كمال

طبيب عام

حاصل على دبلوم مرض السكري والتغذية
من كلية الطب ببوردو

عضو في الجمعية الفرنسية
لداء السكري

حاصل على دبلوم الفحص بالصدى
من كلية الطب بمونبليي

حاصل على دبلوم الطبي المريضان
من كلية الطب ببرين

تخطيط القلب

إقامة المنصور رقم 12 - شارع غاندي
العيادة : 05 22 36 78 77 - الدار البيضاء

مستعجلات : 06 61 32 74 20

CASABLANCA, LE

14 MARS 2020

الدار البيضاء، في

Boulevard Abdellah Ben Khedda

28,-- Stoddal

100g x 3 (2)

65,-- Woolz

150g

14,50

Stoddal Ig.

39,00

DR Rouffier

746,50

Dr. BENJELLOUN MOSTAFA
Diplômé en Diabétologie et Nutrition de Bordeaux
Diplôme en Médecine de Sport de Rennes
Diplôme en Echographie Générale de Montpellier
Résidence El Mansour N° 12, Bd. Ghandi, Casablanca
Téléphone : 05 22 36 78 77
Fax : 06 61 32 74 20

E-mail : drkamalbenj@yahoo.fr

ANDOL® 1000 mg

Boîte de 8 Comprimés effervescents Paracétamol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la recueillir. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute d'information à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne, même en cas de symptômes identiques.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous avez des symptômes non mentionnés dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

1 - COMPOSITION DU MÉDICAMENT

Principe actif : Paracétamol.

Excipients : Acide citrique anhydre, Bicarbonate de sodium, Carbonate de sodium anhydre, Povidone K29-30, Matrice orange 74016-71, Arôme abricot 75731-31, Sucrerie, Aspartame, Béta-carotène 1%, Stéarate de magnésium, comprimé effervescent.

Excipients à effet notoire : Sodium, Sorbitol, Aspartam.

2- CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE DE CLASSE

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES AU
ANTI-PYRÉTIQUES-ANILIDES – Code ATC : N02BE01

3- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

ANDOL est un antalgique (calme la douleur) et un antipyétique (réduit la fièvre).

La substance active de ce médicament est le paracétamol. Il est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre, par exemple, maux de tête, d'état grippal, de douleurs dentaires, de courbatures et de douleurs articulaires.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans). Lire attentivement la rubrique Posologie.

Pour les enfants pesant moins de 50 kg, il existe d'autres présentations d'ANDOL dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- POSOLOGIE

Attention ! Cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par unité. Ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant pesant plus de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans).

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 50 kg, il existe d'autres présentations d'ANDOL dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Posologie chez l'adulte et l'enfant à partir de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans)

La posologie usuelle est de 1 comprimé à 1000 mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

Dose de paracétamol à ne jamais dépasser

- Chez un adulte ou un enfant pesant plus de 50 kg :

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 grammes de paracétamol par jour (soit 3 comprimés effervescents par jour).

Cependant, si vous avez des douleurs plus intenses, et uniquement sur les conseils de votre médecin, la dose totale peut être augmentée jusqu'à 4 grammes de paracétamol par jour (soit 4 comprimés effervescents par jour).

NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACÉTAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).

Situations particulières :

La dose maximale journalière ne doit pas dépasser 60 mg/kg/jour (sans dépasser 3 g/jour) dans les situations suivantes :

- si vous pesez moins de 50 kg,
- si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,
- si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment,
- si vous souffrez de déshydratation,
- si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous avez des maladies de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie

génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

EN CAS DE DOUCE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.



Lot N° :

A ut. av. :

PPVIDH :

0 2 / 21
14.50
1H,50



oraire. Prenez dans un verre d'eau. Attendez la réhydratation immédiatement après le contenu du comprimé.

d'éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne régulièrement espacées, y compris l'heure d'au moins 4 heures.

Si l'insuffisance rénale sévère, vous devez prendre chaque prise. Si ANDOL est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre pharmacien.

Le temps d'absorption est limité.

Si la fièvre ou la douleur persiste plus de 3 jours, si elles sont accompagnées d'autres symptômes, consultez votre médecin sans l'avis de votre pharmacien.

0 mg. comprimé effervescent : Consommez au paracétamol ou à l'un des autres médicaments mentionnés dans la rubrique Posologie.

Ne prenez pas de médicament pour la douleur grave du foie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), sauf si votre médecin vous le prescrit.

Pour traiter un enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer. Utilisez une autre forme.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »).

6- EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Rarement, une réaction allergique peut survenir :

- boutons et/ou des rougeurs sur la peau, urticaire,
- brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer (œdème de Quincke),
- malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin. À l'avenir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol.

De très rares cas d'effets indésirables cutanés graves ont été rapportés. Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang : globules blancs (leucopénie, neutropénie), plaquettes (thrombopénie) pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

Autres effets indésirables possibles (dont la fréquence ne peut être estimée sur la base de données disponibles) : troubles du fonctionnement du foie, diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves (agranulocytose), destruction des globules rouges dans le sang (anémie hémolytique) chez les patients présentant un déficit en glucose 6 phosphate déshydrogénase, éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de brûlure, laissant des tâches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament (érythème pigmenté fixe), douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l'épaule gauche et la mâchoire d'origine allergique (syndrome de Kounis), difficulté à respirer (bronchospasme). Dans ce cas, consultez un médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

7- MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

STODAL

Lot :

Exp. :

CIP: 3400931000679

M9010250

01/2024



**BOTTU SA
PPV : 28 DH 00**



* 3 4 0 0 9 3 0 0 0 6 7 9 *

Dans cette notice :

- 1- Qu'est-ce que STODAL, sirop ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STODAL, sirop ?
- 3- Comment prendre STODAL, sirop ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver STODAL, sirop ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE STODAL, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement de la toux.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STODAL, sirop ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Faites attention avec STODAL, sirop :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est déconseillé chez les personnes présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en

idies héréditaires, 74% V/V d'éthanol du saccharose : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète. Une dose de 5 ml contient 0,069 g d'éthanol et 3,75 g de saccharose.

Une dose de 15 ml contient 0,206 g d'éthanol et 11,25 g de saccharose.

L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

Compte tenu de la présence de PULSATILLA 6 CH dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite, sans avis médical.

Informations importantes concernant certains composants de STODAL, sirop

Excipients à effet notoire : saccharose, éthanol.

3- COMMENT PRENDRE STODAL, sirop ?

Voie orale.

STODAL

Lot :

Exp. :

CIP: 3400931000679

M9010250

01/2024



**BOTTU SA
PPV : 28 DH 00**



* 3 4 0 0 9 3 0 0 0 6 7 9 *

Dans cette notice :

- 1- Qu'est-ce que STODAL, sirop ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STODAL, sirop ?
- 3- Comment prendre STODAL, sirop ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver STODAL, sirop ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE STODAL, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement de la toux.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STODAL, sirop ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Faites attention avec STODAL, sirop :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est déconseillé chez les personnes présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en

idies héréditaires, 74% V/V d'éthanol du saccharose : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète. Une dose de 5 ml contient 0,069 g d'éthanol et 3,75 g de saccharose.

Une dose de 15 ml contient 0,206 g d'éthanol et 11,25 g de saccharose.

L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

Compte tenu de la présence de PULSATILLA 6 CH dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite, sans avis médical.

Informations importantes concernant certains composants de STODAL, sirop

Excipients à effet notoire : saccharose, éthanol.

3- COMMENT PRENDRE STODAL, sirop ?

Voie orale.



12 Vitamins

FORME/PRESENTATION

Tube of 20 or 8 effervescent

COMPOSITION:

Each effervescent tablet contain

Excipients :

12 Vitamins

Vitamin A	400 µg	50%*
Vitamin C	60 mg	100%*
Vitamin D	2,5 µg	50%*
Vitamin E	10 mg	100%*
Thiamine (Vit. B1)	1,4 mg	100%*
Riboflavin (Vit. B2)	1,6 mg	89%*
Niacin (Vit. B3)	18 mg	91%*
Pantothenic acid (Vit. B5)	6 mg	100%*
Vitamin B6	2 mg	100%*
Biotin (Vit. B8)	150 µg	100%*
Folic acid (Vit. B9)	200 µg	100%*
Vitamine B12	1 µg	50%*



Exp. date :

Lot/Batch n° :

9 Mineral salts and trace elements

ce elements.

eral salts

Calcium	240 mg	30%*
Iron	4,2 mg	30%*
Magnesium	90 mg	30%*
Zinc	4,5 mg	30%*
Manganese	1,5 mg	43%*
Copper	0,45 mg	22,5%*
Chromium	25 µg	100%*
Molybdenum	30 µg	20%*
Selenium	15 µg	30%*

* of the Recommended Daily Intake

Dosage :

Adult : 1 effervescent tablet daily.

Direction of use :

Put the tablet in a glass of water and drink after complete dissolution.

CONTRAINDICATIONS :

Hypersensitivity to one of the components.

NUTRITIVE VALUE FOR 1 TABLET :

Energy value	8,3 Kcal (34,6 Kj)
Sodium	71 mg

Food supplement not a medicine.

Close the tube immediately after use.

Keep out of reach of children.

Store in a cool and dry place.



Lot Bachkou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Morocco

Responsible pharmacist : O. MOTII