

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Déclaration : contact@mupras.com
Mise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

AS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0030029

ND: 31836

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7044 Société : ✓

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : SAKRI Mohamed

Date de naissance : ✓

Adresse : ✓

Tél. : 0660591749 Total des frais engagés : 1235.2 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 18/09/2018

Nom et prénom du malade : SAKRI Mohamed Age: ✓

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : GLAUCOME

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/06/2020	C.F.		2500	Professeur Diaa LAHBI Spécialiste Ophtalmologie Adulte et Pédiatrique 62, Bd. Mouad Enou Jabal - 2ème Etage 13ème arrondissement - Casablanca - Tel: 0522 750 750

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

18/06/2020 985,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000 G
35533411 11433553
B

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'E

Professeur Diaa LAHBIL

SPECIALISTE EN OPHTALMOLOGIE ADULTE ET PEDIATRIQUE

Ex Enseignante à la Faculté de Médecine de Casablanca

Diplômée de la Faculté de Médecine de Nantes - France


Chirurgie de la cataracte par phaco

DIU Chirurgie réfractive

Chirurgie du glaucome

AFS Strabologie

Angiographie - Laser - DIU Contactologie



الأستاذة ضياء لهبيل

أخصائية في طب وجراحة العيون للكبار والأطفال

أستاذة مبرزة بكلية الطب بالدار البيضاء

خريجة كلية الطب بنانت - فرنسا

جراحة الجلالة بالليزر

جراحة تصحيح البصر بالليزر

جراحة ارتفاع الضغط

جراحة الحول

تصوير الشبكية - الليزر - العدسات اللاصقة

Casablanca, le 18 Juin 2020 الدار البيضاء

Mr. SAKRI Mohamed

164, 20x6

COSOPT: COLLYRE

1 goutte 2 fois par jour; 8h & 20h, les deux yeux, 6

Mois



PHARMACIE DES HALLES
Mme. BOUDAL DIOURI Latifa
Tél 0522 24 61 79
Fax 0522 24 19 28

985, 20

Professeur Diaa LAHBIL
Spécialiste Ophtalmologie Adulte et Pédiatrique
62, Bd. Mouad Bnou Jabal - 2ème Etage
Sidi Bernoussi - Casablanca - Tél. 0522 750 750

62, شارع معاذ بن جبل - الطابق الثاني - سيدي البرنوصي - الدار البيضاء - الهاتف : 0522 750 750

62, Bd. Mouad Bnou Jabal - 2ème Etage - Sidi Bernoussi - Casablanca - Tél : 0522 750 750

Urgences : 06 61 23 41 06 - E-mail : dlahbil@gmail.com

COSOPT® 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Boîte de 1 flacon de 5 ml

Veuillez lire attentivement l'information de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez vu, lu autre chose, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes légers, cela pourrait lui être nocif.
- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :
1. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
3. COMMENT UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?
5. COMMENT CONSERVER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml
COLLYRE EN SOLUTION
FLACON DE 5 ML

Titulaire de l'AMM/Distributeur :
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bousskoura - Maroc
Sous licence : Mundipharma Pty Ltd - Australie
Fabricant : Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret
Route de Marat Riom, Clermont - Ferrand
Cedex 9, 63363 - France

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À C

1. Qu'est-ce que COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour traiter les troubles de la vision liés à la cataracte, à la glaucome et à la myopie. Il est également utilisé pour prévenir la formation de cataractes chez les personnes atteintes de diabète sucré.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
Avant d'utiliser COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution, vous devez lire attentivement cette notice et vous assurer que vous n'avez pas de contre-indication à son utilisation. Vous devez également vous assurer que vous n'avez pas de réaction allergique à l'un des composants du médicament.

3. Comment utiliser COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution doit être utilisé exactement comme indiqué dans cette notice. Vous devez vous assurer de bien respecter les instructions d'utilisation.

4. Quels sont les effets indésirables ?
Les effets indésirables les plus fréquents sont les rougeurs, les démangeaisons, les larmoiements et les brûlures. Ces effets sont généralement bénins et disparaissent rapidement.

5. Comment conserver COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution doit être conservé à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 2°C et 8°C.

6. Informations supplémentaires
COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution est un médicament générique. Son nom commercial est COSOPT.

PPV 164.20 DH

EXP 02 2021

LOT 5076240 1

1. Qu'est-ce que COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

3. Comment utiliser COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

4. Quels sont les effets indésirables ?

5. Comment conserver COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

6. Informations supplémentaires

7. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

8. Quelles sont les autres informations importantes ?

9. Où trouver plus d'informations ?

10. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

11. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

12. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

13. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

14. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

15. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

16. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

17. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

18. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

19. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

20. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

21. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

22. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

23. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

24. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

25. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

26. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

27. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

28. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

29. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

30. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

31. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

32. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

33. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

34. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

35. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

36. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

37. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

38. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

39. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

40. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

41. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

42. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

43. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

44. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

45. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

46. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

47. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

48. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

49. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

50. Où acheter COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

COSOPT® 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Boîte de 1 flacon de 5 ml

Vous lisez attentivement l'importance de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez vu, lu autre chose, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
3. COMMENT UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?
5. COMMENT CONSERVER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
7. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?



COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml
COLLYRE EN SOLUTION
FLACON DE 5 ML

Titulaire de l'AMM/Distributeur :
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bousskoura - Maroc
Sous licence : Mundipharma Pty Ltd - Australie
Fabricant : Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret
Route de Marat Riom, Clermont - Ferrand
Cedex 9, 63363 - France

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A C

1. Noms et indications :
COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

2. Composition :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

3. Mode d'emploi :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

4. Effets indésirables :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

5. Précautions d'emploi :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

6. Informations supplémentaires :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

Si vous avez vu, lu autre chose, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
3. COMMENT UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?
5. COMMENT CONSERVER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
7. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

1. Noms et indications :
COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

2. Composition :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

3. Mode d'emploi :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

4. Effets indésirables :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

5. Précautions d'emploi :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

6. Informations supplémentaires :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

7. Informations supplémentaires :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.

8. Informations supplémentaires :
COSOPT est un médicament à usage ophtalmique. Il est utilisé pour le traitement de l'angle fermement et de l'angle ouvert.



4. Dans une main, tenez le flacon à l'envers, en plaçant votre pince

5. Avec l'autre main, tirez doucement la paupière inférieure

6. Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut.

7. Laissez l'orbite du flacon près de la paupière inférieure. Écartez tout contact avec l'œil.

8. Laissez une goutte tomber dans la cuvette formée entre l'œil et la paupière en pressant légèrement le flacon.

9. Fermez l'œil pendant quelques instants. Ne clignez pas des yeux, ne vous frottez pas les yeux.

10. En gardant l'œil fermé, placez l'index dans le coin inférieur de l'œil et appuyez contre le nez pendant deux minutes environ. Cela empêche le médicament de couler par le canal lacrymal vers le nez et le gorge, où il pourrait être absorbé par les muqueuses du corps. Consultez votre médecin pour obtenir plus d'informations sur cette méthode.

11. Répétez le bouchon pour fermer le flacon hermétiquement. Ne serrez pas trop le bouchon.

12. Lavez-vous à nouveau les mains à l'eau et au savon pour éliminer les éventuels résidus.

13. Attendez au moins 15 minutes avant de remettre vos lentilles de contact.

14. Évitez à éviter tout contact de l'embout compte-gouttes avec l'œil, à manipuler ou toute autre partie pour ne pas contaminer le collyre.

15. La contamination du collyre peut conduire à une infection oculaire.

16. Après l'instillation du collyre, il est possible de ressentir une sensation de brûlure dans l'œil.

17. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si cette sensation persiste ou est réellement gênante.

18. COSOPT aide à contrôler la maladie, mais ne la guérit pas. COSOPT doit donc être utilisé tous les jours. Continuez d'utiliser COSOPT tant que votre médecin vous le prescrit.

19. Si vous avez utilisé plus de COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution que vous n'avez dû :

20. Si vous pensez que vous l'avez, ou un autre personne, avez-aviez le contenu d'un flacon de COSOPT, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

21. Si vous ignorez si la dose doit être suivie, adressez la dose à votre médecin.

22. Si vous ignorez si la dose doit être suivie, adressez la dose à votre médecin.

23. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

24. Si vous avez arrêté d'utiliser COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution :

25. Si vous avez arrêté d'utiliser ce médicament, parlez-en d'abord à votre médecin.

26. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

27. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

28. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

29. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

30. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

31. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

32. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

33. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

34. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

35. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

36. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

37. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

38. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

39. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

40. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

41. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

42. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

43. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

44. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

45. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

46. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

47. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

48. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

49. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

50. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

51. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

52. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

53. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

54. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

55. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

56. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

57. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

58. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

59. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

60. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

61. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

62. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

63. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

64. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

65. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

66. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

67. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

68. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

69. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

70. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

71. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

72. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

73. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

74. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

75. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

76. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

77. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

78. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

79. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

80. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

81. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

82. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

83. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

84. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

85. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

86. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

87. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

88. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

89. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

90. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

91. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

92. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

93. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

94. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

95. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

96. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

97. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

98. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

99. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

100. Si vous avez des difficultés à vous rappeler d'utiliser le collyre, demandez des astuces auprès de votre pharmacien.

