

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge - Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1195

Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TOUIJAR Abdellkader

Date de naissance : 01-01-1945

Adresse : 7, Rue Soukate Casa Blanca

Tél. : 0664897840

Total des frais engagés : 420,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. ZEMMAMA O. LOTFI
 45, Bd Bir Anzarane
 C 05 22 25 03 73
 GSM : 06 61 14 99 86
 Fax : 05 22 25 13 00
 Email : zot2@live.fr

Date de consultation : 13 MAR 2020

Nom et prénom du malade : TOUIJAR Abdellkader

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 13/03/2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13 MAR 2010	✓		150,0004	Dr. ZEMMAMA OLOF 45, Bd. Bill Adarane C : 06 22 25 03 73 GSM : 06 61 14 99 86 Fax : 05 22 25 13 00 Email : zol2@live.fr

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
FACTURE POUR JACQUES ZEMMAMA 06 61 14 99 86 Tél: 05 22 25 13 00 Fax: 05 22 25 13 00 Email: zol2@live.fr	13/03/20	270,40

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/>
			<input type="text"/>	
				<input type="text"/>
<img alt="Diagram of the dental arch showing numbered teeth from 1 to 8 in both upper and lower arches. The diagram is oriented with the upper arch at the top and the lower arch at the bottom. The teeth are numbered sequentially from 1 to 8 on each side. The diagram is centered in				

Dr. Zemmama Omar Lotfi
LAUREAT DE LA FACULTÉ
DE MÉDECINE DE CASABLANCA



الدكتور زمامرة عمر لطفي
خريج كلية الطب
بالدار البيضاء

Casablanca, Le 13 MAR. 2020

الدار البيضاء في

Dr. Zemmama O. LOTFI
45, Bd. Bir Anzarane
C : 05 22 25 03 73
GSM : 06 61 14 99 86
Fax : 05 22 25 13 00
Email : zol2@live.fr

Dr. Zemmama O. LOTFI
45, Bd. Bir Anzarane
C : 05 22 25 03 73
GSM : 06 61 14 99 86
Fax : 05 22 25 13 00
Email : zol2@live.fr

139.00
10) ~~EMOSO 2061~~
1 ep au dinar

49.40
10) ~~Endoscopy P~~
1 gal 3x1 pd reçus

10) ~~Evection~~
91.60 CP 3x1

Dr. ZEMMAMA O. LOTFI
45, Bd. Bir Anzarane
C : 05 22 25 03 73
GSM : 06 61 14 99 86
Fax : 05 22 25 13 00
Email : zol2@live.fr

270,40

PHARMACIE LES JARDINS
DE L'OCÉAN VAY Sarl Au
ROUTE D'ALGER Casablanca
Dab. 22 29 08 36
Tél : 05 22 29 08 36
T.P. : 32960411
RC : 314-14

45, Bd. Bir Anzarane - Casablanca
Tél : 05 22 25 03 73
Fax : 05 22 25 13 00
GSM : 06 61 14 99 86
E-mail : zol2@live.fr

RAPPORTER L'ORDONNANCE

45. شارع بئر أنزاران الدار البيضاء،
الهاتف : 05 22 25 03 73
الفاكس : 05 22 25 13 00
المحمول : 06 61 14 99 86
البريد الإلكتروني : zol2@live.fr

EUCARBON®

1. Dénomination du médicament

EUCARBON®

Boîtes de 30 et 100 Comprimés,

Charbon végétal pulvérisé, Extrait sec de rhubarbe, Feuilles de séné & Soufre purifié

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Composition du médicament

Par comprimé

Charbon végétal pulvérisé.....	180,00 m
Extrait sec de rhubarbe.....	25,00 m
Feuilles de séné.....	105,00 m
Soufre purifié.....	50,00 m

Excipients : Huile essentielle de menthe poivrée, Huile essentielle de fenouil, Saccharose, Amidon de maïs, Talc, Kaolin lourd, Gomme Acacia

Liste des excipients à effets notoires : Saccharose.

3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Lot : 3334A ATC : A06AB06

Lot: 3334A

les agents actifs végétaux

EXP: 91,00

teur de la fonction intestinale. Le charbon végétal adsorbe les toxines, les feuilles de séné et le soufre purifié adsorbent les toxines adsorbées. EUCARBON® a un effet légèrement purifiant et adoucissant.

PPV: 91,00 HS

EUCARBON® est indiqué dans les cas suivants :

- Dyspepsie, digestion pénible.



Gélules
Micro-granules
gastro-résistants
Par voie orale

Inéso

ésoméprazole

Deva
Pharmaceutique

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Inéso contient une substance appelée ésoméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Inéso 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

Adultes

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser,
- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Inéso peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Inéso 40 mg, gélule gastro-résistante est utilisé dans le traitement des maladies suivantes

Adultes

- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT

Sans objet.

CONTRE-INDICATIONS

- Si vous êtes allergique à l'ésoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons, par exemple pantoprazole, rabeprazole, omeprazole.
- Si vous prenez un médicament contre les ulcères sans prescription médicale.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Adressez-vous à votre pharmacien si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez d'autres médicaments. Si vous prenez Inéso pour la première fois, il est recommandé de faire une consultation avec votre pharmacien. La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons peut augmenter le risque d'ostéoporose.



INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, ou si vous avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance. Vous ne devez pas prendre Inéso si vous prenez le médicament suivant : nelfinavir (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants : atazanavir, dypidopropyl, kétocanazole, itraconazole ou voriconazole, erlotinib, citalopram, imipramine ou domipramine, diazépam, phénitoïne, warfarine, clofazimide, cisapride, digoxine, méthotrexate, tacrolimus, rifampicine, millepertuis.

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou à jeun.

INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYTOTHERAPIE OU THERAPIES ALTERNATIVES

Sans objet.

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre Inéso pendant cette période.

On ne sait pas si Inéso passe dans le lait maternel; en conséquence, vous demandez conseil à votre médecin ou pharmacien lorsque vous allaitez.

SPORTIFS

Sans objet.

EFFECTS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES MÉTIERS

Conduite de véhicules et utilisation de machines. Inéso n'est pas susceptible d'entraîner des effets secondaires tels que fréquemment ou rarement. Si vous êtes affecté par ces effets, il est possible que votre médecin vous donne des instructions.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose

POSÉOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION

DU TRAITEMENT

Inéso 20 MG :

Adultes âgés de 18 ans et plus :

- Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser,
- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Inéso peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

- En cas d'infection par la bactérie appelée *Helicobacter pylori*, pour prévention de la récidive de l'ulcère de l'estomac. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour. Une fois le contrôle des symptômes, une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour, pendant 4 semaines. Un traitement de 8 semaines est recommandé.

- Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour.

- Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour.

Utilisation chez les adolescents (âgés de 12 à 17 ans)

- Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser,
- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Inéso peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

- En cas d'infection par la bactérie appelée *Helicobacter pylori*, pour prévention de la récidive de l'ulcère de l'estomac. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour. Une fois le contrôle des symptômes, une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour, pendant 4 semaines. Un traitement de 8 semaines est recommandé.

- Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour.

- Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour.

Inéso 40 MG :

Adultes âgés de 18 ans et plus :

- Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser,
- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Inéso peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

- En cas d'infection par la bactérie appelée *Helicobacter pylori*, pour prévention de la récidive de l'ulcère de l'estomac. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour. Une fois le contrôle des symptômes, une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour, pendant 4 semaines. Un traitement de 8 semaines est recommandé.

- Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg deux fois par jour.

- Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg deux fois par jour.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg deux fois par jour.

Utilisation chez les adolescents (âgés de 12 à 17 ans)

- Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser,
- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Inéso peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

- En cas d'infection par la bactérie appelée *Helicobacter pylori*, pour prévention de la récidive de l'ulcère de l'estomac. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour. Une fois le contrôle des symptômes, une gélule d'Inéso 40 mg une fois par jour, pendant 4 semaines. Un traitement de 8 semaines est recommandé.

- Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg deux fois par jour.

- Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg deux fois par jour.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison. La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg deux fois par jour.

Mode d'administration

- Vous pouvez prendre vos gélules à n'importe quel moment de la journée, avec ou sans boisson.

Enfants âgés de moins de 12 ans

Inéso 20 mg et 40 mg, gélules gastro-résistantes.

Sujets âgés

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire.

MeteoSpasmyl®

Capsule molle - Boîte de 20 Citrate d'alvérine et Siméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant

le
?
sule

METEOSPASMYL® B 20 caps molles
Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 118001 149293

EST-IL UTILE ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTISPASMODIQUE
MUSCULOTROPE/ANTIFLATULENT -
code ATC (A : appareil digestif et métabolisme).

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs digestives avec ballonnements.

METEOSPASMYL, capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule 2 à 3 fois par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

A prendre au début des repas ou au moment des douleurs.