

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-475862

32 362

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

1811

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

chihab malika

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

08/08/2020

Nom et prénom du malade :

Chihab Malika

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Diabète type 2

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :

Signature de l'adhérent(e) :

### VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

N° W19-475862

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 000 1811

Nom de l'adhérent(e) : Chihab Malika

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

MTC 0061811

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/06/2020	Relai	1	90€	INP : 08M63727.
08/06/2020	G	1	250,00	 Dr. EL MEKKI Spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DE LA BELLE EPOQUE Mme LAURE BERNAL	9-0-06 2020	2106,90

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>ASME D'ANALYSES MEDICO-CHIRURGICALES ABDEL BENJOURI ASME LANJOUW</i>	21/06/12	B	300,00 DHS
	18/06/12	B 12	150,00 DHS

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

### **VOLET ADHERENT**

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
					<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>
					<b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>
					<b>DEBUT D'EXECUTION</b> <input type="text"/>
					<b>FIN D'EXECUTION</b> <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>
		$\begin{array}{c c} H & \\ \hline 25533412 & 21433552 \\ 00000000 & 00000000 \\ \hline D & G \\ 00000000 & 00000000 \\ 35533411 & 11433553 \\ \hline & B \end{array}$	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel. Therapeutique, nécessaire à la profession		
					<b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>
					<b>DATE DU DEVIS</b> <input type="text"/>
					<b>DATE DE L'EXECUTION</b> <input type="text"/>

الدكتورة المكاوي صفاء

Docteur ELMEKKAOUI Safae

أخصائية في أمراض الغدد والسكري وأمراض الأيض  
Spécialiste en endocrinologie, diabétologie  
et maladies métaboliques



CABINET EL MEKKAOUI  
Endocrinologie & Diabétologie

Oujda Le : 08/06/2020 وحدة في:

Chihab Malika

98,10 x 3 = 294,30

- Averel Zugg

sg rédui à jen zugg

60,40x

- Averel Zugg

sg le feu avant zugg zugg

437,00 x 2 =

- Janumet 50 doses x gg

874,00

sg cidi, sg le feu zugg

76,00

- Effitac 1,5 mg x feu

1 feu si besou

46,70

- Zefloric 100 mg x gg

sg de feu zugg

Pharmacie AL HIDAYA  
Mme Naima BEN ALI  
Doyenne en Pharmacie  
1 Rue Abdellah Ben Haddouz  
Tél : 05 36 50 62 55 - OUJDA  
TÉL : 06 22 34 45 55

Dr. ELMEKKAOUI Safae  
Spécialiste en endocrinologie diabétologie  
et maladies métaboliques  
tel : 05 36 70 77 75 - Oujda



شارع يوسف بن تاشفين، إقامة بن تاشفين رقم 5، الطابق الأول شقة رقم 7

Boulevard Youssef ibn Tachfine, N5 Résidence ibn Tachfine, 1er étage N°7


Tél : 05 36 70 77 75

- Spectrum 500 Ugs **1S**  
149,50 Jgo x 31J apres 8go = 4900

- Coveram 5ug/5Ugs **1S**  
1go Uetm apres 8go = 3600

20800x3 =  
62400

T: 8106.90



70027234/010414-1



6 118001 160495  
JANUMET® 50/1000 mg

AMM 59DMP/21/NCI

Boîte de 56 comprimés pelliculés

DISTRIBUE PAR MSD MAROC P.P.V: 437,00 DH

6 118001 160495  
JANUMET® 50/1000 mg  
AMM 59DMP/21/NCI  
Boîte de 56 comprimés pelliculés  
DISTRIBUE PAR MSD MAROC P.P.V: 437,00 DH

70027234/010414-1

Pharmacie AL HABABY  
Mme Naima BENALI  
Docteur en pharmacie  
1, Rue Benabyl - BP 1000 - OUJDA  
Tél. : 05 36 50 88 88 - INPE : 082

# EFITAC® 150 mg, 300 mg

## Comprimés effervescents

### Composition :

EFITAC 150 mg : Ranitidine (DCI) ..... 150 mg

EFITAC 300 mg : Ranitidine (DCI) ..... 300 mg

Excipients : ..... q.s.p

### Excipients à effets notoires : Lactose & Sodium.

### Présentations :

EFITAC® 150mg : boîtes de 10 et 20 comprimés effervescents.

EFITAC® 300mg : boîte de 10 comprimés effervescents.



de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de besoin.

Signalez un effet indésirable non mentionné dans cette notice,

(par exemple, sur l'énergie, le métabolisme)

Lot n° : EFITAC

Lot n° :

A ut. av. :

P.P.V. :

78,00

### Les indications thérapeutiques de la spécialité :

- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif
- œsophagite par reflux gastro-œsophagien
- Syndrome de Zollinger-Ellison
- Traitement d'entretien de l'ulcère duodénal

### EFITAC 300mg :

Les indications thérapeutiques de la spécialité

- En association à une bithérapie antibiotique, ér (après preuve endoscopique de lésion et de l'inflammation)
- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif
- œsophagite par reflux gastro-œsophagien
- Syndrome de Zollinger-Ellison

### Contre-indications :

Allergie à la ranitidine,

Allergie à l'un des composants.

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de type I (lapp) ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

### Mises en garde :

Prévenez votre médecin en cas d'antécédent de porphyrie.

L'administration de ce médicament peut favoriser le développement bactérien dans l'estomac par diminution de l'acidité gastrique.

### Précautions d'emploi :

Utilisez ce médicament AVEC PRÉCAUTION en cas d'insuffisance rénale ou hépatique sévère, en particulier chez le sujet âgé.

En cas de régime désodé ou hyposodé, tenir compte de la teneur en sodium.

**EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Interactions avec d'autres médicaments :

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de la ranitidine, il convient d'espacer les prises de 2 heures entre les deux médicaments. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Par mesure de précaution, il convient d'éviter ce médicament au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Posologie :

#### Maladie ulcéreuse gastro-duodénale:

soit, en présence de Helicobacter pylori, 1 comprimé effervescent à 300 mg matin et soir associé à deux antibiotiques, pendant 14 jours, suivis par 1 comprimé effervescent à 300 mg par jour pendant 2 à 4 semaines supplémentaires;

soit 1 comprimé effervescent à 300 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.



# كوفيرام® 5 ملغ / 5 ملغ

بيراندوبيريل أرجينين / أملوديبين

# كوفيرام® 10 ملغ / 5 ملغ

بيراندوبيريل أرجينين / أملوديبين

# كوفيرام® 10 ملغ / 10 ملغ

بيراندوبيريل أرجينين / أملوديبين

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

\* إحفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئناف إليها من جديد .

\* إذا كانت لديك أيَّة أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني .

\* لقد وصف هذا الدواء لك شخْص

\* إذا شعرت بأيَّة آثار جانبية تكلم (أنظر إلى مقطع 4 : ماهي الآثار

في هذه النشرة :

١. ما هو كوفيرام ، حبة وفي أيَّة حالة يستعمل ؟

٢. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبلأخذ كوفيرام ، حبة ؟

٣. كيف يؤخذ كوفيرام ، حبة ؟

٤. ما هي الآثار الجانبية المختلطة ؟

٥. كيف يحافظ كوفيرام ، حبة ؟

٦. محتوى العبوة ومعلومات إضافية .

**COVERAM® 5mg/5mg**  
Péridopril arginine / amlodipine  
30 comprimés



6 118001 30078

الضرر  
النشرة

الاحتياط  
التحذيرات  
الآثار  
الإرشادات  
الجرعات  
البيانات  
التحذيرات  
الاحتياط  
الضرر  
النشرة

و مجرد وقوعه حيث

لا يزيد عن

**کوفیرام®** ۵ ملغ / ۵ ملغ  
بی‌اندوسیل ارجمنین / املودیپین

بیراندوبریل ارجینین / املودیین

كوفيرام® 10 ملغ / 5 ملغ

بیراند و پریل ارجمندین / املودیین

كوفيرام® 10 ملغ / 10 مل

بیرونی دوسریل آرچیتین / املودیپین

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستناد إليها من جديد.
  - إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني.
  - لقد وصف هذا الدواء لك شخصاً آخر.
  - إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم أطباك على الفور.

الضرر،  
النشرة

**COVERAM®** 5ms/5ms

#### Périndopril arnipine / amlodipine

30 comprimés



6118001 130078

و مجرد وقوعه حيث

كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وخيمة للجنين عند

بكميات ضئيلة.

لـك الإرضاـع .  
سـعـات ، وـيمـكـن لـطـبـيـبـك أـن يـخـتـار لـك عـلاـجـاـخـوـ إـذـاـ كـيـنـ

بیت الولاده او سابق لوانه

السيارة أو تشغيل الآليات . إذا كانت الأقراص تسبب لك الصداع ، فيجب أن تتجنب القيادة أو تشغيل

*Journal of Clinical Endocrinology* 1983, 103, 101-107.

卷之三十一

二〇一

١. ما هو كوفيرام، جهة وفي أيّة حالة يستعمل؟
  ٢. ما هي المعلومات التي يتضمنها معرفتها قبل أحد كوفيرام، جهة
  ٣. كيف يُؤخذ كوفيرام، جهة؟
  ٤. ما هي الآثار الجانبية المترتبة؟
  ٥. كيف يتحقق كوفيرام، جهة؟
  ٦. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

ما هو كوفيرام، حبة وفي أي حالة يستعمل؟  
 فلمة العلاجية الصيدلانية: مثبت للخimerة المولدة للألكتوتين (IEC) ومحاصر للكلسيوم.  
 كود C09BB04 ATC C09  
 وكيفية إعداده، حبة لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني، أو لعلاج الأمراض الالكتائية الثابتة

السيارة أو تشغيل الآليات . إذا كانت الأقراص تسبب لك الصداع ، ف何必 أن تتعجب أبداً !

وَالْمُؤْمِنُونَ إِذْ يَرَوْنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا  
يَرَوْنَنَا لِتُبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّا مُسْلِمُونَ

فإن عدم تحمل بعض أنواع المكر، فائز بالطبع

# كوفيرام® 5 ملغ / 5 ملغ

بيراندوبيريل أرجينين / أملوديبين

# كوفيرام® 10 ملغ / 5 ملغ

بيراندوبيريل أرجينين / أملوديبين

# كوفيرام® 10 ملغ / 10 ملغ

بيراندوبيريل أرجينين / أملوديبين

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

\* إحفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئناف إليها من جديد .

\* إذا كانت لديك أيَّة أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني .

\* لقد وصف هذا الدواء لك شخْص

\* إذا شعرت بأيَّة آثار جانبية تكلم (أنظر إلى مقطع 4 : ماهي الآثار

في هذه النشرة :

١. ما هو كوفيرام ، حبة وفي أيَّة حالة يستعمل ؟

٢. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبلأخذ كوفيرام ، حبة ؟

٣. كيف يؤخذ كوفيرام ، حبة ؟

٤. ما هي الآثار الجانبية المختلطة ؟

٥. كيف يحافظ كوفيرام ، حبة ؟

٦. محتوى العبوة ومعلومات إضافية .

**COVERAM®** 5mg/5mg  
Péridopril arginine / amlodipine  
30 comprimés



6 118001 30078

الضرر  
النشرة

الاحتياط  
التحذيرات  
الآثار  
الإرشادات  
الجرعات  
البيانات  
التحذيرات  
الاحتياط  
الضرر  
النشرة

و مجرد وقوعه حيث

لا يزيد عن

لا يزيد عن</

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimpiride  
Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite

Dans quel cas

AMAREL, ci

lorsque le taux

suffisants pour

2. QUELLES

COMPRIMÉS

Ne prenez pas

- si vous êtes

(médicament)

glibenclamide

bactériennes

contenus dans

- si vous avez

- en cas de diabète

votre taux de sucre

signes suivants

raideurs musculaires

,

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

## Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

• Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

• Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie hérititaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

## Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard tard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir "Prise d'autres médicaments") ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.
  - les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs thoraciques et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines de poitrine et troubles de rythme cardiaque).
- votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maitrise, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

## Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou sucre. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous, contre les éudorments de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

## Test de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

## Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

- L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :
- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine) ;
  - médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
  - médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
  - médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracycline, chloramphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
  - médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
  - médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
  - médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimpiride  
Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite :  
Dans quel cas ?

AMAREL, ce

lorsque le taux

suffisants pour

2. QUELLES

COMPRIMÉS

Ne prenez ja

- si vous êtes

(médicament

glibenclamid

bactériennes

contenus da

- si vous avez

- en cas de di

votre taux d'

signes suivan

raideur musculaire

,

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

## Faites attention

### Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

• Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

• Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie hérititaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard tard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir "Prise d'autres médicaments") ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.
  - les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs thoraciques et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines, ingurgitation de poitrine et troubles de rythme cardiaque).
- votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maitrise, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

### Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou sucre. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous, contre les éudorments de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

### Test de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine) ;
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracycline, chloramphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

# Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimpiride  
Comprimé

SANOFI

## 1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite :  
Dans quel cas ?

AMAREL, ce

lorsque le taux

suffisants pour

2. QUELLES

COMPRIMÉS

Ne prenez ja

- si vous êtes

(médicament

glibenclamid

bactériennes

contenus da

- si vous avez

- en cas de di

votre taux d'

signes suivan

raideur musculaire

,

- en cas de coma diabétique ;

- si vous avez une maladie grave des reins ;

- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

## Faites attention

### Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

• Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.

• Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie hérititaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

### Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard tard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
- prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
- fonction rénale diminuée ;
- maladie grave du foie ;
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrenales) ;
- consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
- prise de certains autres médicaments (voir "Prise d'autres médicaments") ;
- si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.

Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.
  - les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs thoraciques et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines, ingurgitation de poitrine et troubles de rythme cardiaque).
- votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter un état confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maitrise, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

### Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou sucre. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous, contre les éudorments de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

### Test de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine) ;
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
- médicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action) ;
- médicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracycline, chloramphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
- médicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine) ;
- médicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
- médicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles masculines ;

**سيبيكتروم® 500 / 250 ملغم، علىب من فئة 10، 20 قرصا ملمسيا**

**سيبيكتروم® 750 ملغم، علىب من فئة 10 أقراص ملمسية**

(سيبروفلوكساسين)

يرجى الاطلاع بانتهاء على هذه النشرة بأكملها قبل تناول هذا الماء.  
احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قرائتها من جديد.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك أطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي، لا تقم بإعطائه لشخص آخر، حتى في حال وجود أعراض مشابهة لأنك قد تسبب التضرر له.

إذا أصبح أحد التأثيرات غير المرغوب فيها خطأً أو إذا لاحظت ذلك، تأثير غير مرغوب فيه غير مذكور في

**SPECTRUM 500 mg**  
20 comprimés

ablanca



لرقم قفل

LOT 191285  
EXP 07/2022  
PPV 149.50 DH

1. مكونات الدواء  
للادة الفعالة:  
سيبروفلوكساسين...

السواغات : الصوديوم  
المغنيزيوم سلبيكا غروزال  
6.000  
2. الصنف الصيدلي:  
الصنف الصيدلي إلى  
J01MA02

يحتوي سيبيكتروم على:  
3. دواعي الإستعمال:  
سيبروفلوكساسين

الحراثيم التي  
- لدى البال

يستعمل س  
عدوى المس

العدوى الم

عدوى المس

عدوى الأد

عدوى معن

عدوى الم

عدوى العد

الرقيقة من

- العرض ثرى - سوة حبيبة.

يمكن استعمال سيبيكتروم في علاج العدوى وهي نسبة ضعيفة لعدد الكريات البيضاء (فأله العدوات). والذين يعانون من حمى يمكن أن تكون ناجحة عن إصابة بالبكتيريا إذا كنت تعاني من عدوى حادة أو عدوى ناجحة عن لوعة مختلفة من الجراثيم، قد يصعب لك الطبيب علاجها إضافياً بالمضادات الحيوية لمكمل العلاج بسيبيكتروم.

- لدى الأطفال والراهقين

يستعمل سيبيكتروم لدى الأطفال والراهقين تحت إشراف طبيب مختص. علاج العدوى الخرئومية التالية:

- عدوى المسالك البولية المعقدة بما في ذلك العدوى التي وصلت إلى الكلى (النهاب المويهضة والكللية).

- التعرض لمرض الحصرة الخبيثة.

ويمكن أيضاً استخدام سيبيكتروم في علاج باقي أنواع العدوى الخاصة بالأطفال والراهقين، بما في ذلك العدوى التي يصعب علاجها.

4. الجرعة وكيفية الاستعمال:

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. خفف مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت هي شكل

سيشرح لك طبيب بالضبط كمية سيبيكتروم التي تحتاجها وتردد التناول ومدة العلاج.

ويعتمد ذلك على نوع العدوى وحدها.

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى لأنه قد يتسبب تكثيف جرعة الماء.

يدوم العلاج عادة من 5 أيام إلى 21 يوماً ولكن هذه المدة قد تطول في حالات العدوى الشديدة.

اعمل دائمًا على احترام الجرعة التي يوصي بها الطبيب واستشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي شك بشأن عدد أقراص سيبيكتروم التي ينبغي أن تتناولها أو كيفية تناولها.

أ. ابلغ الأفراد مع كمية كبيرة من المشروب. قلب أن تضفيها لأن مذاقها سيء.

بـ. اعمل على تناول الأقراص في نفس الوقت تقريبًا من كل يوم.

ثـ. يمكنك تناول الأقراص مع الوجبات أو خارجهما، ولا يؤثر الكالسيوم للوجود في الوجبة.

ثـ. أخيرًا خطيرًا على مفعول هذا الدواء ومع ذلك، يجب أن تتناول أقراص سيبيكتروم مع منتجات الألبان مثل الجلبي أو اليوقوت أو حسبر الفاكهة المدعّم (مثل عصير البرتقال المدعّم بالكالسيوم).

اعمل دائمًا على تناول الكثير من الماء خلال فترة العلاج بسيبيكتروم

5. مواعي الإستعمال:

لا تأخذ أبداً سيبيكتروم إذا كنت:

- تعاني من حساسية جلأ للادة النشطة أو باقي الماء من فئة الكينولون أو أي مكون آخر من مكونات سيبيكتروم، انظر المقدمة: (المكونات).

- تتناول ثيروتيroidين (انظر المقدمة: (8)).

# LABORATOIRE ABDELMOUMEN D'ANALYSES MEDICALES

Docteur Asmae LAMJOUN  
INPE :083060640  
ICE : 001636557000050  
IF:40122309

Angle rue Jakarta et rue Lieutenant Belhoucine  
Résidence Saidi, Appartement N° 2  
OUJDA  
Taxe professionnelle:10837042

Oujda le 19 juin 2020

Mme CHIHAB MALIKA

FACTURE N°	82995
------------	-------

Analyses :

Examen Cytobactériologique des urines -----	B   120   Total : B 120
---	-------------------------

TOTAL DOSSIER	150,00 DH
---------------	-----------

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Cent Cinquante Dirhams



# LABORATOIRE ABDELMOUMEN D'ANALYSES MEDICALES

Docteur Asmae LAMJOUN

INPE :083060640

ICE : 001636557000050

IF:40122309

Angle rue Jakarta et rue Lieutenant Belhoucine

Résidence Saidi, Appartement N° 2

OUJDA

Taxe professionnelle:10837042

Oujda le 1 juin 2020

Mme CHIHAB MALIKA

FACTURE N°	81364
------------	-------

## Analyses :

Clearance à la créatinine -----	B	50
Acide urique -----	B	30
Hémoglobine glycosylée HBA1C -----	B	100
Examen Cytoactériologique des urines -----	B	120

## Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
TOTAL DOSSIER		300,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Trois Cents Dirhams

ABDELMOUMEN  
Dr Asmae LAMJOUN  
Résidence Saidi - OUJDA  
tel: 0536 60 74 75 / 0536 68 74 75



# مختبر التحاليل الطبية عبد المؤمن

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN  
Spécialiste en Biologie Clinique

الدكتورة أسماء لمجون  
أخصائية في البيولوجيا السريرية

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR  
Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

Dossier créé le : 01/06/20

Édité le : 03/06/20

Prélèvement effectué à 09:39

Mme CHIHAB MALIKA

Dossier : 20F86

Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 4/5

### ANTIBIOGRAMME

Nature du germe : *Escherichia coli* Prélèvement URINES

#### BETA LACTAMINES

Ampicilline	Résistant	<i>Amblosin, Magnipen, Totapen ...</i>
Amoxicilline	Résistant	<i>Amoxil, Clamox, Agram, Hiconcil, Amodox, Bristamox ...</i>
Amoxi + Ac.clavulanique	Résistant	<i>Augmentin, Amoclavin, Clavulin</i>
Ticarcilline	Résistant	<i>Ticarene</i>
Ampicilline + Sulbacatam	Résistant	<i>Unasyn</i>
Ticartil. ac. clavul.	Résistant	<i>Claventin</i>
Imipénème	SENSIBLE	<i>Tiénam</i>

#### AMIDINOPENICILLINES

Mecillinam	Résistant	<i>selexid</i>
------------	-----------	----------------

#### BETA LACTAMINES

Cefalotine	Résistant	<i>Kéflin, Céfalotine</i>
Céfaclor	Résistant	<i>Alfatil</i>
Céfuroxime	SENSIBLE	<i>Zinacef, Curoxime, Zinnat</i>
Cefoxitine	SENSIBLE	<i>Méfoxin</i>
Ceftriaxone	SENSIBLE	<i>Kocéphine, Triaxon</i>
Ceftazidime	SENSIBLE	<i>Fortum, Kafadim</i>
Céfotaxime	SENSIBLE	<i>Claforan</i>
Cefixime	SENSIBLE	<i>Oroken</i>

#### AMINOSIDES

Amikacine	SENSIBLE	<i>Amiklin</i>
Gentamicine	Résistant	<i>Gentalline, Gentamen, Cidomycine</i>
Tobramycine	SENSIBLE	<i>Nebcine</i>

#### QUINOLONES

Ciprofloxacine	Résistant	<i>Ciproxine, Ciflox, Catex, Sepcen</i>
Acide nalidixique	Résistant	<i>Apurone, Negram, Nalixine</i>
Norfloxacine	Résistant	<i>Noroxine</i>
Ofloxacine	Résistant	<i>Oflacet</i>

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

ABDELMOUMEN

Dr Asmae LAMJOUN

Résidence Saidi - Oujda

Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75



# مختبر التحاليل الطبية عبد المؤمن

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN

Spécialiste en Biologie Clinique

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR  
Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

الدكتورة أسماء لمجون

أخصائية في البيولوجيا السريرية

Dossier créé le : 19/06/20

Édité le : 20/06/20

Prélèvement effectué à 07:56

Mme CHIHAB MALIKA

Dossier : 20F113D

Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 1/1

### BACTERIOLOGIE EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES (ECBU)

#### EXAMEN MACROSCOPIQUE

Aspect ----- : Clair.  
Couleur ----- : Jaune paille.

#### EXAMEN CHIMIQUE

Glucose ----- :	Absence.
Corps cétoniques ----- :	Absence.
Sang ----- :	Absence.
Protéines ----- :	Absence.
Nitrites ----- :	Absence.
pH ----- :	6,0 N: 5,4-7,2

#### EXAMEN MICROSCOPIQUE

Leucocytes ----- :	6 000 /ml N < 10 000
Hématies ----- :	3 000 /ml N < 5000
Cellules épithéliales ----- :	Rares.
Cristaux ----- :	Absence.
Cylindres ----- :	Absence.
Levures ----- :	Absence.
Parasites ----- :	<b>Absence.</b>
Flore bactérienne ----- :	Absence de germes à l'examen direct.

#### CULTURES BACTERIOLOGIQUES

Culture ----- : **Négative.**

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES  
ABDELMOUMEN  
DR ASMAE LAMJOUN  
Résidence Saidi - Oujda  
Tél: 05 36 68 74 74 - Fax: 05 36 68 74 75



# مختبر التحاليل الطبية عبد المؤمن

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN  
Spécialiste en Biologie Clinique

الدكتورة أسماء لمجون  
أخصائية في البيولوجيا السريرية

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR  
Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

Dossier créé le : 01/06/20

Edité le : 03/06/20

Prélèvement effectué à 09:39

Mme CHIHAB MALIKA

Dossier : 20F86


Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 1/5

## BIOCHIMIE

### CLEARANCE A LA CREATININE

Selon la formule du MDRD - (Modification of the Diet in Renal Disease)



Débit de filtration glomérulaire (DFG) ----- : 65 ml/mn/1,73 m<sup>2</sup>

67

Stades MRC	Définitions (ml/mn/1,73 m <sup>2</sup> )	DFG
1	Pas d'insuffisance rénale	>=90
2	Insuffisance rénale légère	60 - 89
3	Insuffisance rénale modérée	30 - 59
4	Insuffisance rénale sévère	15 - 29
5	Insuffisance rénale très sévère	< 15

MRC : maladie rénale chronique

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES  
ABDELMOUMEN  
Dr Asmae LAMJOUN  
Résidence Saidi - OUJDA  
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75



# مختبر التحاليل الطبية عبد المؤمن

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN  
Spécialiste en Biologie Clinique

الدكتورة أسماء لمجون  
أخصائية في البيولوجيا السريرية

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR  
Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

Dossier créé le : 01/06/20

Édité le : 03/06/20


Prélèvement effectué à 09:39

Mme CHIHAB MALIKA

Dossier : 20F86

Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 2/5




Hémoglobine glycosylée (HbA1C) ----- : 7,60 % 8,30  
(Technique H.P.L.C.)

Interprétation:  
Sujet non diabétique: 4 < HbA1c < 6,2

Sujet diabétique:

HbA1c < 7	: Excellent équilibre glycémique.
7 < HbA1c < 9	: Assez bon équilibre glycémique.
9 < HbA1c < 10	: Equilibre glycémique médiocre.
HbA1c > 10	: Mauvais équilibre glycémique.



LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES  
ABDELMOUMEN  
Dr Asmae LAMJOUN  
Résidence Saidi - OUJDA  
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75



# مختبر التحاليل الطبية عبد المؤمن

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ABDELMOUMEN

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Immunologie

Dr Asmae LAMJOUN  
Spécialiste en Biologie Clinique

الدكتورة أسماء لمجون  
أخصائية في البيولوجيا السريرية

Diplômée de l'Université de Pharmacie de MONASTIR  
Ex - Attachée aux CHU de SOUSSE et MONASTIR

Dossier créé le : 01/06/20

Édité le : 03/06/20

Prélèvement effectué à 09:39

Mme CHIHAB MALIKA

Dossier : 20F86

Docteur Safae EL Mekkaoui

Page : 5/5

SULFAMIDES

Triméthoprime + Sulfamide	Résistant	Bactrim, Eusaprim, Microcetim
---------------------------	-----------	-------------------------------

POLYPEPTIDES

Colistine	SENSIBLE	Colimycine
-----------	----------	------------

AUTRES

Furanes	SENSIBLE	Antinal, Ercéfuril, Furatandine, Furadoïne
---------	----------	--

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES  
ABDELMOUMEN  
Dr Asmae LAMJOUN  
Résidence Saidi - Oujda  
Tél: 0536 68 74 74 - Fax: 0536 68 74 75