

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2/03/2020	CG		156,00	INP : 091263261

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AN-NIA Pt. Assafa Imm. 18 N°4A Oujda - Casablanca Tél : 05 22 93 46 33	21/3/20	218,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

	Traitements	Soins	
			COEFFICIENT DES TRAVAUX
			MONTANTS DES SOINS
			DEBUT D'EXECUTION
			FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	MONTANTS DES SOINS
	DATE DU DEVIS
	DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'E



Ordonnance

Casablanca, le

07/03/2020

Dr. HAROULTI IDRISS

50,70 1)

Riacen 8pp

18pp; ~~soin~~ matin x 10j

53,10 2)

Relaxol

1x3 qm y a x 5j

89,50 3)

lixifor

gel soin au vulve

24,70 4)

taraxet 25

1; soin

218,00

* 31.

Thiobactin

Lot/A consommé
de 19221 0723 REF. 317M

LOT	PER
Prix	89,50

89,50

24,70



50,70



رولاكسول[®] 500 ملغ/2 ملغ

باراسيتامول/ثيوكولشيكوزيد

أقراس

يوضح هذا الدواء المراقبة الإضافية ستمكن من التعرف بسرعة على المعلومات الجديدة المرتبطة بالسلامة. يمكنك المساهمة فيها بالإبلاغ عن أي تأثير غير مرغوب فيه تتم ملاحظته. انظر نهاية الفقرة 4 كيف يتم التصريح عن التأثيرات الثانوية.

يرجى الإطلاع بانتباه على هذه النشرة بأكملها قبل استعمال هذا الدواء.

• احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها من جديد. • إذا كان لديك أي سؤال آخر، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي. • لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم بإعطائه لشخص آخر، حتى في حال وجود أعراض مشابهة، لأنك قد تسبب الضرر له. • إذا أصبح أحد التأثيرات غير المرغوب فيها خطراً أو لاحظت أي تأثير غير مرغوب فيه، فيذكر في هذه النشرة، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

1. ما هو رولاكسول وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

يوصف هذا الدواء في علاج تكميلي للتقلصات العضلية المؤلمة في الأمراض المفصليّة لدى البالغين والمراهقين ابتداء من سنة 16.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول رولاكسول؟

لا تتناول أبداً رولاكسول في الحالات التالية: • إذا كانت لديك حساسية لثيوكولشيكوزيد أو باراسيتامول أو لأحد المكونات الأخرى للدواء (المذكورة في الفقرة 6). • إذا كنت حاملاً

• قد تصبحين حاملاً أو تعتقدين أنك حامل. • إذا كنت من النساء في سن الإنجاب لا تستعملين وسيلة لمنع الحمل. • إذا كنت ترضعين. • قصور كبدي خلوي أو مرض خطير في الكبد. • لدى الأطفال دون 16 سنة.

في حالة الشك، من الضروري استشارة

الصيدلي أو الطبيب.

يجب الانتباه عند استعمال رولاكسول

استيجمات أو الحساسية عند استعمال رولاكسول

تتطلب ظهور أدوية

في حالة جرعة مفرصة

الفور.

يحتوي هذا الدواء على بار. تتناول أدوية أخرى تحتوي على بار. لا تجمع بينها حتى لا تتجاوز الجرعة

تعليمات خاصة: في حالة الإسهال، أخبر الطبيب.

في حالة ألم المعدة، غثيان، قيء، أخبر الطبيب.

احترم تماماً جرعات ومدة العلاج الموصوفة في الفقرة 3. يجب عدم استعمال هذا الدواء

بجرعة أكبر (أي 8 أقراص من رولاكسول) أو لمدة تتجاوز 7 أيام. وذلك لأن المواد المكونة في

جسمك عندما تتناول ثيوكولشيكوزيد بجرعات مفرطة قد تتسبب في إصابات في بعض

الخلايا (عدد غير عادي من الصفيحات). وتمت البرهنة على ذلك خلال دراسات لدى

الحيوانات والدراسات في المختبر. لدى الإنسان، يعتبر هذا النوع من الإصابات الخلوية عامل

خطر لظهور السرطان، لتغير الخصوية الذكرية وقد يشكل خطراً على المولود. يجب التحذير

إلى الطبيب إذا كان لديك المزيد من الأسئلة.

سوف يخبرك الطبيب عن كافة التدابير المرتبطة بمنع الحمل الفعال والمخاطر المحتملة

للحمل.

تُحدد مدة العلاج في 7 أيام متتالية.

قبل الشروع في العلاج بهذا الدواء، تحقق من عدم تناول أدوية أخرى تحتوي على

باراسيتامول.

تناول الباراسيتامول يمكن أن يسبب اضطرابات وظائف الكبد.

أخبر الطبيب: • إذا كان وزنك يقل عن 50 كلغ. • إذا كنت تعاني من مرض كبدي أو مرض

خفي في الكلى. • إذا كنت تستهلك الكحول كثيراً أو توقفت عن استهلاك الكحول مؤخراً. •

إذا كنت تعاني من فقدان الماء من الجسم. • إذا كنت تعاني مثلاً من سوء التغذية المزمن.

يفوق 65 سنة وتعالج من أمراض طويلة الأمد، إذا كنت مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية

أو بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن، إذا كنت تعاني من التليف الكبدي (مرض جيني وراثي

يتسم خاصة بإصابات تنفسية خطيرة)، أو إذا كنت مصاباً بمرض جيلير (مرض وراثي مقترن

بارتفاع بيليروبين في الدم).

ينصح بعدم استهلاك المشروبات الكحولية خلال العلاج.

في حالة الانقطاع حديث العهد عن الإدمان المزمن على الكحول، يتزايد خطر الإصابة بالكبدية.

في حالة التهاب الكبد الفيروسي الحاد، توقف عن العلاج واستشر الطبيب.

في حالة مشكلة التغذية (سوء التغذية) أو فقدان الماء من الجسم، يجب تناول رولاكسول،

أقراس بكل حذر

الأطفال والمراهقون: لا تستعمل هذا الدواء لدى الأطفال أو المراهقين دون 16 سنة لأسباب

السلامة.

في حالة الشك، لا تردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تناول أو استعمال أدوية أخرى: ينبغي ألا تتناول هذا الدواء إذا وصف لك الطبيب تحليل

نسبة الحمض البوريك في الدم أو نسبة السكر في الدم.

لا تتناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول. قد تتعرض لخطر جرعة مفرطة.

إذا كنت تتبع علاجاً مضاداً لتشنج الدم عن طريق الفم (وارفارين أو مضاد فيتامين K)، فإن

تناول باراسيتامول بالجرعات القصوى (4 غ/اليوم) لأكثر من 4 أيام يتطلب مراقبة مشددة

للتحليلات الجيولوجية بما فيها خاصة النسبة القياسية الدولية. في هذه الحالة، استشر الطبيب.

قد تتناقص فعالية باراسيتامول إذا كنت تتناول في نفس الوقت الرانينجات المخيلة - دواء

يخفض نسبة الكولسترول في الدم (أحترم فاصلاً زمنياً لأكثر من ساعتين بين كل جرعتين).

إذا حصلت في نفس الوقت على باراسيتامول وعلاج بفولوكساسيبين (مضاد حيوي)، قد

تتأخر المعالاة من حمض أيبهي (حموضة سامة في الدم بسبب تسرع معدل التنفس).

قد يزداد تأثير باراسيتامول إذا كنت تتناول:

• أدوية من المحتمل أن تكون سامة للكبد. • أدوية تحفز إنتاج الأيض السام الباراسيتامول

مثل الأدوية المضادة للصرع (فينوباربيتال، فينيتوين، كاربامازيبين، توبيرامات). •

ريفامبينيس (مضاد حيوي). • في نفس الوقت مع الكحول.

أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي دواء آخر.

قد يزداد رولاكسول من الطابع السام لكحولامينيكول.

الحمل والرضاعة والخصوبة

لا تتناول هذا الدواء. • إذا كنت حاملاً. قد تصبحين حاملاً أو تعتقدين أنك حامل. • إذا

كنت من النساء في سن الإنجاب ولا تستعملين وسيلة لمنع الحمل.

هذا الدواء قد يعرض المولود للخطر. لا تتناول هذا الدواء إذا كنت ترضعين، لأنه ينتقل إلى

