

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles


- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 0 Réclamation | contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | adhésion@mupras.com |

N° W19-540287

33724

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autre
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	1896	Société : Royal Air Maroc	
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : GHAZZAL DRISSIA			
Date de naissance : 28/11/1953			
Adresse : Aeracity CASA ANFA IMM I 10 th étage			
Apt 10			
Tél. : 0675364754 Total des frais engagés : 1704,00			

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade :			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Age: 29/11/1953			
Nature de la maladie :			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'adhérent.			



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Le : 11/10/20

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
				INP : <input type="text"/>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	11/07/16	1704,-

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Designation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est p^{re} de préciser la dent traitée l'acte pratique en indiquant la nature des soins

Important:

EFFICIENT INTERVALS

MILITANTS EDITIONS

庚子年
同人集

卷之三

EDUCATIONAL TECHNIQUES

MANUFACTURERS

1324 (18)

卷之三

O.D.F.
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

[Creation, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'

Docteur Mouad CRIQUECH

Spécialiste
Maladies du cœur et des vaisseaux



الدكتور معاد كريشك

اختصاصي
في أمراض القلب و الشرايين

Casablanca le : 06/06/2020

248,- x 6

1 - COVERSYL 10 MG

72, ^{1 comprimé par jour}
2 - DETENSIEL 10mg

1/2-0-1/2

Mme GHAZZAL DRISSIA

1704,-



traitement de 6 mois

Docteur Mouad CRIQUECH
Cardiologue
262 Bd. Yaâcoub El Mansour, Casablanca
Tél. 05 22 94 09 10 - GSM : 06 62 80 19 75

262, Bd. Yaâcoub El Mansour - Casablanca - Tél. : 05 22 94 09 10 - GSM : 06 62 80 19 75

NOTICE · INFORMATION DE L'UTILISATEUR

7870801017

DÉTENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

7862160236

PPV : 72,00 DH
Distribué par Cooper Pharma

**DÉTENSIEL® mg,
comprimé pelliculé sécable**

Bisoprolol fumarate

MERCK

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

La posologie doit être adaptée individuellement. La dose habituelle pour les adultes est de un comprimé de Détensiel 10 mg, une fois par jour.

Dans les cas sévères, la dose peut être augmentée à 20 mg une fois par jour.

Dans tous les cas, la posologie doit être adaptée individuellement et progressivement, en fonction notamment de la fréquence cardiaque et de la réponse au traitement.

Durée du traitement

Le traitement par Détensiel est généralement un traitement au long cours.

Posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique et/ou rénale

Aucune adaptation posologique n'est généralement nécessaire chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique ou rénale de sévérité légère à modérée.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min) et chez les patients présentant des troubles sévères de la fonction hépatique, la dose maximale est de 10 mg par jour.

Posologie chez les personnes âgées

Le traitement doit être initié avec des faibles doses (5 mg) et sous

NOTICE · INFORMATION DE L'UTILISATEUR

7870801017

DÉTENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

7862160236

PPV : 72,00 DH
Distribué par Cooper Pharma

**DÉTENSIEL® mg,
comprimé pelliculé sécable**

Bisoprolol fumarate

MERCK

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

La posologie doit être adaptée individuellement. La dose habituelle pour les adultes est de un comprimé de Détensiel 10 mg, une fois par jour.

Dans les cas sévères, la dose peut être augmentée à 20 mg une fois par jour.

Dans tous les cas, la posologie doit être adaptée individuellement et progressivement, en fonction notamment de la fréquence cardiaque et de la réponse au traitement.

Durée du traitement

Le traitement par Détensiel est généralement un traitement au long cours.

Posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique et/ou rénale

Aucune adaptation posologique n'est généralement nécessaire chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique ou rénale de sévérité légère à modérée.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min) et chez les patients présentant des troubles sévères de la fonction hépatique, la dose maximale est de 10 mg par jour.

Posologie chez les personnes âgées

Le traitement doit être initié avec des faibles doses (5 mg) et sous

NOTICE · INFORMATION DE L'UTILISATEUR

7870801017

DÉTENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

7862160236

PPV : 72,00 DH
Distribué par Cooper Pharma

**DÉTENSIEL® mg,
comprimé pelliculé sécable**

Bisoprolol fumarate

MERCK

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

La posologie doit être adaptée individuellement. La dose habituelle pour les adultes est de un comprimé de Détensiel 10 mg, une fois par jour.

Dans les cas sévères, la dose peut être augmentée à 20 mg une fois par jour.

Dans tous les cas, la posologie doit être adaptée individuellement et progressivement, en fonction notamment de la fréquence cardiaque et de la réponse au traitement.

Durée du traitement

Le traitement par Détensiel est généralement un traitement au long cours.

Posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique et/ou rénale

Aucune adaptation posologique n'est généralement nécessaire chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique ou rénale de sévérité légère à modérée.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min) et chez les patients présentant des troubles sévères de la fonction hépatique, la dose maximale est de 10 mg par jour.

Posologie chez les personnes âgées

Le traitement doit être initié avec des faibles doses (5 mg) et sous

COVERSYL® 10 mg

Péridopril arginine, comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement cette notice de médicament car elle contient des informations importantes pour vous..

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir des réponses à vos questions.
- Si vous avez toute autre question, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé. Les informations sur la manière de prendre ce médicament sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Il pourra évaluer si ce médicament ou un autre médicament que vous prenez ensemble sont responsables de l'effet indésirable.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

des informations importantes

COVERSYL® Péridopril arginine Comprimés pelliculés 10 mg

30
Comprimés pelliculés



• les traitements de l'hypertension artérielle, des collapsus ou de l'asthme (éphédrine, noradrénaline ou adrénaline) ;

• l'arthrite rhumatoïde (utilisé lors d'administration intraveineuse (utilisés dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde).

• comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

• prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé avant un repas.

• et que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez

• lancer conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre

• votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte ou planifiez lancer conseil à votre médecin ou pharmacien normalement d'arrêter de prendre comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place. COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

• médecin si vous allez ou êtes sur le point de commencer à prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé est déconseillé aux femmes qui allaient pourront choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si vous êtes enceinte ou planifiez lancer conseil à votre médecin ou pharmacien.

• et utilisez de machines

• comprimé pelliculé n'affecte pas la vigilance mais des sensations de fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou utiliser de machines peut être diminuée.

• comprimé pelliculé sécable contient du lactose monohydraté. Si vous avez informé d'une intolérance à certains sucre, contactez le avant d'édicament.

RENDRE COVERSYL 10 MG, COMPRIME COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

• prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre pharmacien en cas de doute. Il vous recommandera de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé avec un verre d'eau, de préférence à la même heure chaque jour.

• déclara la dose adaptée pour vous.

• toutes sont les suivantes :

• initiale: la dose usuelle initiale et la dose d'entretien est de 5 mg par jour. Si vous avez une maladie de la pression artérielle dans l'hypertension, âgé de 65 ans ou plus, la dose usuelle initiale est de 2,5 mg par jour.

• de traitement, cette dose peut être augmentée à 5 mg par jour puis, si nécessaire, à 10 mg par jour.

• stable: la dose usuelle initiale est de 5 mg par jour. Après 2 semaines, peut être augmentée à 10 mg par jour, qui est la dose maximale recommandée pour cette indication.

• Si vous avez 65 ans ou plus, la dose usuelle initiale est de 2,5 mg par jour. Après 2 semaines, cette dose peut être augmentée à 5 mg par jour puis à 10 mg par jour, la dose suivante.

• Si vous avez pris plus de COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû prendre, ou trop de comprimés, contactez immédiatement l'hôpital le plus proche ou votre médecin. L'événement le plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension pouvant se traduire par des vertiges ou des étourdissements. Si cela se produit, allongez-vous, jambes relevées.

• Si vous oubliez de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé

• Il est important de prendre votre médicament chaque jour car un traitement régulier est plus efficace. Cependant, si vous avez oublié de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, le jour suivant reportez simplement votre traitement comme d'habitude.

• Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

• Si vous arrêtez de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé

• Le traitement par COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé étant généralement un traitement de longue durée, vous devez demander conseil à votre médecin avant de l'interrompre.

• Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

• Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne se produisent pas systématiquement chez tout le monde.

COVERSYL® 10 mg

Péridopril arginine, comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement cette notice de médicament car elle contient des informations importantes pour vous..

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir des réponses à vos questions.
- Si vous avez toute autre question, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé. Les informations sur la manière de prendre ce médicament sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Il pourra évaluer si ce médicament ou un autre médicament que vous prenez ensemble sont responsables de l'effet indésirable.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

des informations importantes

COVERSYL® Péridopril arginine Comprimés pelliculés 10 mg

30
Comprimés pelliculés



• les traitements de l'hypertension artérielle, des collapsus ou de l'asthme (éphédrine, noradrénaline ou adrénaline) ;

• l'arthrose (utilisé lors d'administration intraveineuse (utilisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde).

• comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

• prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé avant un repas.

• et que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez

• lancer conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre

• votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte ou planifiez lancer conseil à votre médecin ou pharmacien normalement d'arrêter de prendre comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place. COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

• médecin si vous allez ou êtes sur le point de commencer à prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé est déconseillé aux femmes qui allaient pourront choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si vous êtes enceinte ou planifiez lancer conseil à votre médecin ou pharmacien.

• et utilisez de machines

• comprimé pelliculé n'affecte pas la vigilance mais des sensations de fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou utiliser de machines peut être diminuée.

• comprimé pelliculé sécable contient du lactose monohydraté. Si vous avez informé d'une intolérance à certains sucre, contactez le avant d'édicament.

RENDRE COVERSYL 10 MG, COMPRIME COMPRIME PELLICULÉ ?

• prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre pharmacien en cas de doute. Il vous recommandera de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, avant un verre d'eau, de préférence à la même heure chaque jour.

• déclara la dose adaptée pour vous.

• autres sont les suivantes :

• initiale: la dose usuelle initiale et la dose d'entretien est de 5 mg par jour. Si vous avez une maladie de la pression artérielle dans l'hypertension, âgé de 65 ans ou plus, la dose usuelle initiale est de 2,5 mg par jour.

• de traitement, cette dose peut être augmentée à 5 mg par jour puis, si nécessaire, à 10 mg par jour.

• stable: la dose usuelle initiale est de 5 mg par jour. Après 2 semaines, peut être augmentée à 10 mg par jour, qui est la dose maximale recommandée pour cette indication.

• Si vous avez 65 ans ou plus, la dose usuelle initiale est de 2,5 mg par jour. Après 2 semaines, cette dose peut être augmentée à 5 mg par jour puis à 10 mg par jour, la dose suivante.

• Si vous avez pris plus de COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû prendre, ou trop de comprimés, contactez immédiatement l'hôpital le plus proche ou votre médecin. L'événement le plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension pouvant se traduire par des vertiges ou des étourdissements. Si cela se produit, allongez-vous, jambes relevées.

• Si vous oubliez de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé

• Il est important de prendre votre médicament chaque jour car un traitement régulier est plus efficace. Cependant, si vous avez oublié de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, le jour suivant reportez simplement votre traitement comme d'habitude.

• Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

• Si vous arrêtez de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé

• Le traitement par COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé étant généralement un traitement de longue durée, vous devez demander conseil à votre médecin avant de l'interrompre.

• Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

• Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne se produisent pas systématiquement chez tout le monde.

COVERSYL® 10 mg

Péridopril arginine, comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement cette notice de médicament car elle contient des informations importantes pour vous..

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir des réponses à vos questions.
- Si vous avez toute autre question, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé. Les informations sur la manière de prendre ce médicament sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Il pourra évaluer si ce médicament ou un autre médicament que vous prenez ensemble sont responsables de l'effet indésirable.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

des informations importantes

COVERSYL® Péridopril arginine Comprimés pelliculés 10 mg

30
Comprimés pelliculés



• les traitements de l'hypertension artérielle, des collapsus ou de l'asthme (éphédrine, noradrénaline ou adrénaline) ;

• l'arthrose (utilisé lors d'administration intraveineuse (utilisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde).

• comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

• prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé avant un repas.

• et que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez

• lancer conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre

• votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place. COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de cela pourraient nuire gravement à votre enfant.

• médecin si vous allez ou êtes sur le point de commencer à prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé est déconseillé aux femmes qui allaient pourront choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si vous êtes enceinte d'un nouveau-né ou un prématuré.

• utilisation de machines

• comprimé pelliculé n'affecte pas la vigilance mais des sensations de fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent survenir chez certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou utiliser des machines peut être diminuée.

• comprimé pelliculé sécable contient du lactose monohydraté. Si vous avez informé d'une intolérance à certains sucre, contactez le avant d'utiliser ce médicament.

RENDRE COVERSYL 10 MG, COMPRIME COMPRIME PELLICULÉ ?

• prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre pharmacien en cas de doute. Il vous recommandera de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé avec un verre d'eau, de préférence à la même heure chaque jour.

• déclara la dose adaptée pour vous.

• toutes sont les suivantes :

• initiale: la dose usuelle initiale et la dose d'entretien est de 5 mg par jour. Si vous avez une maladie de la pression artérielle dans l'hypertension, âgé de 65 ans ou plus, la dose usuelle initiale est de 2,5 mg par jour.

• de traitement, cette dose peut être augmentée à 5 mg par jour puis, si nécessaire, à 10 mg par jour.

• stable: la dose usuelle initiale est de 5 mg par jour. Après 2 semaines, peut être augmentée à 10 mg par jour, qui est la dose maximale recommandée pour cette indication.

• Si vous avez 65 ans ou plus, la dose usuelle initiale est de 2,5 mg par jour. Après 2 semaines, cette dose peut être augmentée à 5 mg par jour puis à 10 mg par jour, la dose suivante.

• Si vous avez pris plus de COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû prendre, ou trop de comprimés, contactez immédiatement l'hôpital le plus proche ou votre médecin. L'événement le plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension pouvant se traduire par des vertiges ou des étourdissements. Si cela se produit, allongez-vous, jambes relevées.

• Si vous oubliez de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé

• Il est important de prendre votre médicament chaque jour car un traitement régulier est plus efficace. Cependant, si vous avez oublié de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, le jour suivant reportez simplement votre traitement comme d'habitude.

• Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

• Si vous arrêtez de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé

• Le traitement par COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé étant généralement un traitement de longue durée, vous devez demander conseil à votre médecin avant de l'interrompre.

• Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

• Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne se produisent pas systématiquement chez tout le monde.

COVERSYL® 10 mg

Péridopril arginine, comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement cette notice de médicament car elle contient des informations importantes pour vous..

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir des réponses à vos questions.
- Si vous avez toute autre question, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé. Les informations sur la manière de prendre ce médicament sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Il pourra évaluer si ce médicament ou un autre médicament que vous prenez ensemble sont responsables de l'effet indésirable.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice, contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

des informations importantes

COVERSYL® Péridopril arginine Comprimés pelliculés 10 mg

30
Comprimés pelliculés



• les traitements de l'hypertension artérielle, des collapsus ou de l'asthme (éphédrine, noradrénaline ou adrénaline) ;

• l'arthrose (utilisé lors d'administration intraveineuse (utilisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde).

• comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

• prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé avant un repas.

• et que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez

• lancer conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre

• votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place. COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de cela pourraient nuire gravement à votre enfant.

• médecin si vous allez ou êtes sur le point de commencer à prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé est déconseillé aux femmes qui allaient pourront choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si vous êtes enceinte d'un nouveau-né ou un prématuré.

• cules et utilisation de machines

• comprimé pelliculé n'affecte pas la vigilance mais des sensations de fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou utiliser des machines peut être diminuée.

• comprimé pelliculé sécable contient du lactose monohydraté. Si vous avez informé d'une intolérance à certains sucre, contactez le avant d'édicament.

RENDRE COVERSYL 10 MG, COMPRIME COMPRIME PELLICULÉ ?

• prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Si vous avez des questions, contactez votre pharmacien ou votre pharmacien en cas de doute. Il est préférable d'utiliser un verre d'eau, de préférence à la même heure chaque jour.

• déclara la dose adaptée pour vous.

• autres sont les suivantes :

• initiale: la dose usuelle initiale et la dose d'entretien est de 5 mg par jour. Si le traitement, cette dose peut être augmentée à 10 mg par jour.

• 0 mg par jour et dose maximale recommandée dans l'hypertension. Si vous avez plus de 65 ans ou plus, la dose usuelle initiale est de 2,5 mg par jour. Si le traitement, cette dose peut être augmentée à 5 mg par jour puis, si nécessaire, à 10 mg par jour.

• stable: la dose usuelle initiale est de 5 mg par jour. Après 2 semaines, peut être augmentée à 10 mg par jour, qui est la dose maximale recommandée pour cette indication.

• Si vous avez plus de 65 ans ou plus, la dose usuelle initiale est de 2,5 mg par jour. Après 2 semaines, cette dose peut être augmentée à 5 mg par jour puis à 10 mg par jour, la dose suivante.

• Si vous avez plus de COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû prendre, contactez immédiatement l'hôpital le plus proche ou votre médecin. L'événement le plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension pouvant se traduire par des vertiges ou des étourdissements. Si cela se produit, allongez-vous, jambes relevées.

• Si vous oubliez de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé Il est important de prendre votre médicament chaque jour car un traitement régulier est plus efficace. Cependant, si vous avez oublié de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé, le jour suivant reportez simplement votre traitement comme d'habitude.

• Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

• Si vous arrêtez de prendre COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé Le traitement par COVERSYL 10 mg, comprimé pelliculé étant généralement un traitement de longue durée, vous devez demander conseil à votre médecin avant de l'interrompre.

• Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

• Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne se produisent pas systématiquement chez tout le monde.

PHARMACIE NASRI
DR NASRI RACHID
75 BIS, BLOC 2 CITE COMMUNAL HAY HASSANI
CASABLANCA

11/07/2020

Tél : 0522932874

Mme GHAZZAL DRISSIA

PHARMACIE NASRI
Dr. Rachid NASRI
75bis, Bloc 2 Cite Communal
Hay Hassani - Casablanca
Tél : 0522 93 28 77

FACTURE N° : 131787 du 11/07/2020

Qté	Désignation	Prix PPV	Montant	TVA
3	DETENSIEL 10MG/30 CPS	72,00	216,00	0%
6	COVERSYL 10MG/ 30 CPS	248,00	1 488,00	0%

Total TTC 1 704,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :
MILLE SEPT CENT QUATRE DIRHAMS

	TAUX	HT	TVA	TTC
0%Ar91	0,00	216,00	0,00	216,00
0%Ar92	0,00	1 488,00	0,00	1 488,00
		1 704,00	0,00	1 704,00

PHARMACIE NASRI
Dr. Rachid NASRI
75bis, Bloc 2 Cite Communal
Hay Hassani - Casablanca
Tél : 0522 93 28 77

valable 3 mois

Le 06/06/2012

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné : *D. Chraïb et menouf*

Certifie que Mlle, Mme, M. : *GHAZZAL DRISSA*

Présente *LMA*

Nécessitant un traitement d'une durée de :

3 mois

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)