

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

Nº W19-539610

33830

Maladie       Dentaire       Optique       Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) 9278

Matricule : \_\_\_\_\_ Société : \_\_\_\_\_

Actif       Pensionné(e)       Autre : \_\_\_\_\_

Nom & Prénom : BENDOUR MOUNA

Date de naissance : 13/01/1969

Adresse : HABITUELLE

Tél. : 0661460111 Total des frais engagés : 1034,60 Dhs

الدفتر عبارة عن ملخص للزيارة المرضية

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES |                   |                       |                                 |   |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| Dates des Actes                | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes  |
| 3 JUIN 2020                    | S                 |                       | 38000                           | INP 141168145<br>الدكتور عبد العزيز العسلي<br>خصائص في أمراض العظام والغضاريف<br>Doctor Ahderrazek GUENNOUN<br>RHUMATOLOGIE |

| EXECUTION DES ORDONNANCES   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur  | Date     | Montant de la Facture |
| DR. JABOR<br>venue Mohammed<br>CGI - Rabat<br>tel: 05 37 72 24 34<br>Fax : 05 37 91 19 40 | 03/06/20 | 334,60<br>DRS         |

| ANALYSES - RADIographies  |            |                              |                        |
|---|------------|------------------------------|------------------------|
| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue   | Date       | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
| <p style="text-align: center;">الدكتور عزيز العلالي</p> <p>أخص العظام والمعاصل</p> <p>Doctor: Abderrazak GUENNOUNI</p> <p>RUMATOLOGUE</p> <p>1. Av. ALLAL BEN ABDELLAH, RABAT</p> | 2015-07-14 | Montant : 400 DH             |                        |

#### **VOLET ADHERENT**

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

الدكتور عبد الرزاق كنون  
Docteur Abderrazak GUENNOUN

RHUMATOLOGUE

Diplômé d'Etudes Médicales

Relatives à la Réparation Juridique

du Dommage Corporel

Université René-Descartes-Paris

Sur Rendez-vous

اختصاصي في أمراض العظام والمفاصيل

(الروماتيزم)

حاائز على دبلوم الدراسات الطبية المتعلقة

بالتعويض القانوني عن الضرر الجسدي

خريج كلية الطب بباريس

بالموعد

ج.م ٠٣ JUIN ٢٠٢٠ بمنصورة

87,00

+ Relaxium.

١٤١ ج.م

٤٩,٦٥ × ٢

= ٩٩,٣٠ + د. cure ٢٥٧.

٢ Amp / semaine en ١ seule pos.  
x ٤ semaines.

٦١,٥٥

+ Nolinic ١٥

١٤١ ج.م au rythme du repas le matin  
x ٧ ج

٨٦,٩٥

+ IPPSium ٢٠٠ ج.

ج.م ٣٣٤,٦٥ د. cure ١٤١ ج.م  
à jeun et au cas de la reper-

الدكتور عبد الرزاق كنون  
اختصاصي في أمراض العظام والمفاصيل  
Dr. Abderrazak GUENNOUN

RHUMATOLOGUE  
AV. ALLAL BEN ABDELLAH - RABAT  
Tél.: B. 05 37 72 24 34

PHARMACIE  
Dr. JABOUD  
Avenue Mohammed V, KM 18  
Casablanca, MOROCCO  
Tél/Fax: 05 37 01 10 40

CABINET DE RHUMATOLOGIE ET DES MALADIES OSTEOARTICULAIRES  
DOCTEUR GUENNOUN A.1, Av ALLAL BENABDELLAH, RABAT  
Tél :00 212 5 37 72 24 34/ FAX/00 212 5 37 20 23 21  
UNITE D'ECHOGRAPHIE OSTEO-ARTICULAIRE

COMPTE – RENDU D'ECHOGRAPHIE OSTEO-ARTICULAIRE

Rabat le 3/06/2020

- Non et Prénom : BENDOURO MOUNA
- Régions à explorer : MAINS
- Indication : ARTHRALGIE

Résultats:

Echographie des mains :

- Absence de synovite au niveau des radio carpiennes des 2 côtés
- Absence de synovite des radio ulnaires inférieures des 2 côtés
- Absence de synovite des MCP
- Absence de synovite des IPP
- Absence de ténosynovite des extenseurs et des fléchisseurs
- Pas d'épaississement du nerf médian

Dr. BENDOURO MOUNA  
Rhumatologue  
Av. ALLAL BEN ABDELLAH - RABAT  
Tél.: 05 37 72 24 34

**الدكتور عبد الرزاق كنون**  
**Docteur Abderrazak GUENNOUN**

RHUMATOLOGUE

Diplômé d'Etudes Médicales

Relatives à la Réparation Juridique

du Dommage Corporel

Université René-Descartes-Paris

Sur Rendez-vous

اختصاصي في أمراض العظام والمفاصيل

(الروماتيزم)

حاائز على دبلوم الدراسات الطبية المتعلقة

بالتغويض القانوني عن الضرر الجسدي

خريج كلية الطب بباريس

بالموعد

10 <sup>تموز</sup> - <sup>2023</sup> رسالة  
العنوان

Echographie de l'épaule.

= 400 Dhs

الدكتور عبد الرزاق كنون  
اختصاصي في أمراض العظام والمفاصيل  
Docteur Abderrazak GUENNOUN  
RHUMATOLOGUE  
1. Av. ALLAL BEN ABDELLAH - RABAT  
Tél.: 05 37 72 24 34

**SMB**



AMM N° : 24/16DMP/21/NNP  
108, Rue Pierre Parent, Casablanca, Maroc.  
Les laboratoires ERGO MAROC



Importé par :

Vitamine D3

Cholecalciférol 100 000 UI

# D-CURE® FORTE

3 ampoules buvables

PPV: 49,60 DH

LOT: 20C02

EXP: 03/2023

**SMB**



AMM N° : 24/16DMP/21/NNP  
108, Rue Pierre Parent, Casablanca, Maroc.

Les laboratoires ERGO MAROC



Importé par :

Vitamine D3

Cholecalciférol 100 000 UI

# D-CURE® FORTE

3 ampoules buvables

PPV: 49,60 DH

LOT: 20C02

EXP: 03/2023

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Elle contient des informations importantes sur votre traitement.  
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre  
médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été personnellement  
en cas de symptômes identiques, car cela  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir be

## 14 comprimés sécables

Uniquement sur ordonnance

15 mg

Meloxicam

Mobic®

Notice

**Mobic® 7,5 mg**

Meloxicam

comprimé

**Mobic® 15 mg**

Meloxicam

comprimé sécable

### Composition

La substance active est :  
meloxicam ..... 7,5 mg ou

Les autres composants sont :  
citrate de sodium, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, povidone, silice colloïdale et crospovidone, stéarate de magnésium.

Pour 1 comprimé.

**QU'EST CE QUE MOBIC 7,5 mg comprimé 15 mg comprimé sécable ET DANS QUEL EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament, présenté sous forme de comprimé ou comprimé sécable, est un anti-inflammatoire non stéroïdien.

Il est indiqué chez l'adulte

(plus de 15 ans), en traitement :

- de courte durée des douleurs aiguës d'arthrite
- de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires.

**INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE MOBIC 7,5 mg comprimé ou comprimé sécable**

**Ne pas utiliser Mobic 7,5 mg comprimé ou comprimé sécable dans les cas suivants**


- grossesse ou allaitement,
- antécédents d'allergie (crise d'asthme, rhinites, nasaux, brusques gonflement du cou et du visage, œdème de Quincke), urticaire déclenchée par ce médicament ou un médicament apparenté, tels que d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine,
- antécédents d'allergie à l'un des constituants du produit,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum ayant récidivé ou en évolution,
- maladie grave du foie,
- maladie grave des reins non dialysée,
- maladie grave du cœur,
- saignement de toute nature.

**Prendre des précautions particulières avec MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable :**


Il n'existe pas de données d'efficacité et de sécurité chez l'enfant de moins de 15 ans.

**AVANT LE TRAITEMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS :**

- d'antécédents digestifs (œsophagite, gastrite, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
- d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle,



61,50  
F.P.V 61,50  
FER 11722  
LOT 12543



### Grossesse

Il est recommandé d'éviter la prise de ce médicament au cours de la grossesse.

Votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament au cours des 6 premiers mois de votre grossesse.

**Toutefois, EN AUCUN CAS, CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS A PARTIR DU 3<sup>e</sup> TRIMESTRE DE LA GROSSESSE**, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela, même avec une seule prise.

### Allaitement

Par mesure de précaution, il convient d'éviter d'utiliser ce médicament pendant l'allaitement.

**IPPSIUM® 20 mg et 40 mg**  
Gélules gastro-résistantes  
Boîtes de 7 ; 14 et 28  
**ESOMEPRAZOLE**

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez qu'au d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra nuire.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez quelque chose non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

**IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**

**Composition qualitative et quantitative**

par gélule

Esomeprazole (DCI) sous forme d'Esomeprazole magnésique trihydrate ... 20 mg  
ou ..... 40 mg

Excipients (communs) : ..... q.s.p.

Excipients à effet Nostique :

Saccharose et Mannitol.

Classe pharmaco-thérapeutique :

Inhibiteur de la pompe à protons.

**DANS QUELLES CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Gélule à 20 mg.

**Adultes**

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation, votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IPPSIUM peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

**Adolescents âgés de 12 ans et plus**

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

L'ulcère de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation, votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Gélule à 40 mg.

**Adolescents**

- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

**Adolescents âgés de 12 ans et plus**

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?**

**Instructions pour un bon usage**

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous l'a dit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si besoin.

Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller.

Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

**Voie d'administration**

viale orale

**Mode d'administration**

Vous pouvez prendre vos gélules à n'importe quel moment de la journée pendant ou en dehors des repas.

Avez-vous gélules entières avec un verre d'eau. Les gélules comme leur contenu ne doivent pas être mordus ni croqués. En effet, les gélules contiennent des granules dont l'enrobage protège le médicament de la facilité de l'estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

**Pathologie**

Votre médecin vous dira le nombre de Gélules à prendre et la durée du traitement. Cela dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre foie.

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous :

**Adultes âgés de 18 ans et plus :**

Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides)

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'IPPSIUM une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une



14 gélules gastro-résistantes



6

6118000121107

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'excès d'acide.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est de 40 mg une fois par jour.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée

# Relaxium

---

## B6

300 mg



*1 gélule par jour*

magnésium  
vitamine B6

COMPLEXE RELAXANT

LOT: 200097  
DLUO: 03/2023  
87,00DH

VOIE ORALE  
30 GÉLULES

Deva

146-147 Zi. Tit Mellil - Casablanca

Laboratoires Deva Pharmaceutique  
J.OUAJDI Pharmacien Responsable

## CABINET DE RHUMATOLOGIE

BENDOURO MOUNA CABINET DE RHUMATOLOGIE

ID\_03-06-2020\_02-40-36-843 L14-5/38-MSK-[MAIN]

03/06/20


02 55 14

Optimal  
Freq 10.0M  
Prof 3.5cm  
vect 100%  
Gain 50%  
Aeq Haute  
EPP 56Hz  
Dyn 6dB  
Contrast  
Map 12  
Chroma 0  
Edges 0  
MI 0.06  
Carte Med

NERF MEDIAN GAUCHE

142

- + x1 B



## CABINET DE RHUMATOLOGIE

BENDOURO MOUNA CABINET DE RHUMATOLOGIE

ID\_03-06-2020\_02-40-36-843 L14-5/38-MSK-[MAIN]

03/06/20


02 52 57

Optimal  
Freq 10.0M  
Prof 3.5cm  
vect 100%  
Gain 50%  
Aeq Haute  
EPP 56Hz  
Dyn 6dB  
Contrast  
Map 12  
Chroma 0  
Edges 0  
MI 0.06  
Carte Med

PLEXUS  
TRICEPS  
GANT HF

70

- + x1 B



## CABINET DE RHUMATOLOGIE

BENDOURO MOUNA CABINET DE RHUMATOLOGIE

ID\_03-06-2020\_02-40-36-843 L14-5/38-MSK-[MAIN]

03/06/20


02 50 21

Optimal  
Freq 10.0M  
Prof 3.5cm  
vect 100%  
Gain 50%  
Aeq Haute  
EPP 56Hz  
Dyn 6dB  
Contrast  
Map 12  
Chroma 0  
Edges 0  
MI 0.06  
Carte Med

CANAL CARPE

142

- + x1 B



## CABINET DE RHUMATOLOGIE


BENDOURO MOUNA

CABINET DE RHUMATOLOGIE

03/06/20

02 47 46

PID\_03-06-2020\_02-40-36-843 L14-5/38-MSF-[MAIN]



Acquisition  
Freq 10.0M  
Depth 5cm  
Zoom 100%  
Gain 50%  
Avg. Hôte  
EPI 56Hz  
Doppler 0Hz  
Etc 0%  
Map 1%  
Chroma 0%  
Print 0%  
Mute 0%  
Clarte Med

FLAGEO - CARPELEENNE - GAUCHE

142



## CABINET DE RHUMATOLOGIE

BENDOURO MOUNA

CABINET DE RHUMATOLOGIE

03/06/20

02 46 58


PID\_03-06-2020\_02-40-36-843 L14-5/38-MSF-[MAIN]



Acquisition  
Freq 10.0M  
Depth 5cm  
Zoom 100%  
Gain 50%  
Avg. Hôte  
EPI 56Hz  
Doppler 0Hz  
Etc 0%  
Map 1%  
Chroma 0%  
Print 0%  
Mute 0%  
Clarte Med

FLAGEO - CARPELEENNE - DROIT

70



## CABINET DE RHUMATOLOGIE


BENDOURO MOUNA

CABINET DE RHUMATOLOGIE

03/06/20

02 42 47

PID\_03-06-2020\_02-40-36-843 L14-5/38-MSF-[MAIN]



Acquisition  
Freq 10.0M  
Depth 5cm  
Zoom 100%  
Gain 50%  
Avg. Hôte  
EPI 56Hz  
Doppler 0Hz  
Etc 0%  
Map 1%  
Chroma 0%  
Print 0%  
Mute 0%  
Clarte Med

FLAGEO - CARPELEENNE - DROIT

142

