

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Données générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontologie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19- 061000

ND: 33 980

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 18 39 Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : T. A. Z. A. A. A.

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06 65 83 1233 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° P19-061000

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des										
				Montant des soins										
				Début d'exécution										
				Fin d'exécution										
O.D.F. Prothèses dentaires	Détermination du coefficient masticatoire			Coefficient des travaux										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553	Montant des soins
	H													
	25533412	21433552												
	00000000	00000000												
00000000	00000000													
35533411	11433553													
(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession			Date du devis											
			Fin de											



W18-396666

DATE DE DÉPOT

03/07/2020

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle	1839
Nom & Prénom		TAOULIZI AHMED	
Fonction	RETRAITE	Phones	06 6523 1233
Mail			
MEDECIN		Prénom du patient	
Adhérent	☒ Conjoint	☐ Enfant	Age
Nature de la maladie		Date 03 JULI 2020	
Fracture 10e cote		Date 1ère visite	
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			
Chute l'été			
Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires	
Fr	1	300,-	
PHARMACIE		Date 03.07.2020	
Montant de la facture		587.80	
ANALYSES - RADIOGRAPHIES		Date 03.07.2020	
Désignation des Coefficients		Montant détaillé des Honoraires	
Rx Poupnet		200 DH	
AUXILIAIRES MEDICAUX		Date 13.03.2020	
Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
AM	PC	IM	IV

Dr. Abdelmoumen Zikri
Spécialiste en Traumatologie
et Chirurgie Orthopédique
22, Rue de Casablanca
05 50 54 71 11

Pharmacie Soufiane
Mme SOUFIANE
Rue Ben Attia (Bd. de Fez) - Tanger
Tél: 05 39 31 47 56 / 06 13 03 60 67

Dr. Bensouda Ahmed
Radiologue
Rue Ben Attia (Bd. de Fez) - Tanger
Tél: 05 39 31 47 56 / 06 13 03 60 67

Docteur Abdelmoumen Zian

SPECIALISTE EN TRAUMATOLOGIE
ET CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
MALADIES DES OS ET ARTICULATIONS
TRAUMATOLOGIE DE SPORT

Expert Assermenté auprès des Tribunaux

Diplômé de la faculté de Médecine

de Granada - Espagne

Ex. Chirurgien de l'hôpital Universitaire

de Granada - Espagne

Ex. Chirurgien au 3ème Hôpital

Militaire de Laayoune

(Aut. N° 10234 - Octobre 1989)

الدكتور عبد المومن زيان

أخصائي في جراحة العظام

أمراض العظام والمفاصل

أمراض الروماتيزم

خبير محلف لدى المحاكم

(خريج كلية الطب بقرنطة (إسبانيا)

من قداماء جراحي العظام بالمستشفى

(الجامعي بقرنطة (إسبانيا)

من قداماء جراحي العظام بالمستشفى

العسكري الثالثة بالعيون

(رخصة رقم 10234 أكتوبر 1989)

Tanger le 03 JUL 2020 طبعة في

CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE DR ZIAN

ORDONNANCE

NOM ET PRENOM : TAOUZI AHMED N° 11509

BREXIN 20 MG COMP EFFER (Boîte de 20)

1 comp le matin

DIVIDO 75 LP GELULES

1 gel le soir

CALSOE COMP

1 comp l'après midi

MYOBIL COMP

2 comp le soir au lit avant dormir

NOCICEPTOL GEL ANTIDOULEUR

2 aple par jour

INESO 20 COMP

1 comp par jour

CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

Immeuble BALEARES عمارة البليار

22 Rue de Belgique

222 شارع بلجيكا عمارة رقم 1 (أرض حدود محمد الخامس) طبعة

22, Rue de Belgique App. N° 1 (Près de la mosquée Mohammed V) - Tanger

Urgence : 06 61 20 60 17 : مختبر : 05 39 37 24 78 : الفاكس : Tél : 05 39 94 75 47 - Tanger

E-mail : zianadr@menara.ma - Site Web : www.ziandocteur.populus.ch

Docteur Abdelmoumen Zian

SPECIALISTE EN TRAUMATOLOGIE
ET CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
MALADIES DES OS ET ARTICULATIONS
TRAUMATOLOGIE DE SPORT

Expert Assermenté auprès des Tribunaux

Diplômé de la faculté de Médecine
de Granada - Espagne

Ex. Chirurgien de l'hôpital Universitaire
de Granada - Espagne

Ex. Chirurgien au 3ème Hôpital
Militaire de Laayoune

(Aut. N° 10234 - Octobre 1989)

الدكتور عبد المومن زيان

أخصائي في جراحة العظام

أمراض العظام والمفاصل

أمراض الروماتيزم

خبير محلف لدى المحاكم

(خريج كلية الطب بغرناطة (إسبانيا)

من قداماء جراحي العظام بالمستشفى

(الجامعي بغرناطة (إسبانيا)

من قداماء جراحي العظام بالمستشفى

العسكري الثالثة بالعيون

(رخصة رقم 10234 أكتوبر 1989)

10 3 JUIL 2020

Tanger le طبعة في

CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE DR. ZIAN

PATENTE N° 50119731 T.V.A. N°956268 R.C. N°26842 CNSS N° 2200864
ICE 002175263000041

HONORAIRES

NOM ET PRENOM : TAOUZI AHMED

TRAITEMENT : CONSULTATION

MONTANT : 300 DIRHAMS

ARRETE LA PRESENTE NOTES D'HONORAIRES A LA
SOMME DE : TROIS CENTS DIRHAMS

Centre de Traumatologie
et Chirurgie Orthopedique
Service Radiologie
22, Rue de Belgique App. N°1
Tél.: 0539 94 75 47 - Tanger

Dr. Abdelmoumen Zian
Spécialiste en Traumatologie
et Chirurgie Orthopédique
22, Rue de Belgique App. N°1
Tél.: 0539 94 75 47 - Urgences: 06 61 20 60 17

CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

Immeuble BALEARES عمارة البليار

22 Rue de Belgique

22, Rue de Belgique App. N°1 (Près de la mosquée Mohammed V) - Tanger

Urgence : 06 61 20 60 17 - هاتل: 05 39 94 75 47 - فاكس: 05 39 37 24 78 - هاتف: 05 39 94 75 47
E-mail: zianadr@menara.ma - Site Web: www.ziandocteur.populus.ch



فحص بالأشعة الشمال
RADIOLOGIE DU NORD
ХАЉ ОоНоеНое оНоеЛон

RESONANCE MAGNETIQUE 1.5 TESLA (IRM) - SCANNER MULTIBARETTE 3D - RADIOGRAPHIE - ECHOGRAPHIE - DOPPLER COULEUR - MAMMOGRAPHIE
IMAGERIE DE LA FEMME - PANORAMIQUE DENTAIRE - DENTASCANNER - CONE BEAM 3D - OSTEOIDENTISTOMETRIE CORPS ENTIER - RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Nom du patient(e): AHMED TAOUZI

Tanger, le: 03/07/2020

RADIOGRAPHIE DU THORAX ET DU GRIL COSTAL DROIT

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : traumatisme.

DESCRIPTION - OBSERVATIONS :

Elargissement de la silhouette cardio-médiastinale avec un index cardio thoracique supérieur à 0.5.

Transparence normale et symétrique des champs pulmonaires, soit pas de condensation pulmonaire systématisée.

Pas d'épanchement pleural. Pas de pneumothorax.

Fracture de l'arc antérieur/moyen de la 10^e côte droite (marche d'escalier millimétrique).

CONCLUSION :

Fracture de l'arc antérieur/moyen de la 10^e côte droite.
Pas de pneumothorax.

Nous vous remercions de nous avoir confié votre patient(e).
Confraternellement.

Dr Bouziane Asmae - Dr Bensouda Ahmed

Dr. Bensouda Ahmed
Radiologue
Rue Ben Attia (Bd. de Fès) - Tanger
Tél.: 05 39 37 47 56 / 06 13 03 60 67



فحص بالأشعة الشمال
RADIOLOGIE DU NORD
ХАЉ ОоНоећо оНоећоН

RESONANCE MAGNETIQUE 1.5 TESLA (IRM) - SCANNER MULTIBARETTE 3D - RADIOGRAPHIE - ECHOGRAPHIE - DOPPLER COULEUR - MAMMOGRAPHIE
IMAGERIE DE LA FEMME - PANORAMIQUE DENTAIRE - DENTASCANNER - CONE BEAM 3D - OSTEO DENTISTOMETRIE CORPS ENTIER - RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Taxe Prof : 50401877

ICE : 002116885000094

I.F : 2605689

INPE : 161207972

CNSS : 1116954

R.I.B : 007 640 0008552000301026 19

Date : 03/07/2020

Patient(e) : AHMED TAOUZI

Facture	522184873
---------	-----------

Nature de l'examen	Prix (DHS)
-Radiographie Poumons (face) et gril costal	300
Total à payer	300

Règlement : espèce

D. Bensouda Ahmed
Radiologue
Rue Ben Attia (Bd. de Fès) - Tanger
Tél.: 05 39 37 47 56 / 06 13 03 60 67

NOCICEPTOL® est un gel qui soulage et agit rapidement les douleurs musculaires, articulaires et post-traumatiques après notamment à son action combinée du chaud et du froid, le rosement thermique varie en fonction des utilisateurs. Les bulles essentielles apportent leurs bienfaits naturels.

NOCICEPTOL® limite également la diffusion de l'edème. Il est ainsi indiqué en cas de contractures, foulures, entorses, contusions, élongations, claquages et traumatismes directs.

*efficacité du gel antidouleur NOCICEPTOL® a été scientifiquement démontrée Etude in-vivo, Bel. DP004A002, Novembre 2013.

Métrie d'emploi: Appliquez et enfoncez à partir de 7 ans. Appliquez en massant légèrement sans faire pression 3 à 4 fois par jour sur zones douloureuses. Après utilisation, se laver les mains. Bien refermer après usage.

Précautions d'emploi: Usage externe uniquement. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes. Pour des personnes ayant des antécédents de convulsions ou de crises épileptiques, demander l'avis de votre médecin traitant. Éviter le contact avec les yeux et/ou les muqueuses. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou sur une peau lésée ou irritée. Ne pas utiliser sous un pansement occlusif. Ne pas utiliser en association avec d'autres crèmes, baumes, liniments, sprays, ou huiles de massage. Ne pas utiliser avec des dispositifs chauffants. En cas d'irritation, cesser l'application, consulter un médecin, un pharmacien ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de 5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter l'utilisation du gel et consulter.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Ingredients: / Top basis van / Auf der Basis von: / A base de: Aqua, Alcohol, PEG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Menthol, Mentha Piperita Oil, Aqua, Propylene Glycol, Equisetum Avenae Extract, Avena Sativa Extract, Camphor, Mentha Piperita Extract, Camphor, Linum Catharticum, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Thymus Thymolae Extract, Citrus Peel Oil, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Sodium Hydroxide, CI 42050.

NON-DRUGS - NON-STAINING - NON-STICK
NIET VET - MAAKT GEEN VLEKEN - KLEEF NIET
NET FETTING - NIET KLEEF - VERBORSCHT GEEN FLEKKEN

NON-TOXIC - NON-IRRITANT - NON-IRRITANT
NIET TOEGEGEN - NIET IRRITEREN - NIET IRRITEREN

SANS CONSERVATEURS NI ADDITIFS
ZONDER TOEGEGENDE BEWAARSTOFFEN
ZONDER TOEGEGENDE BEWAARSTOFFEN
SANS CONSERVATIFS NI ADDITIFS

NO ADDED PRESERVATIVE



NK 3250-850



PVC: 198.00 DH



NOCICEPTOL® PAIN RELIEF GEL
WITH ESSENTIAL OILS

Flights pain. Muscles - Injures - Post-traumatic Thermal Effect

Effect after one effective 15-20 minutes based on gel

NOCICEPTOL® is a gel that quickly soothes and relieves muscle joint and post-traumatic pain, thanks in particular to its combined hot and cold action. Thermal sensations vary by use.

The essential oils contribute their natural benefits.

NOCICEPTOL® also reduces swelling. As a result, it is indicated in cases of contracture, sprain, contusion, overexertion, straining and various other traumas.

The efficacy of NOCICEPTOL® pain relief gel has been scientifically proven in a study, Bel. DP004A002, November 2013.

Directions: Adults and children over the age of 7 years. Apply to painful areas in a light massage (do not rub). 3 or 4 times daily. Wash hands after use. Close the cap completely after use. **Warnings:** For external use only. Do not use on children under 7. Do not use if you are pregnant or breastfeeding. For persons with a history of convulsions or epileptic seizures, ask your general practitioner for advice. Avoid contact with eyes and mucous membranes. Do not apply to open wounds or to damaged or irritated skin. Do not use under an occlusive dressing. Do not use in combination with other creams, balms, liniments, sprays or massage oils. Do not use with heating devices. If ingested, immediately contact a doctor, pharmacist or poison control centre. If the pain persists for more than 5 days, or if an irritation develops after application, stop using the gel and check with a medical professional.

PAINSTILLINGE GEL NOCICEPTOL®

Met essentiële oliën

Tegen verschillende soorten pijn

Slijprijn - Gewrichts pijn - Post-traumatische pijn

Thermisch effect

Sneller en doeltreffender dan een gel op basis van bijnagen (5%)

NOCICEPTOL® is een gel die snel de spierpijn, gewrichtspijn en post-traumatische pijn verlicht en verzacht dankzij zijn gecombineerde werking van warm en koud. Het warmtegevoel verschaft aanraking van de gewrichten. De essentiële oliën dragen bij door hun natuurlijke pijnbestrijdende werking.

NOCICEPTOL® heeft ook de uitwerking van het oedeem. Het werkt aanhoeden bij contracturen, verspanningen, verrekkingen, kneuzingen, verrekkingen, spierspanningen en diverse letsel.

De doeltreffendheid van de pijnstillende gel NOCICEPTOL® werd wetenschappelijk aangetoond (in-vivo studie, Ref. DP004A002, november 2013).

Gebruiksaanwijzing: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Aanhoudend door lichtjes te masseren, niet laten inrijzen, 3 tot 4 keer per dag op de pijnlijke zones. Was uw handen na gebruik. Niet slijten na gebruik.

Voorzorgmaatregelen: Eikel uiterlijk gebruik. Niet gebruiken bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag het advies van de behandelende arts voor personen met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of epileptische aanvallen. Vermijd contact met de ogen en/of de slijmvliezen. Niet aanbrengen op open wonden of op een verwondde of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder een occlusief verband. Niet gebruiken met andere crèmes, zalven, smeersels, sprays of massageoliën. Randgebieden in geval van innamen en oedeem, afbreken of een antiliefdzaam. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, of als de pijn na het aanbrengen blijft bestaan, raadpleeg de arts. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond of op een wond die niet geneest. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond die niet geneest. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond die niet geneest.



CONTE
Musculaires
Articulaires
Post-traumatiques

NOCICEPTOL® is een gel die snel de spierpijn, gewrichtspijn en post-traumatische pijn verlicht en verzacht dankzij zijn gecombineerde werking van warm en koud. Het warmtegevoel verschaft aanraking van de gewrichten. De essentiële oliën dragen bij door hun natuurlijke pijnbestrijdende werking.

NOCICEPTOL® heeft ook de uitwerking van het oedeem. Het werkt aanhoeden bij contracturen, verspanningen, verrekkingen, kneuzingen, verrekkingen, spierspanningen en diverse letsel.

De doeltreffendheid van de pijnstillende gel NOCICEPTOL® werd wetenschappelijk aangetoond (in-vivo studie, Ref. DP004A002, november 2013).

Gebruiksaanwijzing: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Aanhoudend door lichtjes te masseren, niet laten inrijzen, 3 tot 4 keer per dag op de pijnlijke zones. Was uw handen na gebruik. Niet slijten na gebruik.

Voorzorgmaatregelen: Eikel uiterlijk gebruik. Niet gebruiken bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag het advies van de behandelende arts voor personen met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of epileptische aanvallen. Vermijd contact met de ogen en/of de slijmvliezen. Niet aanbrengen op open wonden of op een verwondde of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder een occlusief verband. Niet gebruiken met andere crèmes, zalven, smeersels, sprays of massageoliën. Randgebieden in geval van innamen en oedeem, afbreken of een antiliefdzaam. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, of als de pijn na het aanbrengen blijft bestaan, raadpleeg de arts. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond of op een wond die niet geneest. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond die niet geneest.

NOCICEPTOL® is een gel die snel de spierpijn, gewrichtspijn en post-traumatische pijn verlicht en verzacht dankzij zijn gecombineerde werking van warm en koud. Het warmtegevoel verschaft aanraking van de gewrichten. De essentiële oliën dragen bij door hun natuurlijke pijnbestrijdende werking.

NOCICEPTOL® heeft ook de uitwerking van het oedeem. Het werkt aanhoeden bij contracturen, verspanningen, verrekkingen, kneuzingen, verrekkingen, spierspanningen en diverse letsel.

De doeltreffendheid van de pijnstillende gel NOCICEPTOL® werd wetenschappelijk aangetoond (in-vivo studie, Ref. DP004A002, november 2013).

Gebruiksaanwijzing: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Aanhoudend door lichtjes te masseren, niet laten inrijzen, 3 tot 4 keer per dag op de pijnlijke zones. Was uw handen na gebruik. Niet slijten na gebruik.

Voorzorgmaatregelen: Eikel uiterlijk gebruik. Niet gebruiken bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag het advies van de behandelende arts voor personen met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of epileptische aanvallen. Vermijd contact met de ogen en/of de slijmvliezen. Niet aanbrengen op open wonden of op een verwondde of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder een occlusief verband. Niet gebruiken met andere crèmes, zalven, smeersels, sprays of massageoliën. Randgebieden in geval van innamen en oedeem, afbreken of een antiliefdzaam. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, of als de pijn na het aanbrengen blijft bestaan, raadpleeg de arts. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond of op een wond die niet geneest. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond die niet geneest.

NOCICEPTOL® is een gel die snel de spierpijn, gewrichtspijn en post-traumatische pijn verlicht en verzacht dankzij zijn gecombineerde werking van warm en koud. Het warmtegevoel verschaft aanraking van de gewrichten. De essentiële oliën dragen bij door hun natuurlijke pijnbestrijdende werking.

NOCICEPTOL® heeft ook de uitwerking van het oedeem. Het werkt aanhoeden bij contracturen, verspanningen, verrekkingen, kneuzingen, verrekkingen, spierspanningen en diverse letsel.

De doeltreffendheid van de pijnstillende gel NOCICEPTOL® werd wetenschappelijk aangetoond (in-vivo studie, Ref. DP004A002, november 2013).

Gebruiksaanwijzing: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Aanhoudend door lichtjes te masseren, niet laten inrijzen, 3 tot 4 keer per dag op de pijnlijke zones. Was uw handen na gebruik. Niet slijten na gebruik.

Voorzorgmaatregelen: Eikel uiterlijk gebruik. Niet gebruiken bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag het advies van de behandelende arts voor personen met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of epileptische aanvallen. Vermijd contact met de ogen en/of de slijmvliezen. Niet aanbrengen op open wonden of op een verwondde of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder een occlusief verband. Niet gebruiken met andere crèmes, zalven, smeersels, sprays of massageoliën. Randgebieden in geval van innamen en oedeem, afbreken of een antiliefdzaam. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, of als de pijn na het aanbrengen blijft bestaan, raadpleeg de arts. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond of op een wond die niet geneest. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond die niet geneest.

NOCICEPTOL® is een gel die snel de spierpijn, gewrichtspijn en post-traumatische pijn verlicht en verzacht dankzij zijn gecombineerde werking van warm en koud. Het warmtegevoel verschaft aanraking van de gewrichten. De essentiële oliën dragen bij door hun natuurlijke pijnbestrijdende werking.

NOCICEPTOL® heeft ook de uitwerking van het oedeem. Het werkt aanhoeden bij contracturen, verspanningen, verrekkingen, kneuzingen, verrekkingen, spierspanningen en diverse letsel.

De doeltreffendheid van de pijnstillende gel NOCICEPTOL® werd wetenschappelijk aangetoond (in-vivo studie, Ref. DP004A002, november 2013).

Gebruiksaanwijzing: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Aanhoudend door lichtjes te masseren, niet laten inrijzen, 3 tot 4 keer per dag op de pijnlijke zones. Was uw handen na gebruik. Niet slijten na gebruik.

Voorzorgmaatregelen: Eikel uiterlijk gebruik. Niet gebruiken bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag het advies van de behandelende arts voor personen met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of epileptische aanvallen. Vermijd contact met de ogen en/of de slijmvliezen. Niet aanbrengen op open wonden of op een verwondde of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder een occlusief verband. Niet gebruiken met andere crèmes, zalven, smeersels, sprays of massageoliën. Randgebieden in geval van innamen en oedeem, afbreken of een antiliefdzaam. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, of als de pijn na het aanbrengen blijft bestaan, raadpleeg de arts. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond of op een wond die niet geneest. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond die niet geneest.

NOCICEPTOL® is een gel die snel de spierpijn, gewrichtspijn en post-traumatische pijn verlicht en verzacht dankzij zijn gecombineerde werking van warm en koud. Het warmtegevoel verschaft aanraking van de gewrichten. De essentiële oliën dragen bij door hun natuurlijke pijnbestrijdende werking.

NOCICEPTOL® heeft ook de uitwerking van het oedeem. Het werkt aanhoeden bij contracturen, verspanningen, verrekkingen, kneuzingen, verrekkingen, spierspanningen en diverse letsel.

De doeltreffendheid van de pijnstillende gel NOCICEPTOL® werd wetenschappelijk aangetoond (in-vivo studie, Ref. DP004A002, november 2013).

Gebruiksaanwijzing: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Aanhoudend door lichtjes te masseren, niet laten inrijzen, 3 tot 4 keer per dag op de pijnlijke zones. Was uw handen na gebruik. Niet slijten na gebruik.

Voorzorgmaatregelen: Eikel uiterlijk gebruik. Niet gebruiken bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag het advies van de behandelende arts voor personen met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of epileptische aanvallen. Vermijd contact met de ogen en/of de slijmvliezen. Niet aanbrengen op open wonden of op een verwondde of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder een occlusief verband. Niet gebruiken met andere crèmes, zalven, smeersels, sprays of massageoliën. Randgebieden in geval van innamen en oedeem, afbreken of een antiliefdzaam. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, of als de pijn na het aanbrengen blijft bestaan, raadpleeg de arts. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond of op een wond die niet geneest. Het is niet aanbevolen om het gel te gebruiken op een wond die niet geneest.



This product is not a medicine but a food supplement made from plants, larvae, minerals and essential oils

- **Soothing & Relaxing**
Bitter Orange and marjoram essential oil are recognized for their soothing and relaxing properties
- **Improves mobility**
Scutellaria contributes to the proper functioning of skeletal muscles

CERVICALS - BACK - LUMBAR

Myobil®

Myobil®

Certificat N°: DA20181810704DMP/20UCA/v1

Myobil® *l'huile*

CERVICALES - DOS - LOMBAIRES

- **Apaisant et Relaxant**

L'orange Amère et l'huile de marjolaine sont reconnus pour leurs propriétés myoréglantes

- **Améliore la mobilité**

La scutellaire contribue au bon fonctionnement des muscles du squelette

Ce produit n'est pas un médicament mais un complément alimentaire à base de plantes, de larves, de minéraux et d'huiles essentielles

À consommer de préférence avant fin /

Best before :

Lot n° / Batch n°:

PPC: 69,00 DH

V001 - ETMYQUSOCPMCP



75mg

Didofénac Sodique
20 Gélules à libération
biphasique
Voie Orale

Divid^Q

إنتاج شركة توباك للصناعات الدوائية.
طريق الدمام، ص.ب. 3633.
توباك للصناعات الدوائية السعودية
مورع من طرف
رئيسة فرع وزارة الصحة، المنطقة الصناعية
تأسس في 1980، أكبر المصنّعين
و من جملة المنتجات: مسكن، مضاد



يعمل على تخفيف الألم عن طريق تثبيط
البروتينات المسببة للألم في مركز الألم في
الدماغ. لا يؤثر على الجهاز الهضمي أو
الجهاز التنفسي. لا يتداخل مع الأدوية
الأخرى.

75مجم

ديكلوفيناك الصوديوم
20 كبسولة ثنائية
التحرر
عن طريق الفم

ديكلوفيناك الصوديوم

ديكلوفيناك الصوديوم

ديكلوفيناك الصوديوم

AMM N°: 528/17DMP/21/NRQ/R1
N° Lot: 9TJ491
Fab: 09/2019
Per: 09/2022

P.P.V. 51.40 MAD

20

ملغ

إنيزو

إنزوميبرازول

مثبط مضخة البروتون
يقلص إفراز الحمض على مستوى المعدة



14 كبسولة
صامدة
لعصارة المعدة
عن طريق الفم

Ineso 20 mg
14 Gélules
Deva Pharmaceutique



صنع من طرف :
مختبرات ديفا للصيدلة
ج. واجدي صيدلي مسؤول
147-148 المنطقة الصناعية نيل - قبل - الدار البيضاء

Composition :

Esoméprazole 20 mg.

Excipient : q.s.p

Excipients à effet notoire : saccharose

Voir la notice pour plus d'informations

Conserver à une température inférieure à 30° C

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

1 gélule.

Respecter les doses prescrites
Liste 2 - sur Ordonnance

Ineso

ésoméprazole

20 mg

Inhibiteur de pompe à protons
Diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac



14 gélules
Microgranules
gastro-
résistants
Par voie orale

LOT : M0329
PER : 07/2021
PPV : 75,00 DH

Fabriqué par :

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J. OUAJDI Pharmacien Responsable

Deva

Calcium
Vitamine D

Calsof®

Favorise une bonne
densité osseuse



20 Caplets

Calsof®

20 Caplets

Pour des os solides



Calcium
Vitamine D

Calsof®

Réduit les risques osseux de l'ostéoporose

Santé et longévité de l'os



Lot N° :

18080801

PER :

11/2022

Prix :

88.00DHS