

**RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR  
ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS**

**Conditions générales :**  
Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.  
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.  
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.  
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.  
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

**Pharmacie :**  
Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.  
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

**Biologie et Biologie :**  
La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.  
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

**Optique :**  
L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

**Rééducation :**  
L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.  
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

**Dentaire :**  
En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.  
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.  
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

**Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**  
La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

**Adresses Mails utiles**

Réclamation : contact@mupras.com  
Prise en charge : pec@mupras.com  
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS :** Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

**Déclaration de Maladie**  
N° P19- 063960  
ND: 34 186

☐ **Maladie** ☐ **Dentaire** ☐ **Optique** ☐ **Autres**

**Cadre réservé à l'adhérent (e)**  
Matricule : 2933 Société :  
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :  
Nom & Prénom : ZAAD OMAR  
Date de naissance :  
Adresse :  
Tél. : Total des frais engagés : Dhs

**Cadre réservé au Médecin**  
Cachet du médecin :  
Date de consultation :  
Nom et prénom du malade : BENABIDA HABIBA Age:  
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
Nature de la maladie :  
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.  
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.  
Fait à : Le :  
Signature de l'adhérent(e) :







# SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des travaux															
				Montant des soins															
				Début d'exécution															
				Fin d'exécution															
				Montant des soins															
				Début d'exécution															
				Fin d'exécution															
<b>O.D.F.</b> Prothèses dentaires	Détermination du coefficient masticatoire			Coefficient des travaux															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> <th colspan="2">G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		H		G		25533412	21433552	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553			Montant des soins
H		G																	
25533412	21433552	00000000	00000000																
00000000	00000000	00000000	00000000																
35533411	11433553																		
(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession				Fin de															

NOM : .....		Mle
-------------	--	-----

<b>VOLET ADHERENT</b>		
NOM : .....		
DECLARATION N° W18-384266		
Date de Dépôt	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes
Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois		
Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle		

MUPRAS  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

W18-384266

DATE DE DEPOT

...../...../201...

<b>A REMPLIR PAR L'ADHERENT</b>		Mle 2933
Nom & Prénom Ben Abida Rabiba		
Fonction : .....	Phones : .....	
Mail : .....		

<b>MEDECIN</b>		Prénom du patient .....	
Adhérent <input type="checkbox"/>	Conjoint <input type="checkbox"/>	Enfant <input type="checkbox"/>	Age .....
Nature de la maladie		Date	
correction orthopéd. Affection oculaire		Date 1ère visite	
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			
Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires	
11/06/2020	CS	200 DH	

<b>PHARMACIE</b>		Date 21/06/2020
Montant de la facture		
Mo. 60		

<b>ANALYSES - RADIOGRAPHIES</b>		Date 23/06/2020
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires	
23/06/2020	650,00 DH	

<b>AUXILIAIRES MEDICAUX</b>					Date : .....
Nombre				Montant détaillé des Honoraires	
AM	PC	IM	IV		

Dr. ZAHRAOUI REDA  
Ophthalmologiste  
25 Avenue Laroui, Cité Darda  
2ème étage, Sola - Casablanca  
05 22 28 12 29 - 039 75 75 70  
Dr. SEBRI  
O.D.A. Darda Salama  
Casablanca  
LABORATOIRE D'ANALYSES  
MEDICALES ATLAS  
30, Rue B (d'op. D), Casablanca  
Casablanca - Téléphone : 012 35 53

Docteur EZ-ZAHRAOUI Mohamed Réda

Ophthalmologiste

\* Diplômé de la Faculté de Médecine de Rabat et Marrakech

\* Diplôme universitaire en OCT - Université de Bordeaux

\* Ancien Médecin des Hôpitaux Lyon (France)

الدكتور الزهراوي محمد رضا  
أخصائي في أمراض و جراحة العيون

\* خريج كلية الطب بالرباط و مراكش  
\* دبلوم جامعي في التصوير المقطعي للشبكية - جامعة بوردو  
\* طبيب سابق بمستشفيات ليون (فرنسا)

Casablanca, le : 4/06/2020 : الدار البيضاء، في:

Dr. Benabida Habbu

29.40 x 2

\* - chitoco 1m / 2 flacons (08 years)

1/2031 par semaine  
puis 2/2031 / semaine

25.90 x 2 jusqu'à avr  
- Mydriatic (oil droit)

1/2031 par semaine  
T. Mo. 65

العنوان : 219 ، شارع الهراويين (المنية) هرية الجماعة، سباتة، الطابق الثاني (فوق صيدلية الراحة) - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 29 18 29 - المستعجلات : 06 39 75 75 70

219, Avenue Lahraouine (Madania) Cité djemaâ , Sbata 2<sup>ème</sup> étage (au dessus de pharmacie Erraha) - Casablanca

Tél : 05 22 29 18 29 - Urgences : 06 39 75 75 70



immédiatement.

En cas de traitement prolongé par ce collyre une surveillance par l'ophtalmologiste est nécessaire. Ne prolongez pas le traitement au-delà de la date prévue par celui-ci.

Le port de lentilles de contact est à éviter durant le traitement.

Ne pas toucher l'œil, les paupières ou une autre surface avec l'extrémité du flacon.

Reboucher celui-ci soigneusement après usage.

Utilisation chez l'enfant : l'usage du médicament doit être évité chez le nourrisson.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **Prise d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Grossesse et allaitement**

Il est préférable, par mesure de précaution, de ne pas utiliser CHIBRO CADRON, collyre en flacon au cours de la grossesse.

Il est préférable d'éviter d'allaiter en cas de traitement prolongé (plus de 10 jours).

**D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.**

#### **Sportifs**

Attention : cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

#### **3. COMMENT UTILISER CHIBRO CADRON, collyre en flacon ?**

##### Posologie

Instillez 1 goutte dans l'œil traité, en moyenne 3 à 6 fois par jour, pendant 7 jours.

##### Mode et voie d'administration

Voie ophtalmique.

- Lavez-vous les mains avant toute manipulation.
- Penchez la tête légèrement en arrière, regardez vers le haut et tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- En appuyant sur le flacon, instillez une goutte dans le sac conjonctival inférieur.
- Évitez le contact de l'embout avec l'œil, la paupière ou toute autre surface. Il pourrait être contaminé par des bactéries pouvant provoquer des infections oculaires.
- Fermez l'œil lentement.
- Rebouchez le flacon immédiatement après usage.
- En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent. Instiller des collyres à 15 minutes d'intervalle.

##### Fréquence d'administration

En moyenne 3 à 6 instillations par œil malade à répartir dans la journée.

##### Durée du traitement

En moyenne 7 jours.

Un traitement plus long ou des instillations plus fréquentes

Conditions de prescription et de délivrance : liste I

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

#### **CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?**

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

#### **En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :**

- 1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2- Respectez strictement votre ordonnance
- 3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

Médicament autorisé N° : 3400930217412

N° DE Algérie : 16/99/17D 024/022

AMM Maroc n° : 116 DMP/21/NCV

**CHIBRO-CADRON**

Collyre - Flacon 5 ml - PPV : 29,40 DH



6 118001 071425

AMM Maroc  
N° 116 DMP/21/NCV  
Distribué par les  
Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27162  
Bouskoura - MAROC



héma

immédiatement.

En cas de traitement prolongé par ce collyre une surveillance par l'ophtalmologiste est nécessaire. Ne prolongez pas le traitement au-delà de la date prévue par celui-ci.

Le port de lentilles de contact est à éviter durant le traitement.

Ne pas toucher l'œil, les paupières ou une autre surface avec l'extrémité du flacon.

Reboucher celui-ci soigneusement après usage.

Utilisation chez l'enfant : l'usage du médicament doit être évité chez le nourrisson.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **Prise d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Grossesse et allaitement**

Il est préférable, par mesure de précaution, de ne pas utiliser CHIBRO CADRON, collyre en flacon au cours de la grossesse.

Il est préférable d'éviter d'allaiter en cas de traitement prolongé (plus de 10 jours).

**D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.**

#### **Sportifs**

Attention : cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

#### **3. COMMENT UTILISER CHIBRO CADRON, collyre en flacon ?**

##### Posologie

Instillez 1 goutte dans l'œil traité, en moyenne 3 à 6 fois par jour, pendant 7 jours.

##### Mode et voie d'administration

Voie ophtalmique.

- Lavez-vous les mains avant toute manipulation.
- Penchez la tête légèrement en arrière, regardez vers le haut et tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- En appuyant sur le flacon, instillez une goutte dans le sac conjonctival inférieur.
- Évitez le contact de l'embout avec l'œil, la paupière ou toute autre surface. Il pourrait être contaminé par des bactéries pouvant provoquer des infections oculaires.
- Fermez l'œil lentement.
- Rebouchez le flacon immédiatement après usage.
- En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent. Instiller des collyres à 15 minutes d'intervalle.

##### Fréquence d'administration

En moyenne 3 à 6 instillations par œil malade à répartir dans la journée.

##### Durée du traitement

En moyenne 7 jours.

Un traitement plus long ou des instillations plus fréquentes

Conditions de prescription et de délivrance : liste I

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

#### **CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?**

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

#### **En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :**

- 1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2- Respectez strictement votre ordonnance
- 3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

Médicament autorisé N° : 3400930217412

N° DE Algérie : 16/99/17D 024/022

AMM Maroc n° : 116 DMP/21/NCV

**CHIBRO-CADRON**  
Collyre - Flacon 5 ml - PPV : 29,40 DH



6 118001 071425

AMM Maroc  
N° 116 DMP/21/NCV  
Distribué par les  
Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N° 1, 27162  
Bouskoura - MAROC



héma



FR

# Mydriaticum 0,5 %, collyre

## Tropicamide

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?
3. COMMENT UTILISER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

MYDRIATIQUES ET CYCLOPLEGIQUES  
ANTICHOLINERGIQUES

Ce médicament est un collyre qui permet de dilater la pupille (mydriase) pour réaliser certains examens et/ou traitements en ophtalmologie.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?

**Ne pas utiliser MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre dans les cas suivants :**

- Hypersensibilité au tropicamide, à l'atropine ou ses dérivés ou à l'un des excipients du collyre (notamment au chlorure de benzalkonium).
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle (augmentation brutale de la pression de l'œil).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE**

- Pour éviter l'ingestion surtout chez l'enfant voir rubrique 2 «Précautions d'emploi, Mises en garde spéciales».
- Afin d'éviter les effets systémiques induits par le passage de tropicamide dans la circulation générale par les voies lacrymales et par ingestion orale, il est recommandé, surtout chez l'enfant et le sujet âgé, de comprimer l'angle interne de l'œil pendant 1 minute après chaque instillation et d'essuyer l'excédent sur la joue.
- Refermer le flacon après utilisation.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 15 minutes les instillations.

### Fréquence d'administration

Se conformer à la prescription médicale.

### Durée du traitement

Se conformer à la prescription médicale.

En cas d'instillations d'une quantité trop importante de médicament, prévenir IMMEDIATEMENT votre médecin.

2 situations sont possibles :

- soit par surdosage (notamment le soir)
- soit du fait d'un collyre mu

Les signes «rougeur et mydriase» aidés l'hyperthermie (fièvre neurologique et coma.

La prise en charge est symptomatique en milieu spécialisé.

### Si vous oubliez de prendre MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre :

Ne pas utiliser de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié d'utiliser.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

### Effets indésirables oculaires

- Risque de glaucome aigu par fermeture de l'angle (voir rubrique 2 «Contre-indications»).
- Mydriase gênante, troubles de l'accommodation prolongés.
- Irritation locale, picotement, possibilité de réaction allergique.

### Liés à l'excipient

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium : risque d'irritation oculaire.

### Effets indésirables systémiques

La tropicamide en collyre passe dans la circulation

MYDRIATICUM 0,5%  
Collyre - Flacon 10 ml - PPV : 25,90 DH  
Non remboursable AMO



A.M.M. Maroc N° 19 DMP/21/NTT  
Distribué par les Laboratoires SOTHEMA  
3.P. N°1 Bouskoura - 27182 - MAROC

FR

# Mydriaticum 0,5 %, collyre

## Tropicamide

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?
3. COMMENT UTILISER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

MYDRIATIQUES ET CYCLOPLEGIQUES  
ANTICHOLINERGIQUES

Ce médicament est un collyre qui permet de dilater la pupille (mydriase) pour réaliser certains examens et/ou traitements en ophtalmologie.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?

**Ne pas utiliser MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre dans les cas suivants :**

- Hypersensibilité au tropicamide, à l'atropine ou ses dérivés ou à l'un des excipients du collyre (notamment au chlorure de benzalkonium).
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle (augmentation brutale de la pression de l'œil).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE**

- Pour éviter l'ingestion surtout chez l'enfant voir rubrique 2 «Précautions d'emploi, Mises en garde spéciales».
- Afin d'éviter les effets systémiques induits par le passage de tropicamide dans la circulation générale par les voies lacrymales et par ingestion orale, il est recommandé, surtout chez l'enfant et le sujet âgé, de comprimer l'angle interne de l'œil pendant 1 minute après chaque instillation et d'essuyer l'excédent sur la joue.
- Refermer le flacon après utilisation.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 15 minutes les instillations.

### Fréquence d'administration

Se conformer à la prescription médicale.

### Durée du traitement

Se conformer à la prescription médicale.

En cas d'instillations d'une quantité trop importante de médicament, prévenir IMMEDIATEMENT votre médecin.

2 situations sont possibles :

- soit par surdosage (notamment le soir)
- soit du fait d'un usage prolongé

Les signes «rougeur et mydriase» aidés l'hyperthermie (fièvre neurologique et coma.

La prise en charge est symptomatique en milieu spécialisé.

### Si vous oubliez de prendre MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre :

Ne pas utiliser de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié d'utiliser.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

### Effets indésirables oculaires

- Risque de glaucome aigu par fermeture de l'angle (voir rubrique 2 «Contre-indications»).
- Mydriase gênante, troubles de l'accommodation prolongés.
- Irritation locale, picotement, possibilité de réaction allergique.

### Liés à l'excipient

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium : risque d'irritation oculaire.

### Effets indésirables systémiques

La tropicamide en collyre passe dans la circulation

**MYDRIATICUM 0,5%**  
Collyre - Flacon 10 ml - PPV : 25,90 DH  
Non remboursable AMO



A.M.M. Maroc N° 19 DMP/21/NTT  
Distribué par les Laboratoires SOTHEMA  
3.P. N°1 Bouskoura - 27182 - MAROC



# Bilan Biologique

le : 18/07/20

Nom/Prénom : ..... Age : ..... Sexe : **H** ☐ **F** ☐

## Hématologie

- ☒ NFS  
☐ Plaquettes  
☒ VS  
☐ CRP  
☐ Hémoculture

## Bilan martial

- ☐ Fer sérique  
☐ CTF  
☐ Ferritine  
☐ Transferrine

## Hémostase

- ☐ Temps de Prothrombine  
☐ TCK  
☐ Fibrinogène  
☐ INR

## Glucose

- ☐ Glycémie à jeun  
☐ Hyperglycémie par VO  
☐ Hémoglobine glyquée

## Ionogramme sanguin

- ☐ Na+  
☐ K+  
☐ Cl-  
☐ Ca++  
☐ Phosphore  
☐ Mg++  
☐ Bicarbonates (HCO<sub>3</sub>-)  
☐ Urée  
☐ Créatinine  
☐ Acide urique

Autres: .....

## Bilan lipidique

- ☐ Cholestérol total  
☐ Cholestérol HDL  
☐ Cholestérol LDL  
☐ Triglycérides

## Fonction hépatique et enzymologie

- ☐ Amylasémie  
☐ Bilirubine libre et conjuguée  
☐ Phosphatases acides  
☐ Phosphatases alcalines  
☐ Lactate déshydrogénase LDH  
☐ Transaminases ASAT, ALAT  
☐ G - GT  
☐ 5' Nucléotidase  
☐ CPK (Créatine PhosphoKinase)  
☐ Troponine  
☐ Électrophorèse des protéines EPP  
☐ BNP

## Ionogramme urinaire

- ☐ Ca++  
☐ Phosphore  
☐ Na+  
☐ K+  
☐ Cl-  
☐ Urée  
☐ Créatinine

## Examen des urines

- ☐ Protéinurie des 24h  
☐ ECBU  
☐ Antibiotogramme

## Groupe sanguin

- ☐ ABO  
☐ Rhésus  
☐ RAI

## Sérologie et Immunologie

- ☐ VDRL - TPHA  
☐ Hépatite B  
☐ Antigène Hbs  
☐ Anticorps Anti-Hbs  
☐ Anticorps Anti-Hbc  
☐ Anticorps Anti-Hbe  
☐ Hépatite C  
☐ Anticorps Anti-HVC  
☐ Sérologie Toxoplasmose  
☐ Sérologie Rubéole  
☐ β-hCG Plasmatique  
☐ Facteur Rhumatoïde:  
(Latex, Waaler Rose)  
☐ Anticorps anti-nucléaire  
☐ Anticorps anti-DNA natif  
☐ ASLO  
☐ Dosage du Complément

LABORATOIRE D'ANALYSES  
EDUCALES ATLAS  
38, Rue B (étage II), Casablanca  
Casablanca - Téléphone / Fax: 0522 555 131

paracholse de sel



Docteur EZ-ZAHRAOUI Mohamed Réda

Ophtalmologiste

الدكتور الزهراوي محمد رضا  
أخصائي في أمراض و جراحة العيون

\* Diplômé de la Faculté de Médecine de Rabat et Marrakech

\* Diplôme universitaire en OCT - Université de Bordeaux

\* Ancien Médecin des Hôpitaux Lyon (France)

\* خريج كلية الطب بالرباط و مراكش

\* دبلوم جامعي في التصوير المقطعي للشبكية - جامعة بوردو

\* طبيب سابق بمستشفيات ليون (فرنسا)

Casablanca, le : 11/06/2020 : الدار البيضاء، في:

7- Benahda Nabila

- NFS - pla
- VS - CRP
- uré - créa
- gly - a j
- Calvini - phosphorimi
- ECA
- TPHA - VDRL
- IgA - la tuberculine

LABORATOIRE D'ANALYSES  
MEDICALES ATLASS  
300, bloc B (étage 1), cité Djamaa, Sbat 2  
Casablanca - téléphone : 0522 955 135

العنوان : 219 ، شارع الهراويين (المدنية) قرية الجماعة، سباتة، الطابق الثاني (فوق صيدلية الراحة) - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 29 18 29 - المستعجلات : 06 39 75 75 70

219, Avenue Lahraouine (Madania) Cité djemaâ , Sbat 2<sup>ème</sup> étage (au dessus de pharmacie Erraha) - Casablanca

Tél : 05 22 29 18 29 - Urgences : 06 39 75 75 70

# LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ATASSI

Téléphone: 0522-555-135

ICE: 000815216000020

IF: 40280745

Casablanca le 23/04/2020

Madame BENABIDA HABIBA

FACTURE N° 1463

## Analyses :

Numération formule sanguine -----	B	80	
Vitesse de sédimentation -----	B	30	
Enzyme de conversion de l'angiotensine -----	B	300	
Calcium -----	B	30	
Phosphore -----	B	40	
Glycémie (à jeûn) -----	B	30	
Urée -----	B	30	
Créatinine -----	B	30	
VDRL qualitatif -----	B	50	
TPHA qualitatif -----	B	50	Total : B 670

## Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5	
-----------	----	-----	--

TOTAL DOSSIER

650,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Six Cent Cinquante Dirhams

LABORATOIRE D'ANALYSES  
MEDICALES ATASSI  
30, bloc 8 (étage 1), cité D'Amal, Sbata,  
Casablanca - Téléphone: 0522 555 135





# مختبر التحاليل البيولوجية الطبية د. أطلسي

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Dr.ATLASSI

**Dr. Alaa ATLASSI**  
Spécialiste en biologie médicale  
Ancien attaché à CHU Ibn Rochd

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie  
Immunologie - Hormonologie - Allergologie - Spermatogramme

Date de la demande : 23/06/20

Edition du : 24/06/20

**Madame BENABIDA HABIBA**

Date de naissance: 18/11/1954

Docteur MOHAMED REDA EZ-ZAHRA

Demande Numéro: 20D670



### Compte Rendu d'Analyses

## HEMATOLOGIE

### NUMERATION FORMULE SANGUINE

Sur automate SYSMEX XT 2000 I

Normales Antécédents  
(Femme Adulte)

22/01/2019

### NUMERATION GLOBULAIRE

Globules rouges	:	4,97	M/mm <sup>3</sup>	4 - 5,2	4,94
Hémoglobine	:	13,6	g/100 ml	12,5 - 15,5	13,4
Hématocrite	:	41	%	35 - 45	41
- V.G.M.	:	82	* μ <sup>3</sup>	85 - 95	
- T.C.M.H.	:	27	* pg	28 - 32	
- C.C.M.H.	:	33	g/100 ml	30 - 35	
Leucocytes	:	7 250	/mm <sup>3</sup>	4000 - 10000	6320

### FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles	:	51	%	Soit : 3 698 /mm <sup>3</sup>	50 - 70%
Polynucléaires Eosinophiles	:	1	%	Soit : 73 /mm <sup>3</sup>	2000 - 7500/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires Basophiles	:	0	%	Soit : 0 /mm <sup>3</sup> < 1%	1 - 4%
Polynucléaires Lymphocytes	:	41	* %	Soit : 2 973 /mm <sup>3</sup>	40 - 300/mm <sup>3</sup>
Polynucléaires Monocytes	:	7	%	Soit : 508 /mm <sup>3</sup>	< 100/mm <sup>3</sup>
					20 - 40%
					1500 - 4000/mm <sup>3</sup>
					1 - 9%
					50 - 1000/mm <sup>3</sup>

### PLAQUETTES

:	389 000	/mm <sup>3</sup>	150000 - 400000	362000
---	---------	------------------	-----------------	--------

### VITESSE DE SEDIMENTATION

(Méthode de Westergreen)

1 ère heure	:	24	* mm	< 15
2 ère heure	:	47	* mm	< 30

URGENCE EN 30 MINUTE

LABORATOIRE D'ANALYSES  
MEDICALES ATLASSI  
Docteur Alaa ATLASSI  
Biologiste

Page : 1/2



# مختبر التحاليل البيولوجية الطبية د. أطلسي

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES Dr.ATLASSI

**Dr. Alaa ATLASSI**  
Spécialiste en biologie médicale  
Ancien attaché à CHU Ibn Rochd

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie  
Immunologie - Hormonologie - Allergologie - Spermogramme

Date de la demande : 23/07/20  
Edition du : 24/07/20

**Madame BENABIDA HABIBA**  
Date de naissance: 18/11/1954  
Docteur MOHAMED REDA EZ-ZAHRAOUI  
Demande Numéro: 20D670

### Compte Rendu d'Analyses

## ENZYMOLOGIE

			Normales	Antériorités
<b>Enzyme de conversion de l'angiotensine</b> :	<b>31,0</b>	UI/l	8 - 52	
(Automate Roche)				

## BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

<b>Calcium</b>	:	<b>95</b>	mg/l	86 - 103	
<b>Phosphore</b>	:	<b>41</b>	mg/l	26 - 45	
<b>Glycémie à jeun</b>	:	<b>1,07</b>	g/l	0,7 - 1,1	1,09
	Soit :	<b>5,9</b>	mmol/l	3,88 - 6,11	6
<b>Urée</b>	:	<b>0,23</b>	g/l	0,15 - 0,43	
	Soit :	<b>3,83</b>	mmol/l	2,5 - 7,2	
<b>Créatinine</b>	:	<b>6,6</b>	mg/l	5 - 11	
	Soit :	<b>58</b>	μmol/l	44 - 97	

## IMMUNO / SEROLOGIE

### V.D.R.L.

Réaction qualitative : **Négatif.**

### T.P.H.A.

Réaction qualitative : **Négatif.**



**URGENCE EN 30 MINUTE**

Page : 2/2