

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.  
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.  
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.  
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Déclaration de Maladie et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com  
Prise en charge : pec@mupras.com  
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données actrice personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

## Déclaration de Maladie : N° 9-0000504

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 949 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : NASR LAHCEN Date de naissance : 1/7/50

Adresse : 10 Rue Mimouza Hay Erraha Casablanca

Tél. : 0662467387 Total des frais engagés : 1618,00 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. SADIK Fouzia

Médecin

104, Rue Mimouza Hay Erraha  
Tél: 05 22 36 58 91 Casablanca

Date de consultation : 22/07/2020

Nom et prénom du malade : M<sup>2</sup> NASR LAHCEN Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Grippe - Rhinite HTA Dr. SADIK Fouzia

104, Rue Mimouza Hay Erraha  
Tél: 05 22 36 58 91 Casablanca

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 23/7/2020

Signature de l'adhérent(e) :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/07/20	01	01	200,00	Dr. SAIDIK Fouzia Médecin 104, Rue Mimouza Hay Erraha Tél: 05/22 36 18 91 Casablanca

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE HIBA Dr. Ahmed GHAFRY Hay Raha, Rue Banafsa Tel: 0522 39 34 22 Fax: 0522 39 34 22	22/07/2020	Dr. Ahmed GHAFRY Hay Raha, Rue Banafsa Tel: 0522 39 34 22 Fax: 0522 39 34 22 271,00

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
W	23/07/20	B 838	1148,92

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H 25533412 00000000 35533411	D 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553	MONTANTS DES SOINS
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS			VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Docteur SADIK Fouzia

Médecine Générale

Echographie Générale

104, Rue Mimosas (ex Rue des Ecoles)

1<sup>er</sup> Etage - Beauséjour

Casablanca - Tél. : 05 22.36.58.91

# الدكتورة صديق فوزية

الطب العام

الفحص بالصدى

104، زنقة ميموزا (زنقة المدارس سابقا)

الطابق الأول - بروسيجور

الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 36.58.91

Casablanca, le : 22/04/2020 : الدار البيضاء ، في

M<sup>2</sup> NASR

LAHCEN

79.70 - Azix 500 mg (0/18)  
780 i. x 3 j

- Célestene 2 mg (0/18)  
2cp i. après le ftour  
Fe Pen Céle

14,30 - Rhinofébral (0/18)  
7cp 3 fois !

28,00 - N9-Dol Codeine (0/18)  
7cp 2 fois !

14,9,00 - Budena (0/18)

271,00 - Natrixam 5mg / 1,5mg (0/18)  
7cp i. aux le flacon

Dr. SADIK FOUZIA  
Dr. Ahmed GHAFRY  
Hay Raha, Rue Beauséjour  
104, Rue Mimouza Hay Erraha  
Tél: 05 22 36.58.91 Casablanca  
M<sup>2</sup> NASR LAHCEN

Dr. SADIK Fouzia  
Médecin  
104, Rue Mimouza Hay Erraha  
Tél: 05 22 36.58.91 Casablanca

# AZIX

SPV - 790H70

Azithromycine

## COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Comprimé 500 mg sécable, boîte de 3

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitements des infections dues aux germes sensibles telles que :

- infections respiratoires hautes : otite moyenne, sinusite, angine et pharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

## CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

## MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

## EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques: prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

## POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

## MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

## TABLEAU A (LISTE I).



bottu

SA

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebaâ - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

# BUDÉNÀ® 100 mcg

## Pulvériseur nasal

LOT: 0036M009 EXP: 09/03  
PPV: 149DH00

### COMPOSITION

Budésonide (DCI)..... par dose  
100 mcg

Excipients q.s.

Contient du glucose.

### FORME ET PRÉSENTATION

Suspension pour pulvérisation nasale : flacon pulvérisateur de 200 doses.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Glucocorticoïde local par voie nasale.

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

- Traitement de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle.

- Rhinite vasomotrice.

### CONTRE - INDICATIONS

*Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de :*

- Allergie au budésonide.

*En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

*Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :*

- Chez l'enfant, en cas de traitement prolongé, il convient de rester vigilant sur les risques de retentissement sur la croissance. Le risque d'effets systémiques, de freination corticosurrénalienne et de retentissement sur la croissance est majoré en cas d'administration concomitante d'une corticothérapie par voie inhalée ou, à fortiori, par voie systémique.

- L'administration conjointe de corticoïdes par voie nasale chez les patients sous corticothérapie orale au long cours ne dispense pas des précautions nécessaires lors d'une réduction des doses de corticoïdes par voie orale. Celles-ci seront diminuées très progressivement et le sevrage devra être effectué sous surveillance médicale attentive (à la recherche de l'apparition de signes d'insuffisance surrénale aiguë ou subaiguë) se prolongeant au-delà de l'arrêt de la corticothérapie générale.

- L'administration locale de corticoïdes par voie nasale n'est pas recommandée chez les patients ayant présenté récemment une ulcération de la cloison nasale ou ayant subi une intervention ou un traumatisme au niveau du nez, tant que la guérison n'est pas complète.

- Il conviendra d'assurer la perméabilité des fosses nasales pour assurer la diffusion optimale du produit. En avertir le patient en lui conseillant de les assécher par mouillage avant l'instillation.

- En cas d'obstruction nasale majeure, un examen détaillé de la sphère ORL doit être pratiqué.

- En cas de tuberculose pulmonaire, d'infection mycosique pulmonaire, l'instauration d'une surveillance étroite et d'un traitement adapté s'impose.

- En cas de traitement prolongé, des examens détaillés des fosses nasales s'imposent du fait du risque de retentissement sur la muqueuse nasale. La constatation d'une atrophie de la muqueuse doit conduire à la diminution des doses de corticoïdes locaux.

- Avertir le patient qu'il s'agit d'un traitement régulier, et qu'un délai de plusieurs jours de traitement peut être nécessaire avant d'observer les effets sur les symptômes de la rhinite.

- L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

*En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

*Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.*

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

**Grossesse :** Chez l'animal, l'expérimentation met en évidence un effet tératogène, variable selon les espèces. Dans l'espèce humaine, les études épidémiologiques n'ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes lors du premier trimestre bien qu'il existe un passage transplacentaire. Lors de maladies chroniques nécessitant un traitement tout au long de la grossesse, un léger retard de croissance intra-utérin est possible. Une insuffisance surrénale néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie à doses élevées. Il peut être justifié d'observer une période de surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique (glycémie) du nouveau-né.

En conséquence, ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse si besoin.

**Allaitement :** Le passage du budésonide dans le lait n'a pas été étudié. Néanmoins, les autres corticoïdes sont excrétés dans le lait. Les données disponibles semblent montrer une bonne tolérance chez l'enfant ; cependant, le retentissement biologique ou clinique d'un traitement de longue durée chez la mère n'est pas évalué à ce jour. En conséquence, l'allaitement est possible en cas de traitement bref. En cas de traitement chronique, par mesure de précaution, l'allaitement est à éviter.

# No-Dol® Codéine

Paracétamol / Codéine Phosphate Hémihydraté

Comprimé

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ?
3. Comment prendre NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTALGIIQUES PERIPHERIQUES, ANALGÉSIIQUES OPIOÏDIQUES.

Code ATC : N02BE51

N : système nerveux central

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'adolescent à partir de 15 ans. Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine : c'est un antalgique (calme la douleur).

La codéine appartient à un groupe de médicaments appelés les antalgiques opioïdes qui agissent pour soulager la douleur. Elle peut être utilisée seule ou en association avec d'autres antalgiques comme le paracétamol.

Ce médicament peut être utilisé chez l'adulte et l'adolescent à partir de 15 ans sur une courte durée pour des douleurs modérées non soulagées par d'autres antalgiques comme le paracétamol ou l'ibuprofène utilisés seuls. Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé :

- Chez les enfants de moins de 15 ans,

• Si vous êtes allergique aux autres composants rubrique 6,

- Si vous souffrez d' :
- Si vous avez des :
- Si vous avez de l' :
- Si vous allaitez (s)

• Pour soulager la douleur chez l'enfant et l'adolescent (u - 18 ans) après ablation des amygdales ou des végétations dans le cadre d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil,

- Si vous savez que vous êtes un métaboliseur ultra-rapide de la codéine en morphine.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre NO-DOL Codéine 500 mg/30 mg, comprimé.

## Mises en garde spéciales

*Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine.*

*D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie et Mode d'administration).*

- Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical :  
- L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance.
  - Si les troubles persistent au bout de 3 jours et/ou en cas de survenue d'un autre signe après la prise du médicament.
  - Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le médecin en cas de surdosage accidentel.
- La codéine est transformée en morphine dans le foie par une enzyme. La morphine est la substance qui soulage la douleur. Certaines personnes ont un taux d'enzyme variable et cela peut les affecter de manière différente. Pour certaines personnes, la morphine n'est pas produite ou produite en petite quantité, et ne soulagera pas assez la douleur. Pour d'autres, une quantité importante de morphine est produite pouvant être à l'origine d'effets indésirables graves. Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, vous devez arrêter ce médicament et demander immédiatement l'avis de votre médecin : respiration lente ou superficielle, confusion, somnolence, rétrécissement de la pupille, constipation, manque d'appétit ou si vous ne vous sentez pas bien.

Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre NO-DOL Codéine ADULTES si vous êtes traité par un médicament de la famille des benzodiazépines.

## Précautions d'emploi

La prise de paracétamol peut entraîner des troubles de fonctionnement du foie.

Vous devez demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

- si vous pesez moins de 50 kg,
- si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,
- si vous êtes atteints d'une maladie respiratoire (dont l'asthme),
- si vous avez un encoblement bronchique (toux avec crachats),
- si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment,
- si vous souffrez de déshydratation,
- si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes

NO-DOL CODEINE®

CP B20

P.P.V : 26DH00



6 118000 061861

LOT : 09A060  
PER : 02/2024

# RHINOFE

Gélule, boîte de  
Paracétamol /Acide ascorbique/Malé

LOT : 19025  
UT AV : 02/2022  
PPV : 14.30DH

LOT N° :

PPV (DH) :

UTA

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition du médicament :

### Principes actifs :

Paracétamol	240,00 mg
Maléate de chlorphénamine	3,20mg
Acide ascorbique	100,00 mg
Excipients	q.s.p une gélule
Excipients : Silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.	

### Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTALGIQUE ANTIPYRÉTIQUE.

ANTIHISTAMINIQUE INHIBITEUR DES RECEPTEURS H1

### Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient du paracétamol, un antihistaminique, la chlorphénamine et de la vitamine C.

Il est indiqué pour le traitement symptomatique de l'écoulement nasal lors d'un rhume avec maux de tête et/ou fièvre chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans.

### Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 12 ANS.

La posologie usuelle est de :

1 gélule par prise, à renouveler en cas de besoin, au bout de 4 heures, sans dépasser 5 gélules par jour.

### Mode et voie d'administration

#### VOIE ORALE

Les gélules sont à avaler telles quelles avec une boisson (par exemple : eau, lait, jus de fruit).

### Durée du traitement

La durée habituelle du traitement est de 5 jours.

Si la fièvre ne diminue pas au bout de 3 jours ou si les signes cliniques s'aggravent, ne continuez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

Devant les signes cliniques généraux d'infection, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée.

### Fréquence d'administration

Les prises de ce médicament doivent être espacées de 4 heures au minimum.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum.

Compte tenu de l'effet sédatif de ce médicament, il est préférable de commencer le traitement le soir.

### Contre-indications :

Ne prenez jamais RHINOFEERAL, gélule dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol ou aux antihistaminiques,
- Maladie grave du foie,
- Difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- Glaucome.

Ce médicament ne doit GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, RHINOFEERAL, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains effets indésirables nécessitent D'ARRETER IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT ET D'AVERTIR UN MEDECIN.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et de cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

Exceptionnellement des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou de gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

D'autres effets indésirables peuvent survenir :

- Somnolence, baisse, de vigilance plus marquées en début de traitement,
- Baisse de la mémoire ou de la concentration, vertiges (plus fréquents chez le sujet âgé),
- Incoordination motrice,
- Sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation, rétention d'urine, constipation, palpitations, baisse de pression

Docteur SADIK Fouzia

## Médecine Générale

## Echographie Générale

104, Rue Mimosas (ex Rue des Ecoles)  
1<sup>er</sup> Etage - Beauséjour  
Casablanca - Tél. : 05.22.36.58.91

M<sup>2</sup> NASR  
LAHCEN

- Urée sanguine, créatinine

Glycémie post prandiale

Cholesterol total, HDL , LDL

Acide Urique

SGOT, SGPT, Gamma GT

ASLO Bilirubine totale

PSA

Groupage

VDRL - TPHA

Toxoplasmose

Rubeole

BKD - BKC - IDR

Protéinurie des 24H

Micro-Albuminurie

Acétonurie

Ionogramme urinaire

FSH - LH

Ag Hbs-Hépatite C AC Anti H

Spermogramme - Spermocu

Clearance de la créatinine

HIV

Hémoculture

LABO BENJELLOUN  
M NASR LAHCEN  
DDN 01-07-1950



2007232025

**بَلْجِيَّةِ الْمَلَكِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ**  
**C  
re**  
**LABORATOIRE BENJELLOUN**  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Cat. E.11/1a  
Tél. : 05000 503 40 - 05622 39 32 04/63  
Fax : 05000 503 40 - 05622 39 32 04/63

## ANALYSES

22 JUIL. 2020

الدكتورة صديق فوزية  
الطب العام  
الفحص بالصدى

104، زنقة مسموذا (زنقة المدارس سابقاً)

الطباق الأول - بوسيجور

الدار البيضاء - الهاتف : 05.22.36.58.91

- Glycémie à jeun
  - Hémoglobine glycosylée
  - Triglycérides
  - NFS, VS, ~~CRP~~
  - Aspect du sérum
  - T3, T4, TSH-AC antithyroïdien
  - Anticorps antithyroïdien
  - Taux de Porthribine + INR
  - FE + CTF + Ferritine
  - Dosages de IgE totales
  - Serologie d'Helicobacter Pylori
  - Ex coproparasitologique des selles
  - Calcémie - Calcurie
  - E.C.BU + ATBgr
  - Glucosurie
  - Compte d'addis
  - F.C.V
  - Ionogrammes
  - Vitamine D
  - Ex cyto-bacteriologique vaginal+
  - ATB gram
  - Bilan de coagulation

*DR SADIK Fouzia  
Médecin  
104, Rue Mimouza Hay Errah  
101052236 5891 Casablanca*

**LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES**  
109, Boulevard Omar Al Khyam Beauséjour 20200 CASABLANCA  
Tel: 05 22 39 32 84/53 – 06000 503 40 – Whatsapp Accueil 06 63 790 723  
Fax: 05 22 39 33 65 [www.labobenjelloun.ma](http://www.labobenjelloun.ma)  
IF 51102718 – CNSS 6441662 – PATENTE 34823087 – INP 093001360 – ICE 001686316000007

**FACTURE N°: 2007232025**  
**M LAHCEN NASR**

Date: **23-07-2020**



**Récapitulatif des analyses**


<i>CN</i>	<i>Analyse</i>	<i>Val</i>	<i>Clefs</i>
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	B5	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
9005	Forfait de prise en charge pré-analytique du patient	B13	B
PS	Prélèvement Sanguin	E25	E
0216	Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)	B80	B
	Acide urique sanguin (1er jour)	B30	B
	Cholestérol total	B30	B
	Créatinine	B30	B
	Glycémie à jeun	B30	B
0361	Marqueur Tumoral :Antigène prostatique spécifique : PSA	B300	B
	Cholestérol HDL	B50	B
	Cholestérol LDL	B50	B
	Triglycérides	B60	B
	Urée	B30	B
	Vitesse de sédimentation (VS)	B30	B

**Total des B : 838**

Montant total de la facture 1148.92 DH

**Arrêtée la présente facture à la somme de mille cent quarante-huit dirhams quatre-vingt-douze centimes.**

مختبر بنجلون لتحليلات الطبية  
**LABORATOIRE BENJELLOUN**  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.503.40 - 052239.32.84/53  
Fax : 052239.33.65



Dr. Najib BENJELLOUN

Médecin Biologiste  
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

DR FOUZIA SADIK

Date de l'examen: 23-07-2020

M NASR LAHCEN

Date de naissance: 01-07-1950

Dossier N° : 2007232025



### HEMATOCYTOLOGIE

(Automates PENTRA 80 XL (ABX) – KX21N (SYSMEX) – ISED (ALCOR SCIENTIFIC))

#### NUMERATION FORMULE SANGUINE

GLOBULES ROUGES (Erythrocytes)	4,71	M/ $\mu$ l	(4,50-5,80)
Hémoglobine	14,8	g/dL	(13,0-17,0)
Hématocrite	43,3	%	(40,0-50,0)
VGM (Volume globulaire moyen)	92,0	fL	(82,0-97,0)
TCMH	31,5	pg	(27,0-32,0)
CCMH	34,2	g/dL	(32,0-36,0)

GLOBULES BLANCS (Leucocytes) 6 200 /mm<sup>3</sup> (4 000-10 000)

1-Polynucléaires Neutrophiles	42,1%	Soit	2 610/mm <sup>3</sup>	(1 500-7 000)
2-Polynucléaires Eosinophiles	6,0%	Soit	372/mm <sup>3</sup>	(80-400)
3-Polynucléaires Basophiles	0,9%	Soit	56/mm <sup>3</sup>	(0-100)
4-Lymphocytes	46,0%	Soit	2 852/mm <sup>3</sup>	(1 500-4 000)
5-Monocytes	5,0%	Soit	310/mm <sup>3</sup>	(200-1 000)

PLAQUETTES 247 000 /mm<sup>3</sup> (150 000-450 000)

**Conclusion sur l'hémogramme:** Numération formule sanguine normale.

*Remarque: Chez la femme enceinte, une chute progressive de l'hémoglobine à 11-12 g/dl dès la 10ème Semaine d'Aménorrhée.*

مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 05 00 8 403 40, 05 22 39 32 53/84  
Fax : 05 22 39 33 65

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax: 05 22 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 00168631600007 INP : 93001360





# مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste  
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR FOUZIA SADIK**

Date de l'examen: 23-07-2020

### M NASR LAHCEN

Date de naissance: 01-07-1950

Dossier N° : 2007232025



#### Vitesse de sédimentation

Résultat

(Cinétique de l'agrégation des globules rouges par rhéologie photométrique.)

1 mm/heure (<20)

Conclusion: VS normale

#### BIOCHIMIE SANGUINE – BILAN GLYCEMIQUE

COBAS C311 (ROCHE) – D10 (BIORAD)

Glycémie à jeûn 0,94 g/L (0,70–1,10)  
(Technique enzymatique à l'hexokinase) 5,22 mmol/L (3,89–6,11)

Hémoglobine glyquée (HbA1c) 5,10 % (4,00–6,00)  
(Technique Immuno-turbidimétrique – Cobas C311)

Interprétation:

% HbA1c	contrôle du taux de Glucose
4-6	Intervalle non-diabétique
6,5-7	Excellent équilibre glycémique
8-9	Assez bon équilibre glycémique
9-10	Équilibre glycémique médiocre (Action corrective suggérée*)
> 10	Mauvais équilibre glycémique (Action corrective nécessaire*)

\* Risque élevé de développer des complications cardiovasculaires à long terme comme des rétinopathies, néphropathies, neuropathies et cardiopathies.

Conclusion: Bilan glycémique normal.

مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 05 22 39 32 53/84 - 06 000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65  
Fax : 05 22 39 33 65


Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06 000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65

2/4

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360



# مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste  
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR FOUZIA SADIK**

Date de l'examen: 23-07-2020

### M NASR LAHCEN

Date de naissance: 01-07-1950

Dossier N° : 2007232025



### BIOCHIMIE SANGUINE – BILAN RENAL

COBAS C311 (ROCHE)

Urée

(Technique enzymatique à l'uréase UV)

Créatinine

(Technique cinétique selon la méthode de Jaffé)

0,36 g/L

5,99 mmol/L

(0,10–0,50)

11,40 mg/L

100,9  $\mu$ mol/L

(1,67–8,33)

(7,00–13,00)

(62,0–115,1)

Conclusion: Fonction rénale normale

Acide Urique

(Technique colorimétrique enzymatique.)

63,0 mg/L

378,0  $\mu$ mol/L

(34,0–70,0)

(204,0–420,0)

### BIOCHIMIE SANGUINE – BILAN LIPIDIQUE

COBAS C311 (ROCHE)

Aspect du sérum: Limpide

Cholestérol total

(Technique colorimétrique enzymatique.)

1,74 g/L

4,49 mmol/L

(<2,00)

(<5,16)

Conclusion: Taux du cholestérol normal.

HDL-Cholestérol

(Technique colorimétrique enzymatique en phase homogène)

0,39 g/L

1,01 mmol/L

(>0,55)

(>1,42)

LDL-Cholestérol

(Calculé selon la formule de Friedwald)

1,10 g/L

2,85 mmol/L

(<1,60)

(<4,14)

Triglycérides

(Technique colorimétrique enzymatique)

1,25 g/L

1,43 mmol/L

(<1,50)

(<1,71)

Conclusion: Taux des triglycérides normal.

مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 0522 39 32 53 / 06000 503 40 - Fax : 0522 39 33 65  
Fax : 0522 39 33 65

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50


109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

3/4

CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360





# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste  
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR FOUZIA SADIK**

Date de l'examen: 23-07-2020

**M NASR LAHCEN**

Date de naissance: 01-07-1950

Dossier N° : 2007232025



### MARQUEURS TUMORAUX


Cobas E411(ROCHE) – AIA 360 (TOSOH)

23-10-2017

Antigène Prostatique Spécifique (PSA) 1,800 ng/mL (<6,200) 2,580  
(Electro-Chimi-Luminescence Roche) 1,800 µg/L (<6,200)

**Conclusion:** Le PSA est normal pour l'âge du patient.

NB: Dans le cadre du dépistage des affections prostatiques, il est conseillé de faire un dosage annuel du PSA total.



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 05 22 39 32 53/84 - 06 000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)  
CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50



109, Bd. Omar Al Khayam - 20200 Casablanca (en face du CAF) - Tél: 05 22 39 32 53/84 - 06 000 503 40 - Fax: 05 22 39 33 65  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360