

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

<i>N° D</i>		<i>N° W19-532101</i>
<i>34136.</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique
Cadre réservé à l'adhérent(e)		<input type="checkbox"/> Autres
Matricule : <i>3208</i>	Société : <i>Retraite</i>	
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :
Nom & Prénom : <i>Benjelloun Briss</i>		
Date de naissance : <i>1951/03/07</i>		
Adresse : <i>Tachoreek Tronche 18 immeuble appart 17</i>		
Tél. : <i>06 74 27 30 61</i>	Total des frais engagés : <i>B</i> Dhs	
Cadre réservé au Médecin		
Dr ASMAA WATIK Spécialiste en Rhumatologue Echographie - Kinesitherapie Casablanca Tel : 05 22 71 89 30		
Cachet du médecin :		
Date de consultation : <i>08/07/2020</i>	Age :	
Nom et prénom du malade : <i>CHAKIK HABIB</i>		
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant	
Nature de la maladie : <i>Aff Rhum</i>	<i>24 mois</i>	
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :		
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.		
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.		
Fait à : <i>08/07/2020</i>	Le : <i>08/07/2020</i>	
Signature de l'adhérent(e) : <i>B</i>		

ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/07/2020	CS		200 DH	INP : 091239103 Dr. ASMAA WATIK Spécialiste en Rhumatologue Echographie - Kinesitherapie Casablanca 06-21 89 30

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharma Cie SA Dr. Farid Al Maalej 8d. Med Zayan 7600-114 0522707600-114</i>	08/7/20	802,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES RADIOGRAPHIQUES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
			

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODDF

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

Docteur WATIK Asmaa

Spécialiste en Rhumatologie

Rhumatismes Articulaires, Ostéoporose, maladies de l'Os, des Muscles, des Tendons et de la Colonne Vertébrale

- Ancienne Interne et Rhumatologue au CHU Ibn Rochd de Casablanca
- Ex-Rhumatologue au CHU Erasme de bruxelles-Belgique
- Echographie Ostéo-articulaire.
- Traitements par Plasma riche en plaquettes (PRP)
- Diplôme Universitaire dans le traitement des douleurs.
- Réhabilitation du sportif en Kinesithérapie.



CABINET
Dr. WATIK

الدكتورة وثيق أسماء

أخصائية في علاج أمراض الروماتيزم والظامان والمفاصل وهشاشة العظام والعضلات والأوتار والعمود الفقري

- طبيبة داخلية وأخصائية سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء
- أخصائية سابقاً بالمستشفى الجامعي إبرازم - بربور كسيبل - بلجيكا
- دبلوم جامعي في فحص المفاصل بالصدى (إيكوغرافيا)
- العلاج بالدم الغني بالصفائح (البلازما)
- دبلوم جامعي في علاج الآلام
- الترويض الطبي والرياضي

Casablanca, le : 08/01/2023

Dr. ASMAA WATIK
Spécialiste en Rhumatologie
Echographie - Kinesithérapie
Tél. 0522 71 89 30

M → Habib -
255,00 (x2)
11 - ALYSE 75 mg gel
1 gel le soir après repas x 2j
ipms 1 gel x 2j pris poudre 60g
M6,40
21 - FLOXAM 500 (Boîte de 24)
28,80 (x4) 1 gel x 2j un repas x 8j
31 - VITANEURIX FORT sp
2g x 2j après repas x 30j = 4 boîtes.



SAHNOUA

PHARMACIE

SAHNOUA

PHARMACIE



VITANEVRIL FORT 100 mg,

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hydromel

Macrogol 400 ; et l'eau purifiée

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme)

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri,

- prophylaxie des états de carence vitaminique et apports alimentaires (par exemple : malabsorption riches en protéines non supplémentées, nucléosides associée avec les autres vitamines du groupe B)

- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyarthrite et polyneurrite

- proposé dans d'autres polyarthrites supposées et utilisée, à forte dose, dans certains syndromes neurologiques

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :
Voie orale.

- Durée du traitement :
se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :
2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS
ATTENTION !

DANS QUELIS) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HÉSITEZ PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Pourrons-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSieurs MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Caution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament à la grossesse.

Il est recommandé à éviter pendant l'allaitement.

NERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA SÉCURISATION DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER LE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'COMMENCER.

POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITE VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES



CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS

NECESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE

de prescription et de délivrance

- Précautions particulières de conservation

- Tenir hors de la portée des enfants

- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

VITANEVRIL FORT 100 mg,

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hydromel

Macrogol 400 ; et l'eau purifiée

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme)

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri,
- prophylaxie des états de carence vitaminique

apports alimentaires (par exemple : malabsorption riches en protéines non supplémentées, nu

association avec les autres vitamines du groupe
proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de

proposé dans d'autres polyénivités supposées
utilisée, à forte dose, dans certains syndromes t

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

- Durée du traitement :

se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUELIS) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HÉSITEZ PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Parlons-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSieurs MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Caution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament à la grossesse.

Il est recommandé à éviter pendant l'allaitement.

NERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER LE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT L'ALLAITEMENT.

POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITE VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES



CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS

NECESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE

de prescription et de délivrance

- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC
20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam
Roches Noires
20300 Casablanca
Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

VITANEVRIL FORT 100 mg,

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s) par unité de prise

Benfotiamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate

magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hydromel

Macrogol 400 ; et l'eau purifiée

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme)

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béri-béri,

- prophylaxie des états de carence vitaminique et apports alimentaires (par exemple : malabsorption riches en protéines non supplémentées, nucléosides associée avec les autres vitamines du groupe B)

- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyarthrite et polyneurrite

- proposé dans d'autres polyarthrites supposées et utilisée, à forte dose, dans certains syndromes

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

- Durée du traitement :

se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUELIS) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HÉSITEZ PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Pourrons-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;

- Interactions avec les aliments et les boissons ;

- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSieurs MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Caution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament à la grossesse.

Il est recommandé à éviter pendant l'allaitement.

NERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER LE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT L'ALLAITEMENT.

POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITE VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES



CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS

NECESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE

de prescription et de délivrance

Précautions particulières de conservation

- Tenir hors de la portée des enfants

- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

FLOXAM®

(FLUCLOXACILLINE)

Penicilline insensible à la penicillinase.

PRESENTATIONS :

- Boîte de 16 gélules à 500 mg
- Boîte de 24 gélules à 500 mg
- Flacon de 12 doses de poudre pour 60 ml de suspension orale dosée à 250 mg / 5 ml
- Flacon de 20 doses de poudre pour 100 ml de suspension orale dosée à 250 mg / 5 ml
- Boîte de 1 flacon de poudre à 500 mg + 1 ampoule de solvant pour injection intra-musculaire (Alcool benzylique à 3 %)
- Boîte de 1 flacon de poudre à 1 g + 1 ampoule de solvant pour injection intra-musculaire (Alcool benzylique à 3 %)
- Boîte de 1 flacon de poudre à 250 mg + 1 ampoule de solvant eau ppi .
- Boîte de 6 flacons de poudre à 1 g + 6 ampoules de solvant pour injection intra-musculaire (Alcool benzylique à 3 %)

COMPOSITION :

- Gélules à 500 mg :

Flucloxacilline (DCI) 500 mg (s
Excipient qs 1 gélule.

- Poudre pour suspension buv

Flucloxacilline (DCI) 250 mg (s
Excipient qsp 6,5 g de poudre

- Injectables à 250 mg :

Flacon de poudre contenant
ampoule de 3 ml de solvant e

- Injectables à 500 mg :

Flacon de poudre contenant
ampoule de 5 ml de solvant i

- Injectables à 1 g :

Flacon de poudre contenant
de 5 ml de solvant intra-mu

PROPRIETES :

Antibiotique de la famille des
résistant à la pénicillinase et

La Flucloxacilline est bactéricide

Spectre d'activité : c'est avant
cus epidermitis, streptococcus p

anthracis, neisseria spp

La Flucloxacilline diffuse largement dans les tissus. Elle est retrouvée dans le muscle, les poumons, les liquides d'épanchement péricardique, pleural, synovial, la lymphe, l'abcès non caséux, le tissu sous-cutané, les amygdales, l'os et l'oreille moyenne.

INDICATIONS :

Découlent de son activité bactéricide anti-staphylococcique.

Son intérêt réside dans les staphylococcies cutanées, muqueuses, et les localisations de la sphère ORL.

Prophylaxie des infections post-opératoires (chirurgie cardio-thoracique et orthopédique).

Dans les infections pleuro-pulmonaires, ostéoarticulaires, les septicémies, les endocardites, le choc septique et les infections méningées, une association est habituellement conseillée.

Ce médicament ne contenant pas de sucre, il peut être administré au diabétique et en cas de mauvais état dentaire ou de régime hypocalorique.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Voie orale : (1/2 heure avant les repas)

Adultes : 500 mg 3 à 4 fois / 24 heures

Enfants et Nourrissons : 25 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises, soit une cuillerée-mesure
dosée à 250 mg / 5 ml 2 à 3 fois par jour

PPV 116DH40

LOT 9D028 1
EXP 02/2022

mesure de 5 ml .
n de 20 doses.

sodique monohydraté) +

sodique monohydraté) +

monohydraté) + ampoule

azoles semi-synthétiques,

actérienne.

coccus aureus, staphylococ-

dans, clostridium spp, bacillus

60,90
4 - MELOXAM 15mg (Δ Δ 14)
P - 113 P epris aps x 14j



Docteur WATIK Asmaa

Spécialiste en Rhumatologie

Rhumatismes Articulaires, Ostéoporose, maladies de l'Os, des Muscles, des Tendons et de la Colognne Vertébrale

- Ancienne Interne et Rhumatologue au CHU Ibn Rochd de Casablanca
- Ex-Rhumatologue au CHU Erasme de bruxelles-Belgique
- Echographie Ostéo-articulaire.
- Traitement par Plasma riche en plaquettes (PRP)
- Diplôme Universitaire dans le traitement des douleurs.
- Réhabilitation du sportif en Kinesithérapie.



CABINET
Dr. WATIK

الدكتورة وثيق أسماء

أخصائية في علاج أمراض الروماتيزم والظامان والمفاصل وهشاشة العظام والعضلات والأوتار والعمود الفقري

- طبيبة داخلية وأخصائية سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء
- أخصائية سابقاً بالمستشفى الجامعي إبرازم - بربو-كسيل - بلجيكا
- دبلوم جامعي في فحص المفاصل بالصدى (إيكوغرافيا)
- العلاج بالعلم المقطعي للصفيحة (البلازما)
- دبلوم جامعي في علاج الألم
- الترويض الصفيحي بالأشعري

Casablanca, le

Dr. ASMAA WATIK
Specialiste en Rhumatologie
Echographie - Kinesitherapie

Habiba .

M = CHAKIK

• Rx des pins (P) : ébauches
calomélumes blisters

Dr. ASMAA WATIK
Spécialiste en Rhumatologue
Echographie - Kinesitherapie

Casablanca
Tél : 05 22 71 89 30



شارع محمد الزفزاف، إقامة يحيى، الطابق 1، رقم 3، سيدى مومن، التشارك، الدار البيضاء (قرب التكوين المهني)
Bd. Mohammed Zefzaf, Résidence Yahya, N° 3. Sidi Moumen, Attcharouk, Casablanca (près de OFPPPT)

☎ 05 22 71 89 30 ☐ cabinetdrwatik@gmail.com

Docteur WATIK Asmaa

Spécialiste en Rhumatologie

Rhumatismes Articulaires, Osteoporose, maladies de l'Os, des Muscles, des Tendons et de la Colognne Vertébrale

- Ancienne Interne et Rhumatologue au CHU Ibn Rochd de Casablanca
- Ex-Rhumatologue au CHU Erasme de bruxelles-Belgique

- Echographie Ostéo-articulaire.
- Traitement par Plasma riche en plaquettes (PRP)
- Diplôme Universitaire dans le traitement des douleurs.
- Réhabilitation du sportif en Kinesithérapie.

ICE: 008045422000071

INPE: 091239103



CABINET
Dr. WATIK

الدكتورة وثيق أسماء

أخصائية في علاج أمراض الروماتيزم والظامان والمفاصل وهشاشة المظاام والعضلات والأوتار والعمود الفقري

- طببة داخلية وأخصائية سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء
- أخصائية سابقاً بالمستشفى الجامعي إبرازم - بربوكسل - بلجيكا
- دبلوم جامعي في فحص المفاصل بالصدى (إكغرافيا)
- العلاج بالدم الغني بالصفائح (البلازما)
- دبلوم جامعي في علاج الآلام
- الترويض الطبي والرياضي

Casablanca, le : 08/07/2020

Note d'honoraires

Mme CHAKIR - HABIBA

A versé la facture à la somme de

trois cents dirhams pour

Rx des ASMAA WATIK
Spécialiste en Rhumatologue
Echographie - Kinesitherapie
Casablanca
Tél: 05 22 71 89 30 (P)

Total => 300,00 DH

Dr. ASMAA WATIK
Spécialiste en Rhumatologue
Echographie - Kinesitherapie
Casablanca
Tél: 05 22 71 89 30



شارع محمد الزفزاف، إقامة يحيى، الطابق 1، رقم 3، سيدى مومن، التشارك، الدار البيضاء (قرب التكوين المهني)
Bd. Mohammed Zefzaf, Résidence Yahya, N° 3. Sidi Moumen, Attacharouk, Casablanca (près de OFPPT)

☎ 05 22 71 89 30 ☐ cabinetdrwatk@gmail.com