

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19- 0026270

N° D: 34846 .

 Optique Autres Maladie Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3170 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : RARHIB EL MAATI

Date de naissance : 01/01/1937

Adresse : SIDI OTHMANE BLOC 42 N° 1 CASA

Tél. : 06 19 60 66 15 Total des frais engagés : 2638,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

DR. RELEATMI Moham

D.U en Diabétologie D.U en Endocrinologie
Diplôme en Echographie
Diplôme en Médecine du Travail
Membre de la Société Francophone de Diabète
Bd. Reda Guedira, Cite Djamaa Casablanca
Tél.: 05 22 58 56 61 E-mail: helmonia@normair

Cachet du médecin :

Date de consultation : 24/07/2020 Nom et prénom du malade : Rarhib El Maati Age : 1927

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : maladie de Parkinson

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le 107/2020

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2017/2018	4		20000 D.U.	BELFATIMA M. BELMOHAMMED en Diabétologie D.U en Nutrition Diplôme en Echographie Diplôme en Médecine du Travail Membre de la Société Francophone de Diabéologie Bd. Reda Guedira, Cité Djamaâ - Casablanca Tél: 05 22 55 56 61 - E-mail: belmoha@hotmail.com

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	26.7.2020	1998.40
	26/07/2020	460,00 PHS

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires



AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		Coefficient DES TRAVAUX
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 D —————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B		MONTANTS DES SOINS
		(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

LET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur MOHAMED BELFATMI

- D.U en Diabétologie
- D.U en Nutrition
- Membre de la société Francophone de Diabétologie
- Ex. médecin chef de l'unité de Diabétologie
- Au Centre Hospitalier Moulay Rachid
- Diplômé en Echographie
- Spécialiste en médecine de travail

الدكتور محمد بالفاطمي

- دبلوم جامعي في داء السكري
- دبلوم جامعي في التغذية
- عضو الجمعية الفرنكوبونية لداء السكري
- رئيس وحدة داء السكري
- بالمراكز الاستشفائية مولاي رشيد سابقًا
- شهادة الفحص باصدقى
- أخصائى فى طب الشغل

24 JUIL 2020

Casablanca le 25 JUIL 2020 الدار البيضاء في

M. RAHIB. ELMAJI

→ Educational Attainment

Grade \leq $\begin{matrix} 12 \\ 10 \\ 10 \end{matrix}$ 



TOURTEA 

Md.
R.
Mou.

Adjuvant 85 

Hypnotic 

Eridium 0 1

T Prost 0 0 1

700 Tegumic  perme.

0522565661 شبابع حصل على أكديمة (البلد سابقًا) 546 قرية الجماعة الدار البيضاء، الهاتف: 0522565661
Boulevard reda Guedra Ex : Bd Nil N°546 - Casablanca Cité Djamaa

Dr. BELFATMI Mohamed
D.U. en Diabétologie et en Echographie
Diplôme d'Etat en Education de la Santé
M. en Social et Culture, Cité Djamaa, Casablanca
E-mail: belmoha@hotmail.com



12.70

Tél.0522565661/E-mail : dr-belmoha@hotmail.fr

1978.40

Aerius® 5 mg comprimés pelliculés

Desloratadine



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin ou à
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable

LOT : 082-1
PER : FEV 2022
PPV : 120 DH 70

si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
ez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius
3. Comment prendre Aerius
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aerius
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé ?

Qu'est-ce que Aerius ?

Aerius contient de la desloratadine qui est un antihistaminique.

Comment agit Aerius ?

Aerius est un médicament contre l'allergie qui ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

Quand Aerius doit-il être utilisé ?

Aerius soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens) chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus. Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démange, les démangeaisons du palais, les yeux qui démangent, qui sont rouges ou larmoyants.

Aerius est aussi utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius ?

Ne prenez jamais Aerius

- si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ou à la loratadine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre Aerius :

- si vous présentez une maladie des reins.
- si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de convulsions

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 12 ans.

de votre médecin.

Si vous avez pris Aerius, mais que vous n'auriez pas été prescrit. Aucun problème sérieux n'est attendu lors d'un surdosage accidentel. Cependant, si vous avez pris plus d'Aerius que vous n'auriez dû, prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Si vous oubliez de prendre Aerius

Si vous oubliez de prendre votre dose à temps, prenez-la dès que possible, puis continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Aerius

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Depuis la commercialisation d'Aerius, des cas de réactions allergiques sévères (difficulté à respirer, sifflements bronchiques, démangeaisons, urticaire et gonflements) ont été très rarement rapportés. Si vous ressentez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin.

Lors des essais cliniques chez les adultes, les effets indésirables étaient à peu près les mêmes que ceux observés avec un comprimé placebo. Cependant, la fatigue, la sécheresse de la bouche et le mal de tête ont été rapportés plus souvent qu'avec un comprimé placebo. Chez les adolescents, le mal de tête était l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté.

Dans les essais cliniques avec Aerius, les effets indésirables suivants ont été rapportés : Fréquent : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 : Fatigue, sécheresse de la bouche, maux de tête

Adultes

Depuis la commercialisation d'Aerius, les effets indésirables suivants ont été rapportés : Très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000 : Réactions allergiques sévères, éruption cutanée, battements du cœur irréguliers ou plus intenses, battements du cœur rapides, douleur d'estomac, nausées, vomissements, pesanteur d'estomac, diarrhées, vertige, somnolence, insomnie, douleur musculaire, hallucinations, convulsions, agitation avec mouvements corporels

Augmentés, inflammation du foie, anomalies du bilan hépatique sanguin.

Fréquence indéterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de 20.

Hydrochlorothiazide

30,00

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Il est essentiel que vous compreniez toutes les informations importantes pour vous.
Si vous avez des questions, vous devriez avoir besoin de la réponse.
Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les maladies sont identiques aux vôtres.
Si une personne présente des réactions graves et indésirables mentionnées dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

- Quo contient cette notice :
- Est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et billes ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre comprimés sécables ?
- Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
- Quels sont les effets indésirables courants ?
- Informations complémentaires sur ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SÉCABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament appartient à la classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines. (Code ATC : CGAA03).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

• Informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si vous (médecin ou pharmacien) d'avez intolerance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé dans ce médicament.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessous, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, avisez votre médecin :

- Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé,

- Si vous avez une maladie cardiaque ou une maladie appelée « lupus erythémateux » (appelée également lupus ou maladie de LED).

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque anormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous avez une maladie de goutte (crystaux d'acide urique dans les articulations).

- Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme,

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Si vous avez eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre peau a rougi, ou si le traitement vous aide, protégez votre peau des

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Ce médicament peut être administré en cas de maladie coeliaque (difficulté d'absorption du gluten par l'intestin). L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace, et est donc considéré comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie coeliaque.

PPV :

Exp :

N° Lot :

SIDREX 25 mg, comprimés sécables ?

sage, istration :

médicament en suivant exactement les indications de

ecn ou pharmacien en cas de doute.

médicament en suivant exactement les instructions de

s de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de

n en cas de doute.

Le traitement est de 2 comprimés sécables par jour mais la dose sera ensuite réduite à 1 ou 2 comprimés sécables par jour.

Hypertension artérielle :

La dose recommandée est de 1 ou 1 comprimé sécable par jour. Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avez le(s) comprimé(s) sécable(s) avec un verre d'eau.

Fréquence administration

Deux fois par jour à intervalles réguliers (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement entraîne les effets attendus.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre médecin ou au pharmacien.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'aurez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des étourdissements, des troubles de l'équilibre ou une sensation cardiaque, une tension artérielle basse (reconnaisable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour faire rattraper une dose manquée.

Si vous arrêtez de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre ESIDREX sauf si votre médecin vous le demande. Si vous interrompez le traitement, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

4. QUELLES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement :

Si vous développez une réaction aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

- Augmentation du taux de lipides dans le sang (hyperlipidémie).

- Diminution du taux de potassium dans le sang (hypokaliémie).

- Augmentation du taux d'acide urique dans le sang (hyperuricémie).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Insuffisance rénale aiguë (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

- Aggravation d'une maladie existante.

- Sensibilité aigüe à la peau au soleil.

Metformine Win®

Chlorhydrate de metformine

500 mg 850 mg 1000 mg

acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées "corps gras" et qui peut provoquer un pré-coma diabétique. Les plus particulièrement une douleur à l'estomac, et profonde, une envie de dormir ou une urticaire inhabituelle.

trop d'eau (déshydratation), par exemple persistante ou sévère, ou si vous avez vomi ilée. La déshydratation peut entraîner des symptômes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose. Faites attention avec Metformine Win »

z une infection grave, par exemple une infection des bronches, ou une infection des reins. Des sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

us prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque ou vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

Si vous consommez beaucoup d'alcool. Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine;
- vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Vous devez arrêter de prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales

Faites attention avec Metformine Win :

Veuillez noter le risque particulier suivant d'acidose lactique

Metformine Win peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre (douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé(e) immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre Metformine Win et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

Metformine Win à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez

Comprimé pelliculé

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un problème supplémentaire, n'hésitez pas à demander plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement pour vous. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes sont identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Metformine Win, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Metformine Win, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Metformine Win contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

Indications thérapeutiques

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Chez l'adulte, il peut être prescrit seul ou en association avec un autre antidiabétique oral ou l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent : il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

Metformine Win 1000 mg peut remplacer deux comprimés dosés à 500 mg de metformine lorsque le traitement nécessite une dose de 2 ou 3 grammes par jour de metformine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Metformine Win, comprimé pelliculé?

Contre-indications

Ne prenez jamais Metformine Win :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir « Que contient Metformine Win » dans la rubrique 6. « Informations supplémentaires »).
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.
- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une

Metformine Win®

Chlorhydrate de metformine

500 mg 850 mg 1000 mg

acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps gras » et qui peut provoquer un pré-coma diabétique. Les plus particulièrement une douleur à l'estomac, et profonde, une envie de dormir ou une urticaire inhabituelle.

trop d'eau (déshydratation), par exemple persistante ou sévère, ou si vous avez vomi ilée. La déshydratation peut entraîner des symptômes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose. Faites attention avec Metformine Win »

z une infection grave, par exemple une infection des bronches, ou une infection des reins. Des sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

us prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque ou vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

Si vous consommez beaucoup d'alcool. Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine;
- vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Vous devez arrêter de prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales

Faites attention avec Metformine Win :

Veuillez noter le risque particulier suivant d'acidose lactique

Metformine Win peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre (douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé(e) immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre Metformine Win et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

Metformine Win à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez

Comprimé pelliculé

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un problème supplémentaire, n'hésitez pas à demander plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement pour vous. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes sont identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Metformine Win, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Metformine Win, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Metformine Win contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

Indications thérapeutiques

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Chez l'adulte, il peut être prescrit seul ou en association avec un autre antidiabétique oral ou l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent : il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

Metformine Win 1000 mg peut remplacer deux comprimés dosés à 500 mg de metformine lorsque le traitement nécessite une dose de 2 ou 3 grammes par jour de metformine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Metformine Win, comprimé pelliculé?

Contre-indications

Ne prenez jamais Metformine Win :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir « Que contient Metformine Win » dans la rubrique 6. « Informations supplémentaires »).
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.
- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une

Metformine Win®

Chlorhydrate de metformine

500 mg 850 mg 1000 mg

acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps gras » et qui peut provoquer un pré-coma diabétique. Les plus particulièrement une douleur à l'estomac, et profonde, une envie de dormir ou une urticaire inhabituelle.

trop d'eau (déshydratation), par exemple persistante ou sévère, ou si vous avez vomi ilée. La déshydratation peut entraîner des symptômes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose. Faites attention avec Metformine Win »

z une infection grave, par exemple une infection des bronches, ou une infection des reins. Des sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

us prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque ou vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

Si vous consommez beaucoup d'alcool. Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine;
- vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Vous devez arrêter de prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales

Faites attention avec Metformine Win :

Veuillez noter le risque particulier suivant d'acidose lactique

Metformine Win peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre (douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé(e) immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre Metformine Win et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

Metformine Win à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez

Comprimé pelliculé

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un problème supplémentaire, n'hésitez pas à demander plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement pour vous. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes sont identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Metformine Win, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Metformine Win, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Metformine Win contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

Indications thérapeutiques

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Chez l'adulte, il peut être prescrit seul ou en association avec un autre antidiabétique oral ou l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent : il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

Metformine Win 1000 mg peut remplacer deux comprimés dosés à 500 mg de metformine lorsque le traitement nécessite une dose de 2 ou 3 grammes par jour de metformine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Metformine Win, comprimé pelliculé?

Contre-indications

Ne prenez jamais Metformine Win :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir « Que contient Metformine Win » dans la rubrique 6. « Informations supplémentaires »).
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.
- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une

Metformine Win®

Chlorhydrate de metformine

500 mg 850 mg 1000 mg

acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées "corps gras" et qui peut provoquer un pré-coma diabétique. Les plus particulièrement une douleur à l'estomac, et profonde, une envie de dormir ou une urticaire inhabituelle.

trop d'eau (déshydratation), par exemple persistante ou sévère, ou si vous avez vomi ilée. La déshydratation peut entraîner des symptômes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose. Faites attention avec Metformine Win »

z une infection grave, par exemple une infection des bronches, ou une infection des reins. Des sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

us prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque ou vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

Si vous consommez beaucoup d'alcool. Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine;
- vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Vous devez arrêter de prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales

Faites attention avec Metformine Win :

Veuillez noter le risque particulier suivant d'acidose lactique

Metformine Win peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre (douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé(e) immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre Metformine Win et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

Metformine Win à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez

Comprimé pelliculé

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un problème supplémentaire, n'hésitez pas à demander plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement pour vous. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes sont identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Metformine Win, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Metformine Win, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Metformine Win contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

Indications thérapeutiques

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2.

- Chez l'adulte, il peut être prescrit seul ou en association avec un autre antidiabétique oral ou l'insuline.
- Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent : il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

Metformine Win 1000 mg peut remplacer deux comprimés dosés à 500 mg de metformine lorsque le traitement nécessite une dose de 2 ou 3 grammes par jour de metformine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Metformine Win, comprimé pelliculé?

Contre-indications

Ne prenez jamais Metformine Win :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir « Que contient Metformine Win » dans la rubrique 6. « Informations supplémentaires »).
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.
- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une

Metformine Win®

Chlorhydrate de metformine

500 mg 850 mg 1000 mg

acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps gras » et qui peut provoquer un pré-coma diabétique. Les plus particulièrement une douleur à l'estomac, et profonde, une envie de dormir ou une urticaire inhabituelle.

trop d'eau (déshydratation), par exemple persistante ou sévère, ou si vous avez vomi ilée. La déshydratation peut entraîner des symptômes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose. Faites attention avec Metformine Win »

z une infection grave, par exemple une infection des bronches, ou une infection des reins. Des sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

us prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque ou vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

Si vous consommez beaucoup d'alcool. Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine;
- vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Vous devez arrêter de prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales

Faites attention avec Metformine Win :

Veuillez noter le risque particulier suivant d'acidose lactique

Metformine Win peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre (douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé(e) immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre Metformine Win et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

Metformine Win à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez

Comprimé pelliculé

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un problème ou une demande plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Metformine Win, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Metformine Win, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Metformine Win contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

Indications thérapeutiques

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2.

• Chez l'adulte, il peut être prescrit seul ou en association avec un autre antidiabétique oral ou l'insuline.

• Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent : il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

Metformine Win 1000 mg peut remplacer deux comprimés dosés à 500 mg de metformine lorsque le traitement nécessite une dose de 2 ou 3 grammes par jour de metformine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Metformine Win, comprimé pelliculé?

Contre-indications

Ne prenez jamais Metformine Win :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir « Que contient Metformine Win » dans la rubrique 6. « Informations supplémentaires »).
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.
- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une

Metformine Win®

Chlorhydrate de metformine

500 mg 850 mg 1000 mg

acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps gras » et qui peut provoquer un pré-coma diabétique. Les plus particulièrement une douleur à l'estomac, et profonde, une envie de dormir ou une urticaire inhabituelle.

trop d'eau (déshydratation), par exemple persistante ou sévère, ou si vous avez vomi ilée. La déshydratation peut entraîner des symptômes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose. Faites attention avec Metformine Win »

z une infection grave, par exemple une infection des bronches, ou une infection des reins. Des sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

us prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque ou vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

Si vous consommez beaucoup d'alcool. Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine;
- vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Vous devez arrêter de prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales

Faites attention avec Metformine Win :

Veuillez noter le risque particulier suivant d'acidose lactique

Metformine Win peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre (douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé(e) immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre Metformine Win et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

Metformine Win à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez

Comprimé pelliculé

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un problème supplémentaire, n'hésitez pas à demander plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement pour vous. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes sont identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Metformine Win, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Metformine Win, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Metformine Win contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

Indications thérapeutiques

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Chez l'adulte, il peut être prescrit seul ou en association avec un autre antidiabétique oral ou l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent : il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

Metformine Win 1000 mg peut remplacer deux comprimés dosés à 500 mg de metformine lorsque le traitement nécessite une dose de 2 ou 3 grammes par jour de metformine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Metformine Win, comprimé pelliculé?

Contre-indications

Ne prenez jamais Metformine Win :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir « Que contient Metformine Win » dans la rubrique 6. « Informations supplémentaires »).
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.
- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une

Metformine Win®

Chlorhydrate de metformine

500 mg 850 mg 1000 mg

acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées "corps gras" et qui peut provoquer un pré-coma diabétique. Les plus particulièrement une douleur à l'estomac, et profonde, une envie de dormir ou une urticaire inhabituelle.

trop d'eau (déshydratation), par exemple persistante ou sévère, ou si vous avez vomi ilée. La déshydratation peut entraîner des symptômes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose. Faites attention avec Metformine Win »

z une infection grave, par exemple une infection des bronches, ou une infection des reins. Des sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

us prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque ou vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

Si vous consommez beaucoup d'alcool. Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine;
- vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Vous devez arrêter de prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales

Faites attention avec Metformine Win :

Veuillez noter le risque particulier suivant d'acidose lactique

Metformine Win peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre (douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé(e) immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre Metformine Win et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

Metformine Win à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez

Comprimé pelliculé

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un problème supplémentaire, n'hésitez pas à demander plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement pour vous. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes sont identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Metformine Win, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Metformine Win, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Metformine Win contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

Indications thérapeutiques

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Chez l'adulte, il peut être prescrit seul ou en association avec un autre antidiabétique oral ou l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent : il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

Metformine Win 1000 mg peut remplacer deux comprimés dosés à 500 mg de metformine lorsque le traitement nécessite une dose de 2 ou 3 grammes par jour de metformine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Metformine Win, comprimé pelliculé?

Contre-indications

Ne prenez jamais Metformine Win :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir « Que contient Metformine Win » dans la rubrique 6. « Informations supplémentaires »).
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.
- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une

Metformine Win®

Chlorhydrate de metformine

500 mg 850 mg 1000 mg

acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées "corps gras" et qui peut provoquer un pré-coma diabétique. Les plus particulièrement une douleur à l'estomac, et profonde, une envie de dormir ou une urticaire inhabituelle.

trop d'eau (déshydratation), par exemple persistante ou sévère, ou si vous avez vomi ilée. La déshydratation peut entraîner des symptômes qui peuvent vous mettre en danger d'acidose. Faites attention avec Metformine Win »

z une infection grave, par exemple une infection des bronches, ou une infection des reins. Des sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

us prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque ou vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec Metformine Win » ci-dessous).

Si vous consommez beaucoup d'alcool. Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si :

- vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine;
- vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Vous devez arrêter de prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suivez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales

Faites attention avec Metformine Win :

Veuillez noter le risque particulier suivant d'acidose lactique

Metformine Win peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre (douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé(e) immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre Metformine Win et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

Metformine Win à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez

Comprimé pelliculé

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un problème supplémentaire, n'hésitez pas à demander plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement pour vous. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes sont identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que Metformine Win, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Metformine Win, comprimé pelliculé ?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Metformine Win, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Metformine Win contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

Indications thérapeutiques

Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un antidiabétique oral destiné au traitement du diabète de type 2. Chez l'adulte, il peut être prescrit seul ou en association avec un autre antidiabétique oral ou l'insuline.

Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent : il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

Metformine Win 1000 mg peut remplacer deux comprimés dosés à 500 mg de metformine lorsque le traitement nécessite une dose de 2 ou 3 grammes par jour de metformine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Metformine Win, comprimé pelliculé?

Contre-indications

Ne prenez jamais Metformine Win :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir « Que contient Metformine Win » dans la rubrique 6. « Informations supplémentaires »).
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.
- Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Toujeo®

300 unités/r

solution injectable en stylo pr
Insuline glargin



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Toujeo et

Si vous souffrez de diabète de type 1 et que vous êtes malade ou blessée :

- N'arrêtez pas votre insuline
- Continuez de prendre suffisamment de glucides.

Venez toujours les personnes qui s'occupent de vous ou vous traitent que vous souffrez de diabète.

Un traitement par l'insuline peut entraîner la formation par l'organisme d'anticorps anti-insuline (substances qui agissent contre l'insuline). Dans de rares cas, il faut alors modifier votre dose d'insuline.

Voyages

Avant de partir en voyage, consultez votre médecin pour vous informer sur les points suivants:

- Disponibilité de votre insuline dans le pays où vous allez.
- Fourniture d'insuline, d'aiguilles et des autres accessoires.
- Conservation adéquate de votre insuline pendant le voyage.
- Horaire des repas et des injections d'insuline pendant le voyage.
- Effets possibles du changement de fuseau horaire.
- Tout risque éventuel pour votre santé dans les pays visités,
- Ce que vous devez faire dans les situations d'urgence lorsque vous vous sentez souffrant ou malade.

Enfants et adolescents

utilisé chez l'enfant ou

Notice : Informations pour l'utilisateur

(voir rubrique 3).
contre insuline d'uti-

Apidra® SoloStar®

100 unités/ml
solution injectable en
stylo prérempli

insuline glulisine

SANOFI



Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
Apidra 100U/ml, Inj b6 sty
P.P.V : 439,00 DH



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Veuillez également lire le mode d'emploi d'Apidra SoloStar, stylo prérempli.

– Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

– Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

– Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

– Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

articuliers

à vo
rmie
entive
cernai
sang),
ysique (

Voyages

Si vous avez des pro
parlez-en à votre me
besoin d'une dose p
Il n'existe pas de do
l'utilisation de Apidr
6 ans.

Avant de partir en vo
pour vous informer s
– disponibilité de vo
vous allez,
– fourniture d'insuli
– conservation adéq
le voyage,

– horaire des repas e
pendant le voyage,
– effets possibles du
horaire,

– nouveaux risques e
dans les pays visité
– ce que vous devez
d'urgence lorsque
malad



<MAT>542660

Notice : Informations pour l'utilisateur

(voir rubrique 3).
contre insuline d'uti-

Apidra® SoloStar®

100 unités/ml
solution injectable en
stylo prérempli

insuline glulisine

SANOFI



Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
Apidra 100U/ml, Inj b6 sty
P.P.V : 439,00 DH



articuliers

à vo
rmie
entive
cernai
sang),
ysique (

Si vous avez des pro
parlez-en à votre me
besoin d'une dose p
Il n'existe pas de do
l'utilisation de Apidr
6 ans.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Veuillez également lire le mode d'emploi d'Apidra SoloStar, stylo prérempli.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Voyages

Avant de partir en voyage pour vous informer sur

- disponibilité de vos allez,
- fourniture d'insuline,
- conservation adéquate du voyage,
- horaire des repas pendant le voyage,
- effets possibles du horaire,
- nouveaux risques dans les pays visités
- ce que vous devez faire d'urgence lorsqu'un malade



<MAT>542660

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de 20. Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autrui. Il peut leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est utilisée ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

Indication(s) thérapeutique(s) :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUI SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indication(s) :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie de la peau des yeux ou du nez.

- Si vous avez une sténose de l'artère retinienne (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux yeux ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou des triglycérides est élevé,

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée aussi maladie de "LED").

Le taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue ou un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous avez des symptômes de goutte (cristaux d'acide unique dans les articulations). Vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou au soleil :

Si vous prenez ce médicament et que votre médecin a souhaité pour vous le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons de soleil et ne plus faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Ce médicament peut être administré en cas de maladie cœliaque (difficulté d'absorption du gluten par l'intestin). L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais certains d'entre eux sont donc considérés comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie cœliaque.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Instruction pour un bon usage.

Pesographe et mode d'administration

Veillez à toujours boire votre médicament.

vant exactement les indications de

cas de doute.

ent exactement les instructions de

pharmacien. Vérifiez auprès de

imprimés sécables par jour mais

8 comprimés sécables par jour.

able par jour.

it exactement les indications de

cas de doute.

e d'eau, 30,6

dire que vous allez uriner plus souvent),

ne de ne pas prendre la dernière dose tard

avant vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le

matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement entraîne les effets attendus.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractures musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des taches devant les yeux ou des maux d'oreilles).

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous oubliez de prendre ESIDREX sauf si votre médecin vous le demande. Si vous interrompez le traitement, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus de renseignements à votre pharmacien.

4. QUILS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement :

Il faut arrêter le traitement et consulter un médecin ou les urgences

si vous faites une réaction aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

- Augmentation du taux de lipides dans le sang (hyperlipidémie).

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Eruption cutanée avec démangeaison (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

- Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

- Chute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

- Incapacité à ouvrir les yeux à maintenir une position (myasténie).

- Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotassemie).

Augmentation du taux d'acide unique dans le sang (hyperacétémie).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

- Aggravation d'un diabète.

- Sensibilité d'incertitude de la peau au soleil.

- Sensibilisation d'incertitude abdominal, constipation.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de 20. Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autrui. Il peut leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est utilisée ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

Indication(s) thérapeutique(s) :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUI SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indication(s) :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie de la peau des yeux ou du nez.

- Si vous avez une sténose de l'artère retinienne (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux yeux ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou des triglycérides est élevé,

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée aussi maladie de "LED").

Le taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue ou un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous avez des symptômes de goutte (cristaux d'acide unique dans les articulations). Vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou au soleil : Ce médicament et que votre médecin a souhaité pour vous le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons de soleil et ne plus faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique 5).

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Ce médicament peut être administré en cas de maladie cœliaque (difficulté d'absorption du gluten par l'intestin). L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais certains d'entre eux sont donc considérés comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie cœliaque.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Instruction pour un bon usage.

Pesographe et mode d'administration

Veillez à toujours boire votre médicament.

vant exactement les indications de

cas de doute.

ent exactement les instructions de

pharmacien. Vérifiez auprès de

imprimés sécables par jour mais 8 comprimés sécables par jour.

able par jour.

it exactement les indications de

cas de doute.

30,6

d'eau, dire que vous allez uriner plus souvent), ne de ne pas prendre la dernière dose tard dans la nuit.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament. Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement entraîne les effets attendus.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractures musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des taches roses ou des mouches dans vos yeux ou vos larmes).

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous oubliez de prendre ESIDREX sauf si votre médecin vous le demande. Si vous interrompez le traitement, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus de renseignements à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement : Consulter un médecin ou les urgences médicales si vous faites une réaction aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

- Augmentation du taux de lipides dans le sang (hyperlipidémie).

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Eruption cutanée avec démangeaison (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

- Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

- Chute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

- Incapacité à ouvrir ou à maintenir l'œil (paralysie oculaire).

- Diminution du taux de sodium dans le sang (hyponatrémie).

Augmentation du taux d'acide unique dans le sang (hyperacétémie).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

- Aggravation d'un diabète.

- Sensibilité d'incertitude de la peau au soleil.

- Sensibilisation d'incertitude abdominal, constipation.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de 20. Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autrui. Il peut leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est utilisée ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

Indication(s) thérapeutique(s) :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUI SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indication(s) :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie de la peau des yeux ou du nez.

- Si vous avez une sténose de l'artère retinienne (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux yeux ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou des triglycérides est élevé,

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée aussi maladie de "LED").

Le taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue ou un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous avez des symptômes de goutte (cristaux d'acide unique dans les articulations).

Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou au soleil à ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons de soleil et ne plus faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique 5).

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Ce médicament peut être administré en cas de maladie cœliaque (difficulté d'absorption du gluten par l'intestin). L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais certains d'entre eux sont donc considérés comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie cœliaque.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Instruction pour un bon usage.

Pesographe et mode d'administration

Veillez à toujours boire votre médicament.

vant exactement les indications de

cas de doute.

ent exactement les instructions de

pharmacien. Vérifiez auprès de

imprimés sécables par jour mais 8 comprimés sécables par jour.

able par jour, it exactement les indications de cas de doute.

30,6

e d'eau, dire que vous allez uriner plus souvent), de ne pas prendre la dernière dose tard dans la nuit. Durez du temps entre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

4. DURÉE DU TRAITEMENT

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament. Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement entraîne les effets attendus. Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre pharmacien.

5. SYMPTÔMES ET CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE :

Si vous avez pris plus de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des taches roses ou des murs urinaires).

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous oubliez de prendre ESIDREX sauf si votre médecin vous le demande. Si vous interrompez le traitement, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus de renseignements à votre pharmacien.

6. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement : Il vous suffit de consulter un médecin ou les urgences si vous faites une réaction aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

- Augmentation du taux de lipides dans le sang (hyperlipidémie).

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Réaction cutanée avec démangeaison (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

- Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

- Chute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

- Incapacité à ouvrir ou à maintenir l'œil (paralysie oculaire).

- Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotassemie).

Augmentation du taux d'acide unique dans le sang (hyperacétémie).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

- Aggravation d'un diabète.

- Sensibilité d'incarcration de la peau au soleil.

- Sensibilisation d'incarcration abdominal, constipation.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de 20. Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

* Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autrui. Il peut leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est utilisée ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

Indication(s) thérapeutique(s) :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUI SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indication(s) :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie de la peau des yeux ou du nez.

- Si vous avez une sténose de l'artère retinienne (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux yeux ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou des triglycérides est élevé,

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée aussi maladie de "LED").

Le taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue ou un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous avez des symptômes de goutte (cristaux d'acide unique dans les articulations).

Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou au soleil :

Si vous prenez ce produit, il faut éviter de se faire bronzer ou de faire des rayons de soleil et ne pas faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique 5).

Ce médicament contient du Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Ce médicament peut être administré en cas de maladie cœliaque (difficulté d'absorption du gluten par l'intestin). L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais certains d'entre eux sont donc considérés comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie cœliaque.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Instruction pour un bon usage.

Pesographe et mode d'administration

Veillez à toujours boire votre médicament.

vant exactement les indications de un cas de doute.

ent exactement les instructions de pharmacien. Vérifiez auprès de

imprimés sécables par jour mais 8 comprimés sécables par jour.

able par jour, it exactement les indications de cas de doute.

30,6

dire que vous allez uriner plus souvent), de ne pas prendre la dernière dose tard matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement entraîne les effets attendus.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractures musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des taches roses ou des mouches dans vos yeux ou vos larmes).

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous oubliez de prendre ESIDREX sauf si votre médecin vous le demande. Si vous interrompez le traitement, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus de renseignements à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement :

Il faut arrêter le traitement et consulter un médecin ou les urgences médicales si vous faites une réaction aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

- Augmentation du taux de lipides dans le sang (hyperlipidémie).

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Eruption cutanée avec démangeaison (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

- Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

- Chute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

- Incapacité à ouvrir ou à maintenir l'œil (paralysie oculaire).

- Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotassemie).

Augmentation du taux d'acide unique dans le sang (hyperacétémie).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

- Aggravation d'une douleur dans l'œil.

- Sensibilité d'incarcration de la peau au soleil.

- Sensibilisation d'incarcration abdominal, constipation.