

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/03/20	Rectoscopie		100 Dhs	Malades du Foie et de l'Appareil Digestif 201, Bd d'Anfa Casablanca Tél: 05 22 94 52 82 Professeur Driss JAMIL Professeur Driss JAMIL
12/13/2020	G			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ROUTE DE JADID 10, Bd Brahim Roudani Tél: 05 22 66 52 46 240, Bd Brahim Roudani Roubaï	03/03/2020	240, Bd Brahim Roudani Tél: 05 22 66 52 46 -1564110 47990
	12/10/20	

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

H	G	B
25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	
D		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

PROFESSEUR DRISS JAMIL

Maladies de l'appareil Digestif

Foie - Estomac - Intestins

Endoscopie digestive - Echographie

Proctologie Medico-Chirurgicale

Membre de la société Française de coloproctologie

Membre de la société Française d'endoscopie Digestive

casablanca le, 03/03/2020



Mr FASKANI Said

PENTASA

1 lavement, le soir au coucher, pendant 1 mois

PENTASA 1

1 suppositoire, matin et soir, pendant 15 jours

RELAXOL

1 comprimé, 3 fois par jour, pendant 6 jours

69,-

Probiotis

1 Gélule 2x /

x 10

الروفيسور، جيلبر، 201
لاروز، الكنز، العمار، شارع فنا - تلار فنتسا
152946161 / 0522940282

ROUTE D'EL JADID,
240, Bd Brahim Roudan
Tél: 05 22 39 62 62

T = 156 HT

Pentasa® 1g Suppositoires

Mésalazine

PENTASA 1G

15 SUPPOSITOIRES

PPV : 337,00 DH

ADSP N° 80/98DMP/21
LABORATOIRES SOTHEMA



6 118001 070466

t d'utiliser ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

votre pharmacien.

nez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
otre médecin, ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas me

cas est-il utilisé ?

à 1 g suppositoires ?

sé ?

use (inflammation du gros intestin avec ulcération) limitée au rectum.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Pentasa 1 g suppositoires ?

Ne prenez jamais Pentasa 1 g suppositoires :

- Si vous êtes allergique à la mésalazine, l'acide salicylique ou ses dérivés (par exemple, l'acide acétylsalicylique) ou à l'un des autres composants de ce médicament.
- Si vous présentez des troubles graves de la fonction du foie et des reins.

Avertissements et précautions

Parlez à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **Pentasa 1 g suppositoires** Soyez prudent avec ce médicament :

- Si vous êtes allergique à la **sulfasalazine** (risque d'allergie aux salicylates).
- Si vous avez actuellement ou avez déjà eu une **maladie hépatite et/ou rénale**.
- Si vous avez une maladie qui peut vous rendre sujette à des **saignements**.
- Si vous avez un **ulcère gastroduodénal** actif (ulcère de l'estomac ou du duodénum).
- Si vous prenez des **médicaments** qui peuvent affecter la fonction rénale par exemple des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l'acide acétique.
- Si vous avez des problèmes pulmonaires, en particulier de l'asthme.
- Si vous souffrez soudainement de crampes abdominales, douleurs abdominales, de la fièvre, des maux de tête aigus et d'une éruption cutanée. Dans de telles circonstances prenez PENTASA.

Pendant que vous êtes traité avec ce médicament, votre médecin établira normalement des tests sanguins pour vérifier votre fonction rénale en particulier au

Autres médicaments et Pentasa 1 g suppositoires :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé ou pourriez prendre/utiliser d'autres médicaments. Ceci est particulièrement important pour les médicaments suivants:

- **Azathioprine** (utilisé après transplantation ou pour traiter des maladies auto-immunes).
- **6-mercaptopurine ou thioguanine** (chimiothérapie, utilisé pour traiter la leucémie).
- Certains agents qui inhibent la coagulation du sang (médicaments pour une thrombose ou pour fluidifier le sang).

Chez les patients présentant une hypersensibilité connue à la sulfasalazine, le traitement avec PENTASA Suppositoire ne doit être commencé que sous une surveillance étroite.

Grossesse, allaitement et fertilité:

Si vous êtes enceinte ou vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou envisagez d'avoir un bébé, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Pentasa 1 g suppositoires. La sécurité de l'utilisation de mésalazine pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie. Des troubles sanguins ont été signalés chez des nouveau-nés de mères traitées avec ce médicament. Des réactions allergiques après l'allaitement au sein, par exemple, la diarrhée. Si le nouveau-né souffre de diarrhée, l'allaitement doit être interrompu.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

PENTASA Suppositoire n'a aucune influence sur l'aptitude à la conduite des véhicules ni sur la capacité à utiliser des machines.

3. Comment prendre Pentasa 1 g suppositoires ?

Veuillez toujours prendre Pentasa 1 g suppositoires en suivant exactement les indications de votre médecin. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

La dose recommandée est :

Adultes: Insérez un suppositoire par jour dans le rectum.

Enfants: Il n'y a que des données et des expériences limitées quant à l'utilisation chez les enfants.

Mode d'administration:

Administration rectale

Durée d'administration:

La durée de l'administration est à la discrétion du médecin traitant. **Pentasa 1 g suppositoires** convient à une utilisation à long terme. Il est conseillé de vider les intestins avant de prendre le médicament. Si vous sentez que l'effet de PENTASA Suppositoire est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Si vous avez pris plus de **Pentasa 1 g suppositoires** que nécessaire, contactez immédiatement votre médecin ou votre service des urgences le plus proche.

En cas de surdosage, contactez immédiatement votre médecin ou votre service des urgences le plus proche.

Pentasa® 1g Suppositoires

Mésalazine

PENTASA 1G

15 SUPPOSITOIRES

PPV : 337,00 DH

ADSP N° 80/98DMP/21
LABORATOIRES SOTHEMA



6 118001 070466

t d'utiliser ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

votre pharmacien.

nez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
otre médecin, ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas me

cas est-il utilisé ?

à 1 g suppositoires ?

sé ?

use (inflammation du gros intestin avec ulcération) limitée au rectum.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Pentasa 1 g suppositoires ?

Ne prenez jamais Pentasa 1 g suppositoires :

- Si vous êtes allergique à la mésalazine, l'acide salicylique ou ses dérivés (par exemple, l'acide acétylsalicylique) ou à l'un des autres composants de ce médicament.
- Si vous présentez des troubles graves de la fonction du foie et des reins.

Avertissements et précautions

Parlez à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **Pentasa 1 g suppositoires** Soyez prudent avec ce médicament :

- Si vous êtes allergique à la **sulfasalazine** (risque d'allergie aux salicylates).
- Si vous avez actuellement ou avez déjà eu une **maladie hépatite et/ou rénale**.
- Si vous avez une maladie qui peut vous rendre sujette à des **saignements**.
- Si vous avez un **ulcère gastroduodénal** actif (ulcère de l'estomac ou du duodénum).
- Si vous prenez des **médicaments** qui peuvent affecter la fonction rénale par exemple des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l'acide acétique.
- Si vous avez des problèmes pulmonaires, en particulier de l'asthme.
- Si vous souffrez soudainement de crampes abdominales, douleurs abdominales, de la fièvre, des maux de tête aigus et d'une éruption cutanée. Dans de telles circonstances prenez PENTASA.

Pendant que vous êtes traité avec ce médicament, votre médecin établira normalement des tests sanguins pour vérifier votre fonction rénale en particulier au

Autres médicaments et Pentasa 1 g suppositoires :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé ou pourriez prendre/utiliser d'autres médicaments. Ceci est particulièrement important pour les médicaments suivants:

- **Azathioprine** (utilisé après transplantation ou pour traiter des maladies auto-immunes).
- **6-mercaptopurine ou thioguanine** (chimiothérapie, utilisé pour traiter la leucémie).
- Certains agents qui inhibent la coagulation du sang (médicaments pour une thrombose ou pour fluidifier le sang).

Chez les patients présentant une hypersensibilité connue à la sulfasalazine, le traitement avec PENTASA Suppositoire ne doit être commencé que sous une surveillance étroite.

Grossesse, allaitement et fertilité:

Si vous êtes enceinte ou vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou envisagez d'avoir un bébé, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Pentasa 1 g suppositoires. La sécurité de l'utilisation de mésalazine pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie. Des troubles sanguins ont été signalés chez des nouveau-nés de mères traitées avec ce médicament. Des réactions allergiques après l'allaitement au sein, par exemple, la diarrhée. Si le nouveau-né souffre de diarrhée, l'allaitement doit être interrompu.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

PENTASA Suppositoire n'a aucune influence sur l'aptitude à la conduite des véhicules ni sur la capacité à utiliser des machines.

3. Comment prendre Pentasa 1 g suppositoires ?

Veuillez toujours prendre Pentasa 1 g suppositoires en suivant exactement les indications de votre médecin. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

La dose recommandée est :

Adultes: Insérez un suppositoire par jour dans le rectum.

Enfants: Il n'y a que des données et des expériences limitées quant à l'utilisation chez les enfants.

Mode d'administration:

Administration rectale

Durée d'administration:

La durée de l'administration est à la discrétion du médecin traitant. **Pentasa 1 g suppositoires** convient à une utilisation à long terme. Il est conseillé de vider les intestins avant de prendre le médicament.

vous sentez que l'effet de PENTASA Suppositoire est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. **Si vous avez pris plus de Pentasa 1 g suppositoires** que nécessaire, contactez immédiatement votre médecin ou votre service des urgences le plus proche.

Pentasa® 1g Suppositoires

Mésalazine

PENTASA 1G

15 SUPPOSITOIRES

PPV : 337,00 DH

ADSP N° 80/98DMP/21
LABORATOIRES SOTHEMA



6 118001 070466

t d'utiliser ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

votre pharmacien.

nez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
otre médecin, ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas me

cas est-il utilisé ?

à 1 g suppositoires ?

sé ?

use (inflammation du gros intestin avec ulcération) limitée au rectum.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Pentasa 1 g suppositoires ?

Ne prenez jamais Pentasa 1 g suppositoires :

- Si vous êtes allergique à la mésalazine, l'acide salicylique ou ses dérivés (par exemple, l'acide acétylsalicylique) ou à l'un des autres composants de ce médicament.
- Si vous présentez des troubles graves de la fonction du foie et des reins.

Avertissements et précautions

Parlez à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **Pentasa 1 g suppositoires** Soyez prudent avec ce médicament :

- Si vous êtes allergique à la **sulfasalazine** (risque d'allergie aux salicylates).
- Si vous avez actuellement ou avez déjà eu une **maladie hépatite et/ou rénale**.
- Si vous avez une maladie qui peut vous rendre sujette à des **saignements**.
- Si vous avez un **ulcère gastroduodénal** actif (ulcère de l'estomac ou du duodénum).
- Si vous prenez des **médicaments** qui peuvent affecter la fonction rénale par exemple des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l'acide acétique.
- Si vous avez des problèmes pulmonaires, en particulier de l'asthme.
- Si vous souffrez soudainement de crampes abdominales, douleurs abdominales, de la fièvre, des maux de tête aigus et d'une éruption cutanée. Dans de telles circonstances prenez PENTASA.

Pendant que vous êtes traité avec ce médicament, votre médecin établira normalement des tests sanguins pour vérifier votre fonction rénale en particulier au

Autres médicaments et Pentasa 1 g suppositoires :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé ou pourriez prendre/utiliser d'autres médicaments. Ceci est particulièrement important pour les médicaments suivants:

- **Azathioprine** (utilisé après transplantation ou pour traiter des maladies auto-immunes).
- **6-mercaptopurine ou thioguanine** (chimiothérapie, utilisé pour traiter la leucémie).
- Certains agents qui inhibent la coagulation du sang (médicaments pour une thrombose ou pour fluidifier le sang).

Chez les patients présentant une hypersensibilité connue à la sulfasalazine, le traitement avec PENTASA Suppositoire ne doit être commencé que sous une surveillance étroite.

Grossesse, allaitement et fertilité:

Si vous êtes enceinte ou vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou envisagez d'avoir un bébé, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Pentasa 1 g suppositoires. La sécurité de l'utilisation de mésalazine pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie. Des troubles sanguins ont été signalés chez des nouveau-nés de mères traitées avec ce médicament. Des réactions allergiques après l'allaitement au sein, par exemple, la diarrhée. Si le nouveau-né souffre de diarrhée, l'allaitement doit être interrompu.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

PENTASA Suppositoire n'a aucune influence sur l'aptitude à la conduite des véhicules ni sur la capacité à utiliser des machines.

3. Comment prendre Pentasa 1 g suppositoires ?

Veuillez toujours prendre Pentasa 1 g suppositoires en suivant exactement les indications de votre médecin. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

La dose recommandée est :

Adultes: Insérez un suppositoire par jour dans le rectum.

Enfants: Il n'y a que des données et des expériences limitées quant à l'utilisation chez les enfants.

Mode d'administration:

Administration rectale

Durée d'administration:

La durée de l'administration est à la discrétion du médecin traitant. **Pentasa 1 g suppositoires** convient à une utilisation à long terme. Il est conseillé de vider les intestins avant de prendre le médicament. Si vous sentez que l'effet de PENTASA Suppositoire est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Si vous avez pris plus de Pentasa 1 g suppositoires que recommandé, contactez immédiatement votre médecin ou votre service des urgences le plus proche.

En cas de surdosage, contactez immédiatement votre médecin ou votre service des urgences le plus proche.



176

PENTASA 1g/100ml
Suspension rectale
Boîte de 5 flacons de 100ml
PPV:256.00 DH
AMM N° 40 DMP/21/NRQ
Distribué par SOTHEMA-Bouskoura



6 118001 070473

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISAT**PENTASA 1g/100 mL**
suspension rectale
Mésalazine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?
3. Comment utiliser PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Agent intestinal anti-inflammatoire.

Ce médicament est indiqué dans le traitement d'attaque de la rectocolite hémorragique (inflammation chronique de l'intestin).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?

N'utilisez jamais PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale dans le cas suivant : Intolérance à l'aspirine ou à l'un des composants.

Faites attention avec PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale :**Mises en garde spéciales**

Ce produit contient des sulfites pouvant éventuellement entraîner ou aggraver des réactions de type allergique (réactions dites anaphylactiques ou bronchospasme), chez les patients prédisposés principalement ceux ayant des antécédents d'asthme ou d'allergie.

Dans ce cas, prévenir votre médecin.

Le sac protecteur du lavement ne doit être ouvert qu'immédiatement avant son utilisation.

Précautions d'emploi

Ce médicament doit être administré avec prudence chez les patients présentant une maladie du foie ou du rein.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Associations à prendre en compte : avec Azathioprine et avec Mercaptopurine.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Si vous souhaitez allaiter votre enfant alors que vous êtes traitée par ce médicament, il convient de demander l'avis de votre médecin traitant. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notable : sulfites.

3. COMMENT UTILISER PENTASA 1g/100ml
Posologie

1 lavement par jour, le soir au coucher, pendant 8 semaines. L'expérience de ce traitement chez

Mode et voie d'administration

Voie rectale.

NE PAS AVALER.

1. Placez une poubelle au pied du lit, puis à l'aide de ciseaux, ouvrez le sachet protecteur immédiatement avant utilisation. Agitez le flacon afin d'obtenir une suspension.

2. Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé d'utiliser, lors de chaque administration, un des sachets transparents inclus dans la boîte.

Après avoir introduit la main dans le sachet.

3. Ouvrez le flacon en tournant d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre la bague située à la base de la canule (la bague doit se retrouver dans sa position de départ).

Lubrifiez éventuellement la canule avec un gel lubrifiant.

4. Le corps couché sur le côté gauche, avec la jambe gauche allongée et la jambe droite repliée pour maintenir l'équilibre, introduisez doucement la canule dans le rectum et videz lentement la totalité de la suspension par pression constante et sûre sur le flacon (une pression peut boucher la canule).

5. Afin d'éviter le rejet du produit, il est recommandé de rester couché un moment sur le côté dans la position d'administration jusqu'à disparition de l'envie d'aller à la selle.

6. Retirez la canule sans relâcher la pression sur le flacon.

Une fois la canule retirée, faire alors descendre le sachet le long du flacon jusqu'à ce qu'il se recouvre entièrement.

7. Faites un nœud et jetez le tout dans la poubelle préalablement placée au pied du lit.

Fréquence d'administration

Ce médicament doit être pris de préférence

Durée du traitement

La durée usuelle du traitement est de 2 à 4 mois.

Si vous avez pris plus de PENTASA 1g/100ml

Dans les conditions normales d'utilisation de ce médicament, il n'y a pas de risque de surdosage. Toutefois, si vous avez utilisé plus de 5 flacons, dans le cas de survenue de bourdonnements d'oreille, tête, vertiges, contactez immédiatement votre médecin.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules

4. QUELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, Pentasa 1g/100ml peut provoquer des effets indésirables, bien que toutefois très peu courants.

• Quoiqu'exceptionnelles, des atteintes rénales ont été observées.

• Des atteintes pulmonaires (pneumopathies) ont été observées.



176

PENTASA 1g/100ml
Suspension rectale
Boîte de 5 flacons de 100ml
PPV:256.00 DH
AMM N° 40 DMP/21/NRQ
Distribué par SOTHEMA-Bouskoura



6 118001 070473

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISAT**PENTASA 1g/100 mL**
suspension rectale
Mésalazine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?
3. Comment utiliser PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Agent intestinal anti-inflammatoire.

Ce médicament est indiqué dans le traitement d'attaque de la rectocolite hémorragique (inflammation chronique de l'intestin).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?

N'utilisez jamais PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale dans le cas suivant : Intolérance à l'aspirine ou à l'un des composants.

Faites attention avec PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale :**Mises en garde spéciales**

Ce produit contient des sulfites pouvant éventuellement entraîner ou aggraver des réactions de type allergique (réactions dites anaphylactiques ou bronchospasme), chez les patients prédisposés principalement ceux ayant des antécédents d'asthme ou d'allergie.

Dans ce cas, prévenir votre médecin.

Le sac protecteur du lavement ne doit être ouvert qu'immédiatement avant son utilisation.

Précautions d'emploi

Ce médicament doit être administré avec prudence chez les patients présentant une maladie du foie ou du rein.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Associations à prendre en compte : avec Azathioprine et avec Mercaptopurine.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Si vous souhaitez allaiter votre enfant alors que vous êtes traitée par ce médicament, il convient de demander l'avis de votre médecin traitant. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notable : sulfites.

3. COMMENT UTILISER PENTASA 1g/100ml
Posologie

1 lavement par jour, le soir au coucher, pendant 8 semaines. L'expérience de ce traitement chez

Mode et voie d'administration

Voie rectale.

NE PAS AVALER.

1. Placez une poubelle au pied du lit, puis à l'aide de ciseaux, ouvrez le sachet protecteur immédiatement avant utilisation. Agitez le flacon afin d'obtenir une suspension.

2. Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé d'utiliser, lors de chaque administration, un des sachets transparents inclus dans la boîte.

Après avoir introduit la main dans le sachet.

3. Ouvrez le flacon en tournant d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre la bague située à la base de la canule (la bague doit se retrouver dans sa position de départ).

Lubrifiez éventuellement la canule avec un gel lubrifiant.

4. Le corps couché sur le côté gauche, avec la jambe gauche allongée et la jambe droite repliée pour maintenir l'équilibre, introduisez doucement la canule dans le rectum et videz lentement la totalité de la suspension par pression constante et sûre sur le flacon (une pression peut boucher la canule).

5. Afin d'éviter le rejet du produit, il est recommandé de rester couché un moment sur le côté dans la position d'administration jusqu'à disparition de l'envie d'aller à la selle.

6. Retirez la canule sans relâcher la pression sur le flacon.

Une fois la canule retirée, faire alors descendre le sachet le long du flacon jusqu'à ce qu'il se recouvre entièrement.

7. Faites un nœud et jetez le tout dans la poubelle préalablement placée au pied du lit.

Fréquence d'administration

Ce médicament doit être pris de préférence

Durée du traitement

La durée usuelle du traitement est de 2 à 4 mois.

Si vous avez pris plus de PENTASA 1g/100ml

Dans les conditions normales d'utilisation de ce médicament, il n'y a pas de risque de surdosage. Toutefois, si vous avez utilisé plus de 5 flacons, dans le cas de survenue de bourdonnements d'oreille, tête, vertiges, contactez immédiatement votre médecin.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules

4. QUELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, Pentasa 1g/100ml peut provoquer des effets indésirables, bien que toutefois très peu courants.

• Quoiqu'exceptionnelles, des atteintes rénales ont été observées.

• Des atteintes pulmonaires (pneumopathies) ont été observées.



176

PENTASA 1g/100ml
Suspension rectale
Boîte de 5 flacons de 100ml
PPV:256.00 DH
AMM N° 40 DMP/21/NRQ
Distribué par SOTHEMA-Bouskoura



6 118001 070473

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISAT**PENTASA 1g/100 mL**
suspension rectale
Mésalazine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?
3. Comment utiliser PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Agent intestinal anti-inflammatoire.

Ce médicament est indiqué dans le traitement d'attaque de la rectocolite hémorragique (inflammation chronique de l'intestin).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale ?

N'utilisez jamais PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale dans le cas suivant : Intolérance à l'aspirine ou à l'un des composants.

Faites attention avec PENTASA 1g/100 mL, suspension rectale :**Mises en garde spéciales**

Ce produit contient des sulfites pouvant éventuellement entraîner ou aggraver des réactions de type allergique (réactions dites anaphylactiques ou bronchospasme), chez les patients prédisposés principalement ceux ayant des antécédents d'asthme ou d'allergie.

Dans ce cas, prévenir votre médecin.

Le sac protecteur du lavement ne doit être ouvert qu'immédiatement avant son utilisation.

Précautions d'emploi

Ce médicament doit être administré avec prudence chez les patients présentant une maladie du foie ou du rein.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Associations à prendre en compte : avec Azathioprine et avec Mercaptopurine.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Si vous souhaitez allaiter votre enfant alors que vous êtes traitée par ce médicament, il convient de demander l'avis de votre médecin traitant. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notable : sulfites.

3. COMMENT UTILISER PENTASA 1g/100ml
Posologie

1 lavement par jour, le soir au coucher, pendant 8 semaines. L'expérience de ce traitement chez

Mode et voie d'administration

Voie rectale.

NE PAS AVALER.

1. Placez une poubelle au pied du lit, puis à l'aide de ciseaux, ouvrez le sachet protecteur immédiatement avant utilisation. Agitez le flacon afin d'obtenir une suspension.

2. Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé d'utiliser, lors de chaque administration, un des sachets transparents inclus dans la boîte.

Après avoir introduit la main dans le sachet, 3. Ouvrez le flacon en tournant d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre la bague située à la base de la canule (la bague doit se retrouver dans sa position de départ).

Lubrifiez éventuellement la canule avec un gel lubrifiant.

4. Le corps couché sur le côté gauche, avec la jambe gauche allongée et la jambe droite repliée pour maintenir l'équilibre, introduisez doucement la canule dans le rectum et videz lentement la totalité de la suspension par pression constante et sûre sur le flacon (une pression peut boucher la canule).

5. Afin d'éviter le rejet du produit, il est recommandé de rester couché un moment sur le côté dans la position d'administration jusqu'à disparition de l'envie d'aller à la selle.

6. Retirez la canule sans relâcher la pression sur le flacon.

Une fois la canule retirée, faire alors descendre le sachet le long du flacon jusqu'à ce qu'il se recouvre entièrement.

7. Faites un nœud et jetez le tout dans la poubelle préalablement placée au pied du lit.

Fréquence d'administration

Ce médicament doit être pris de préférence

Durée du traitement

La durée usuelle du traitement est de 2 à 4 mois.

Si vous avez pris plus de PENTASA 1g/100ml

Dans les conditions normales d'utilisation de ce médicament, il n'y a pas de risque de surdosage. Toutefois, si vous avez utilisé plus de 5 flacons, dans le cas de survenue de bourdonnements d'oreille, tête, vertiges, contactez immédiatement votre médecin.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules

4. QUELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, Pentasa 1g/100ml peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le temps.

• Quoiqu'exceptionnelles, des atteintes rénales ont été observées.

• Des atteintes pulmonaires (pneumopathies) ont été observées.

Relaxol® 500mg /2mg

Paracétamol/ thiocolchicoside

comprimé

SANOFI

RELAXOL 500MG/2MG

CP B20



P.P.V : 53DH10



6 118000 060833

supplémentaire qui permettra relatives à la sécurité. Vous rable que vous observez. Voir indésirables.

ette notice avant de prendre

jin de la relire. • Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. • Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE Relaxol ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Relaxol ?

Ne prenez jamais RELAXOL dans les cas suivants : • Si vous êtes allergique au thiocolchicoside et/ou au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6). • Si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourrez être enceinte. • Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception. • Si vous allaitez.

• Insuffisance hépatocellulaire ou si vous avez une maladie grave du foie. • Enfants de moins de 16 ans.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec RELAXOL :

Mises en garde spéciales : Utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions. La survenue de crise convulsive impose l'arrêt du traitement.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée [voir rubrique « Posologie »].

Précautions d'emploi : En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.

En cas de douleurs d'estomac, de nausées, de vomissements, prévenez votre médecin.

Respectez rigoureusement les doses et la durée du traitement décrites à la rubrique 3. Vous ne devez pas utiliser ce médicament à une dose plus élevée (soit

8 comprimés de Relaxol) ou pour une durée dépassant 7 jours. Ceci est dû au fait que les produits formés dans votre organisme lorsque vous prenez du thiocolchicoside à des doses élevées peuvent provoquer des lésions sur certaines cellules (nombre abnormal de chromosomes). Cela a été mis en évidence lors d'études chez l'animal et d'études en laboratoire. Chez l'homme, ce type de lésions cellulaires est un facteur de risque de cancer, d'altération de la fertilité masculine et peut-être dangereux pour un enfant à naître. Parlez-en avec votre médecin si vous avez plus de questions.

Votre médecin vous renseignera sur toutes les mesures relatives à une contraception efficace et sur les risques potentiels d'une grossesse. La durée du traitement est limitée à 7 jours consécutifs.

Avant de débuter un traitement par ce médicament, vérifier que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol.

La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie. Prévenez votre médecin : • Si vous pesez moins de 50 kg. • Si vous avez une maladie du foie ou maladie grave des reins. • Si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment. • Si vous souffrez de déshydratation. • Si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée. En cas de sevrage récent d'un alcoolisme chronique, le risque d'atteinte hépatique est majoré.

En cas d'hépatite virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin. En cas de problème de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation, Relaxol, comprimé doit être utilisé avec précaution.

Enfants et adolescents : N'administrez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents âgés de moins de 16 ans pour des raisons de sécurité.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments : Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang ou un dosage de la glycémie.

Ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou AVK), la prise de paracétamol aux doses maximales (4 g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont notamment de l'INR. Dans ce cas, consultez votre médecin.

L'efficacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des résines chélatrices – médicament qui diminue le taux de cholestérol dans le sang (respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).

Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par fluoxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter une acidose métabolique (sang trop acide à l'origine d'une accélération de la fréquence respiratoire).

La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

- Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie,
- Des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments antiépileptiques (phénobarbital, phénopytoïne, carbamazépine, topiramate), • De la rifampicine (un antibiotique).
- En même temps de l'alcool. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Relaxol peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

Grossesse, allaitement et fertilité

Ne prenez pas ce médicament : • si vous êtes enceinte, pourriez tomber

Professeur Driss Jamil

البروفيسور إدريس جميل

Maladies du Foie et de l'appareil digestif

أمراض الكبد والجهاز الهضمي

Endoscopie digestive - Echographie

التنظير الداخلي

Proctologie Medico-Chirurgicale

علاج وجراحة المخرج

Membre de l'association Française des maladies du Foie (AEF)

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض الكبد

Membre de la société Française de coloproctologie

عضو الجمعية الفرنسية لتنظير الجهاز الهضمي

Membre de la société Française d'endoscopie digestive

رئيس جمعية إغاثة مرضى الكبد

Président de l'Association SOS Hepatite

Importé par :

Laboratoires AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda, Anfa, le

12/03/2020

الدار البيضاء في

Route Régionale N° 322 (Ex R.S.111)

Km 12.400 Ain Harrouda 28 630,

Mohammedia - Maroc

PPC : 37DH00

statik.

M¹² FASLANT

Importé par :

Laboratoires AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda,

Route Régionale N° 322 (Ex R.S.111)

Km 12.400 Ain Harrouda 28 630,

Mohammedia - Maroc

PPC : 37DH00 x 10

37100 x 10

1-

FORTIME

x 10

1 Flacon / i

2 -

Pentasa - Dax

240, Bd Brahim Roudani
ROUTE DE EL JADIDA
PHARMACEUTIQUE

79,50.3 -

Apehata

40.40

1 gélule / i au cell
Metospaefi -
2x1 -

1 x 08,1

= 495,90 -

201, شارع أنفا - الطابق الثالث (أمام المدرسة الإسبانية حسان رامون) الدار البيضاء | الهاتف: 0522.39.62.63/0522.94.62.62/0522.94.62.61 | الفاكس: 0522.94.62.61

201, Bd. d'Anfa 3^{ème} étage (En face de l'école Espagnole Juan Ramón) - Casablanca | Tél.: 0522.94.61.61/0522.94.62.62/0522.94.63.63 | Fax: 0522.39.62.62

Assistantes : Laila 06 61 86 58 66 | Rajaâ 06 89 44 48 88 | E-mail : secretariatprjamil@gmail.com



Apenat®



Lot n° : 190385
À consommer de préférence avant le : 06/2022

PPC : 79,50 DH

(Trigonella num-Grae-
itamine B5,
tamine D3,

Apenat®

L-Lysine, L-Ornithine, Acide alpha-hydroxybutyrique, Acide alpha-hydroxybutyrique de fer, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B3, Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B8, - Vitamine B9, Vitamine B12, Vitamine C, Vitamine D3, Vitamine E, Tween 80 polysorbate, arôme citron - miel, Conservateur : Sorbate de Potassium.

PROPRIETES ET UTILISATION :

Apenat® est un complément alimentaire à base de Fenugrec et de vitamines. Apenat® stimule l'appétit, favorise la prise de poids et procure force et énergie. Apenat® est recommandé dans les situations accompagnées d'une perte d'appétit, perte de poids et manque de tonus et d'énergie.

MODE ET CONSEILS D'UTILISATION :

- Solution buvable :

- Enfants moins de 5 ans: 1/2 cuillère à café/jour.
- Enfants de 5 à 12 ans: 1 cuillère à café/jour.
- Adultes : 2 cuillères à café/jour.

A prendre de préférence avant les repas.

- Comprimé :

- Adultes : 1 à 2 comprimés par jour.

A prendre de préférence avant les repas.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Apenat® est déconseillé chez la femme enceinte.
- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Respecter la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par Pharmalife Research s.r.l. - Lecco - Italie.

Importé au Maroc par Medipro Pharma - Casablanca.

Autorisation Ministère de la santé :

Apenat® solution buvable : N° : DA 20141310088 DMP/21v1

Apenat® comprimés N° : DA 20141406202 DMP/21v1

Autorisation sanitaire ONSSA n° : ES.5.229.16

MeteoSpasmyl®

METEOSPASMYL® B 20 caps molles
Chaque capsule contient 10 mg d'omeprazole 200 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA

4, rue Mohamed Diouri - Casablanca



6 118001 100293

des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE METEOSPASMYL,

de 20

Siméticone

METEOSPASMYL, capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE