

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**

Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° P19- 059493

ND: 35579

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5565 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre :

Nom & Prénom : SABER NADIA V<sup>ie</sup> EL med/Bo.H

Date de naissance : 01/02/65

Adresse : 9 rue Elmeroudi Des 5 BT. Casablanca 9

Quartier Racine

Tél. : 0672141151 Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Hamza BENNOUNA  
Cardiologue  
Bd. Abdelmoumen - Rue Abdelmouk  
CASABLANCA  
Tél. 05 22 36 39 39 / 38 38

Date de consultation : 03/08/22

Nom et prénom du malade : ELHAYOUN NOLU Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le bon état des Actes
03/08/2020	Général	-	3000	

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AIDA Mme. BENOUNA BENZAKOUR Hayat 196, Bd Zerkouni - Casablanca Tél: 05 22 26 32 53 - Fax: 05 22 29 36 55 ICE : 0017546060000050	03/08/2020	3000

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

# AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
					COEFFICIENT DES TRAVAUX	
						MONTANTS DES SOINS
						DEBUT D'EXECUTION
					FIN D'EXECUTION	


# O.D.F PROTHESES DENTAIRES

# DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412	21433552	
00000000	00000000	
D		G
00000000	00000000	
35533411	11433553	
	B	

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Docteur Hamza BENNOUNA

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nancy

Spécialistes et Pathologie Cardiaque  
et Vasculaire (Nancy)

Ancien Interne et Attaché des Hôpitaux de Nancy

Diplômé en Echographie et doppler Cardiaque  
et Vasculaire (Nancy)

Capacité d'Aide Médicale Urgente (Nancy)

Capacité de Médecine de Catastrophe (Nancy)

# الدكتور حمزة بنونة

خريج كلية الطب بنانسي (فرنسا)

اختصاصي في أمراض القلب والشرابين

طبيب سابقا بمستشفيات نانسي

خريج في الفحص الألي للقلب والشرابين (نانسي)

خريج في طب المستعجلات بنانسي

Casablanca, le : 03 AOUT 2020 الدار البيضاء، في :

Handwritten notes and stamps in blue ink. Includes a large heart diagram in the background. Stamps include:  
- "S.V." (multiple)  
- "PHARMACIE AIDA" (multiple)  
- "Mme BENNOUNA BENZAKOUR Hayat" (multiple)  
- "Dr. Hamza BENNOUNA Cardiologue" (multiple)  
- "196, Bd. Zerkouni, Casablanca" (multiple)  
- "05 22 29 36 61" (multiple)  
- "06 61 16 96 78" (multiple)  
- "E-mail: bennounahamza@yahoo.fr" (multiple)  
Handwritten text includes:  
- "25160x7 + 267,00"  
- "SULIAT 5/80"  
- "39,30x3"  
- "Aldosterone"  
- "69,00"  
- "KALMAN"  
- "11-11-11"

إقامة هشام، زاوية شارع عبد المومن وزنقة عبد المالك أبو مروان - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 86 38 38 - 05 22 86 39 39  
Résidence Hicham, Angle Bd Abdelmoumen et Rue Abdelmalek Abou Marouane - CASABLANCA  
Tél. : 05 22 86 39 39 - 05 22 86 38 38 - Urgences : 06 61 16 96 78 - E-mail : bennounahamza@yahoo.fr



LOT N° : 1 2 6 8 4 1 1

UT. AV. : 0 9 2 1 P.P.V



39,30

0936613274

..... 25 mg  
..... 15 mg  
..... un comprimé

Exposé sous blister

**c. FORME PHARMACEUTIQUE**

Comprimé pelliculé sécable, boîte de 20.

**d. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE**

Diurétique thiazidique et diurétique épargneur potassique en association  
(C: système cardiovasculaire).

**2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :

- Hypertension artérielle.
- Œdèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

**3. ATTENTION !**

**a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT  
(CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
  - Insuffisance hépatique grave ;
  - Hyperkaliémie ;
  - Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
  - Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**b. MISES EN GARDE SPECIALES**

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

**c. PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).  
Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

LOT N° : 1 2 6 8 4 1 1

UT. AV. : 0 9 2 1 P.P.V



09366 13274

..... 25 mg  
..... 15 mg  
..... un comprimé

**c. FORME PHARMACEUTIQUE**

Comprimé pelliculé sécable, boîte de 20.

**d. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE**

Diurétique thiazidique et diurétique épargneur potassique en association  
(C: système cardiovasculaire).

**2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :

- Hypertension artérielle.
- Œdèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

**3. ATTENTION !**

**a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT  
(CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
- Insuffisance hépatique grave ;
- Hyperkaliémie ;
- Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
- Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**b. MISES EN GARDE SPECIALES**

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

**c. PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

LOT N° : 1 2 6 8 4 1 1

UT. AV. : 0 9 2 1 P.P.V



09366 13274

..... 25 mg  
..... 15 mg  
..... un comprimé

**c. FORME PHARMACEUTIQUE**

Comprimé pelliculé sécable, boîte de 20.

**d. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE**

Diurétique thiazidique et diurétique épargneur potassique en association  
(C: système cardiovasculaire).

**2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :

- Hypertension artérielle.
- Œdèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

**3. ATTENTION !**

**a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT  
(CONTRE-INDICATIONS)**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
- Insuffisance hépatique grave ;
- Hyperkaliémie ;
- Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
- Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**b. MISES EN GARDE SPECIALES**

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

**c. PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

# uliot®

Amlodipine

LOT: 19N015 EXP: 10/22  
PPV: 151DH60

80 mg  
5 mg

28

Comprimés pelliculés

Voie Orale

# uliot®

Amlodipine

LOT: 19N015 EXP: 10/22  
PPV: 151DH60

80 mg  
5 mg

28

Comprimés pelliculés

Voie Orale



# uliot®

Amlodipine

LOT: 19N015 EXP: 10/22  
PPV: 151DH60

80 mg  
5 mg

28

Comprimés pelliculés

Voie Orale

**SULIAT®**  
80 mg/5 mg  
160 mg/5 mg  
160 mg/10 mg  
Comprimés pelliculés, boîtes de  
Valsartan/ Amlodipine

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**  
**pour vous.**  
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
- Le médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nuisible.  
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, consultez votre médecin.

**Que contient cette notice :**  
1- Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?  
2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?  
3- Comment prendre SULIAT® ?  
4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?  
5- Comment conserver SULIAT® ?  
6- Informations supplémentaires

**1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**  
**Classe pharmacologique-thérapeutique :**  
Code ATC : C09DB06  
Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.  
- Valsartan appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».  
- Amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».  
Amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.  
Le Valsartan agit sur le système des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.  
Cela signifie que ces deux substances combinées empêchent le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

**Indications thérapeutiques :**  
SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlodipine soit par le valsartan, chacun administré seul.

**2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?**  
**Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :**

**Contre-indications :**  
**Ne prenez jamais SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :**  
- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlodipine, aux hydroxydérivés ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.  
- Si vous avez eu de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.  
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).  
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).  
- Si vous avez eu de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.  
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale (DGF < 60 ml/min/1,73 m²) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aldosérone.  
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).  
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive et sténose aortique de degré élevé).  
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après un infarctus aigu du myocarde.

**Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.**

**Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

**Faites attention avec SULIAT® dans les cas suivants :**  
- Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhée).  
- Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux.  
- Si vous avez un rétrécissement de l'artère rénale unilatérale ou bilatérale ou une sténose artérielle sur rein unique.  
- Si vous avez une affection touchant les glandes surrénales qui s'appelle « hyperaldostéronisme primaire ».  
- Si vous avez eu une insuffisance cardiaque ou un post infarctus. Votre médecin doit évaluer votre fonction rénale.  
- Si votre médecin vous a informé que vous avez eu un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).  
- Si vous avez eu une greffe de rein ou si vous êtes insuffisant, vous devez avoir un rétrécissement des artères rénales.  
- Si vous avez eu de graves problèmes rénaux (DGF < 30 ml/min/1,73 m²) et si vous êtes sous dialyse.  
- Si vous avez présenté des gonflements, en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine). Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT® et contactez votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais reprendre SULIAT®.  
- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :  
- Un « inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) » (par exemple énalapril, lisinapril, ramipril), en particulier si vous avez eu des problèmes rénaux dus à un diabète.  
- Aldosérone.

**Alertes :**  
Si votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et la teneur des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

**Enfants et adolescents :**  
L'utilisation de l'association Valsartan/Amlodipine n'est pas recommandée chez l'enfant et chez l'adolescent (âgés de moins de 18 ans).

**Interactions avec d'autres médicaments :**

**Prise de SULIAT®, comprimés pelliculés, avec d'autres médicaments :**  
Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Votre médecin pourrait avoir besoin de modifier la dose de vos médicaments et/ou prendre d'autres précautions. Il se peut, dans certains cas, que vous deviez arrêter l'un de vos médicaments. Ceci est d'autant plus important si vous utilisez l'un des médicaments énumérés ci-dessous :

- Le lithium (Médicament utilisé pour traiter certains types de dépression).
- Duréiques (un type de médicament qui augmente la quantité d'eau que vous produisez) ;
- Duréiques (épisuriques de potassium, ou autres substances potassiques, substitués du sel contenant du potassium et autres substances susceptibles d'augmenter les taux de potassium).
- Inhibiteurs/épigénétiques et autres inhibiteurs ou autres substances appelées « vasodilatateurs ».
- Médicaments utilisés pour traiter des mycoses (ex. kétoconazole, itraconazole).
- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2, acide acétylsalicylique (>3g/jour) et AINS non sélectifs. Votre médecin peut vérifier votre fonction rénale.
- Médicaments anticonvulsifs (ex. carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, fosphénytoïne, primidone).
- Médicaments utilisés dans le HIV (SMA, AZV, Ritonavir).
- Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes (tels que rifampicine, érythromycine, clarithromycine).
- Vinpocetine, diltazem (médicaments à usage cardiaque).
- Simvastatine (médicament utilisé pour contrôler des taux élevés de cholestérol).
- Dextroamphétamine (perfusion pour traiter des anomalies graves de température corporelle).
- Médicaments utilisés en prévention du rejet de greffe (ciclosporine).

**Interactions avec les aliments et les boissons :**

La pamplemousse ou le jus de pamplemousse ne doivent pas être consommés par les personnes à qui SULIAT® a été prescrit. Ceci est dû au fait que le pamplemousse et le jus de pamplemousse peuvent conduire à une augmentation des taux sanguins de la substance active Amlodipine, pouvant induire une augmentation imprévue de l'effet hypotenseur de SULIAT®.

**Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :**

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :**

**Grossesse :**  
Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Lot n°  
EXP  
PVV  
151,60

501319 a

en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez régulièrement votre médecin après de votre médecin et pharmacien.  
**Administration, fréquence d'administration et durée du traitement :**  
SULIAT® doit être pris par voie orale, une fois par jour, avec ou sans nourriture.  
- votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.  
**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.  
**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.  
**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.

**En cas de surdosage :**  
Si vous avez pris plus de médicament que votre médecin vous a prescrit, contactez immédiatement votre médecin ou le service d'urgence.



တပ်မတော် နှစ်ဦးစီးချုပ် ဦးသုန်းတင်







