

COMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR R LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/01/20	consultation C1	1	200,00DH	Dr FOUHAMMI Brahim Chirurgien Dentiste 4; H2 Park Plaza Avenue Yacoub El Mansour - Mohammedia - Tél: 05 23 31 4 566 / 05 23 320 394
27/01/20	pano	2.15	200,00DH	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. O. mi Pachad AALAM	27/01/2020	158,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
000000000	000000000
000000000	000000000
5533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET GACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur FOUHAMY BRAHIM

Chirurgien Dentiste

Diplome de la faculté de médecine de Casablanca

D.U Orthodontie Rabat

D.U Implantologie Toulouse (France)

D.U Pathologie et chirurgie buccale Fés (Maroc)

C.E.S Esthétique du sourire académie du sourire (France)

C.E.S Expertise Médicale et réparation juridique de préjudice corporel Casablanca (Maroc)

4.H2 PARK PLAZA 1.Bd YAKOUB AL MANSOUR

MOHAMMEDIA

Tel: **05 23 31 45 66**

ICE: 00179216000076 IF: 55054121

CNSS: 2260785 INP: 09017589

lundi 27 janvier 2020

Monsieur KARAMI Hakima

AMOXYL 1G

1 cps 2x/j pendant 10 jours

METROZAL 500

1 cps 2x/j pendant 10 jours

DOLIPRANE 1000


1 comprimé matin, midi et soir *en cas de douleur.*

Dr FOUHAMY Brahim

Chirurgien Dentiste

4.H2 Park Plaza 1 Avenue Yaacoub El Mansour
- Mohammedia

Tel: 05 23 314 566 / 05 23 320 394



Docteur FOUHAMI BRAHIM

Chirurgien Dentiste

Diplome de la faculté de médecine de Casablanca

D.U Orthodontie Rabat

D.U Implantologie Toulouse (France)

D.U Pathologie et chirurgie buccale Fés (Maroc)

C.E.S Esthétique du sourire académie du sourire (France)

C.E.S Expertise Médicale et réparation juridique de préjudice corporel Casablanca(Maroc)

4.H2 PARK PLAZA 1.Bd YAKOUB AL MANSOUR

MOHAMMEDIA

Tel: **05 23 31 45 66**

ICE: 00179216000076 IF:55054121

CNSS:2260785 INP:09017589

NOTE D'HONORAIRES

mardi 4 février 2020

madame KARAMI Hakima

Date	Dent	Cotation	Montant	Base	Libellé
27/01/2020	-	C	200,00dh	NR	Consultation
					Consultation non suivie d'acte à la même séance
27/01/2020	-	Z 15	200,00dh	NR	panoramique
					Radiographies panoramique de la totalité du système maxillaire et du système dentaire
TOTAL					C + Z 15 400,00dh 0,00dh

Dr FOUHAMI Brahim
Chirurgien Dentiste
4.H2 Park Plaza 1 Avenue Yaacoub El Mansour
- Mohammedia -
Tel: 05 23 31 45 66 / 05 23 320 394

Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent sécable
PARACÉTAMOL

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous. Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé effervescent sécable. Les autres composants sont* : acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sodique, laurylsulfate de sodium, povidone K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucine, arôme orange.
Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles dououreuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou si de tout autre signe, ne pas continuer le traitement.

En cas de régime sans sel ou pauvre en sodium : 408 mg par comprimé.

En cas de maladie grave du foie ou de paracétamol.

Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise sans ordonnance, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. Afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée, il est préférable de prendre ce médicament avec un verre d'eau et de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions d'utilisation recommandées, n'a pas d'effets délétères sur l'enfant à naître ou sur l'enfant allaité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.



neffrent. Ne les associez pas, (cf. chapitre "Posologie").

pendant la grossesse ainsi qu'en cours de traitement.



METROZAL®

Métronidazole

Comprimés 250 mg et 500 mg

FORME ET PRÉSENTATIONS :

- Comprimés 250 mg - Boîte de 20.
- Comprimés 500 mg - Boîte de 20.

COMPOSITION :

METROZAL® 250 mg

Métronidazole base 250 mg

Excipients q.s.p. 1 comprimé

Excipient à effet notoire : Lactose.

METROZAL® 500 mg

Métronidazole base 500 mg

Excipients q.s.p. 1 comprimé

Excipient à effet notoire : Lactose.

PROPRIÉTÉS :

Le métronidazole est un antibiotique dérivé de la famille des nitro-5 imidazolés doué d'une double activité :

Bactéricide puissant sur les bactéries anaérobies strictes.

Parasiticide à l'égard de trichomonas vaginalis, giardia intestinalis et entamoeba histolytica.

INDICATIONS :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles :

- Amibiasis.

- Trichomonases urogénitales.

- Vaginites non spécifiques.

- Lambliasis.

- Traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles.

- Relais des traitements curatifs par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

CONTRE-INDICATIONS :

Absolues :

- Hypersensibilité aux imidazolés ou antécédent d'allergie au métronidazole, ou à l'un des autres constituants de METROZAL®.

- Enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route.

Relatives :

- Disulfiram ou alcool.

POSÉOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Se conformer strictement à la prescription médicale.

Adultes :

Adultes : 1,5 g par jour, en 3 prises.

Enfants de **plus de 6 ans** : 30 à 40 mg/kg/jour, en 3 prises.

Dans l'amibiase hépatique, au stade abcédatoire, évacuer l'abcès conjointement au traitement par le métronidazole.

La durée du traitement est de 7 jours consécutifs.

Trichomonase :

Chez la femme : (adultes et enfants), de préférence, traitement mixte :

- 500 mg (1 comprimé) + 1 ovule par jour, ou

- (4 comprimés 500 mg).

Trichomonase : (adultes et enfants) : dans les cas d'infestation à Trichomonas vaginalis, il doit être traité concurremment, même en cas d'une réponse

Vaginite :

Chez la femme :

- 500 mg (1 comprimé) + 1 ovule par jour.

Métronidazole 500mg

Boîte de 20 comprimés

PPV : 32,50 DH



Trichomonase :

Adultes :

Adultes : 1 à 1,5 g par jour.

Enfants de **plus de 6 ans** : 20 à 30 mg/kg/jour.

EN CAS DE COMPLICATIONS, PREVENIR VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

- Eviter les boissons alcoolisées et les médicaments contenant de l'alcool.

- Interrrompre le traitement en cas d'axiale, de vertiges, de confusion mentale.

- Tenir compte du risque d'aggravation de l'état neurologique chez les malades atteints d'affections neurologiques centrales et périphériques sévères, chroniques ou évolutives.

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Précautions d'emploi :

- En cas d'antécédent de troubles hématologiques, de traitement à forte dose et/ou de traitement prolongé, il est recommandé de pratiquer régulièrement des examens sanguins, particulièrement le contrôle de la formule leucocytaire.

- En cas de télicéopénie, l'opportunité de la poursuite du traitement dépend de la gravité de l'infection.

- En cas de traitement prolongé, surveiller l'apparition de signes évocateurs d'effet indésirable à type de neuropathie centrale ou périphérique (paresthesies, ataxie, vertiges, crises convulsives).

- L'attention est attirée, chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les possibilités de vertiges attachées à ce médicament.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Pendant la grossesse, METROZAL® ne peut être administré qu'en cas de nécessité.

Pendant l'allaitement, la prise de METROZAL® est déconseillée en raison de son passage dans le lait maternel.

EN CAS DE COMPLICATIONS, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

METROZAL® EST UN MÉDICAMENT : NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- Troubles digestifs bénins (douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhée).

- Glossite avec sensation de sécheresse de la bouche, stomatite, goût métallique, anorexie.

- Exceptionnellement, pancréatite, réversible à l'arrêt du traitement.

- Bouffées congestives, prurit, éruption cutanée parfois fébrile.

- Urticaire, œdème de Quincke, exceptionnellement choc anaphylactique.

- Céphalées, neuropathies sensitives périphériques, convulsions, convulsions, vertiges, ataxie.

- Confusion, hallucinations.

- Très rarement neuropathie, agranulocytose et thrombopénie.

Divers : Apparition d'une coloration bain-rougeâtre des urines due à la présence de pigments hydrosolubles provenant du métabolisme du produit.

TOUT AUTRE EFFET NON SOUHAITÉ QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU MEDECIN OU AU PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Déconseillées :

- Alcool : évitez la prise de boissons alcoolisées.

- Disulfiram.

Nécessitan des précautions d'emploi :

- Anticoagulants oraux : Contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et surveillance de l'INR. Adaptation de la posologie de l'anticoagulant oral pendant le traitement par le métronidazole et 8 jours après son arrêt.

A prendre en compte :

- Prise orale.

Examens paracliniques :

- Le méthronidazole peut immobiliser les tréponèmes et donc faussement positiver un test de Nelson.

Il EXISTE D'AUTRES FORMES DE METROZAL® :

- Suspension buvable. - Ovules 500 mg.

DELIVRANCE :

Liste I - Délivré uniquement sur ordonnance.

METROZAL® 250 mg - Bte de 20 : AMM N°: 287/15DMP/21/NRQ

METROZAL® 500 mg - Bte de 20 : AMM N°: 288/15DMP/21/NRQ

Révision : Janvier 2016



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALÉNICA

Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc

الرجو الاتصال بالطبيب المعالج في أقرب وقت ممكن. أجهل
في حال تسببك تناول أموكسيل:

• في حال تسببك تناول جرعة ماء، تناولها حال تذكرك إياها.
• لا تتناول الجرعة التالية في وقت قريب جداً، انتظر حوالي 4
الجرعة الموقالية.

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها.
في حال توقفك عن تناول أموكسيل:
• لا يوجد أي موضوع.

إن كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، المرجع
الصيني قصد الحصول على المزيد من المعلومات.

4. ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟
كجميع الأدوية، يمكن أن ينجم عن هذا الدواء آثار غير محسوبة
بالضرورة أنها تسبب جمجمة المرضي.

توقف عن تناول أموكسيل واستشر الطبيب فوراً إذا واجهت
الشديدة المذكورة أدناه، لذلك قد تحتاج إلى علاج طبي عاجل.
الآثار الجانبية التالية نادرة جداً (يمكن أن تظهر لدى مريض و
مريض):

• مزدوج فعل حساسية يمكن أن تشمل الحكة أو الطفح الجلدي،
واللسان والجحش، أو صعوبة في التنفس. ويمكن لردود الأفعال
في بعض الأحيان.

طفح جلدي أو بقع حمراء على شكل رأس ثيوس تحت الجلد، و
التهاب جدار الأوعية التمoria بسبب رد الفعل التحسسي. يمكن
الام المفاصل (التهاب المفاصل) ومشاكل في الكلى.

يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي متاخر عادة خلال 7 إلى 12
وتشمل هذه العلامات الطفح الجلدي، والحمى والألم المفاصل و
خاصة في الإبطين.

رد فعل تحسسي على مستوى الجلد معروف باسم حمامي متعدد
خلال الأعراض التالية: بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد مصم
مستوى الراحتين وبابن القمعين، تقرحات متراكزة ومتقدمة، وح
والعينين والأغشية المخاطية التناسلية. قد يسبب رد الفعل هذا الح

يمكن أن تظهر رد فعل آخر أكثر شدة بالجلد مثل تغير لون
وظهور بثور، وتشقير الجلد، والاحمرار، والألم، والحكمة، والقثاء

الآعراض الحمى والصداع والألم في الجسم
حمى، قشعريرة، التهاب الحلق أو غيرها من علامات العدوى، و
هذه الآثار الجانبية دلائل على وجود متلازمة في خلايا الدم

• تفاعل باريش هيكسيماير الذي يمكن أن يظهر أثناء العلاج با
وتشعيرية وصداع والألم في العضلات وطفح جلدي
التهاب الأمعاء الطيفية (القولون)، يفاقمه إسهال (في بعض الأ
الحمى).

قد تظهر آثار جانبية خطيرة بالرغم هذه الآعراض تظهر بشكل
الذين يخضعون للعلاج لفترة طويلة، لدى الرجال والمرضى من
استشارة الطبيب فوراً في الحالات التالية:

○ الإسهال الشديد مع وجود دم،
○ ظهور بثور واحمرار أو كدمات على الجلد،
○ بول داكن أو براز شاحب،

○ اصفرار الجلد والعينين (يرقان). انظر أيضاً المعلومات الوار
قد يؤدي إلى الإصابة باليرقان.

قد تحدث هذه التفاعلات عند تناول الدواء أو خلال عدة أسابيع
إذا ظهرت لديك أي من التفاعلات المذكورة أعلاه، توقف عن
الطبيب فوراً.

يمكن أن تكون ردود الفعل على مستوى الجلد أقل حدة أحياناً:
طفح جلدي (بعض ذاتية وردية أو حمراء) مصحوبة بحكة معتدلة
ومنتقدة على الساعدين والسبعين والراحتين والأخمصين. هذه ا
(يمكن أن تظهر لدى شخص واحد في كل 100 شخص).

إذا ظهرت لديك أي من هذه الآعراض، استشر طبيبك لأنك بحاجة
أموكسيل.

لذا إنما حقيقة ممكنة حدوث:
شخص واحد واحداً من أصل 10 أشخاص)

Amoxil

500mg et 1 g comprimés dispersibles,

Amoxil

125 mg, 250 mg et 500mg, poudre pour
flacon de 60 ml.

Amoxicilline

Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre sécurité.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été prescrit à vous ou à votre conjoint ou à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs situations sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AMOXIL et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMOXIL ?
3. Comment prendre AMOXIL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AMOXIL ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline, qui appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

Dans quels cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE SUR AMOXIL ?

Ne prenez jamais AMOXIL :

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à certains de ses composants contenus dans ce médicament (mentionnez-le au pharmacien).
 - Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à la pénicilline, y compris une éruption cutanée ou un gonflement du visage.
- Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre pharmacien ou à votre pharmacien si vous:

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de tête, fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- N'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

- Des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour évaluer le fonctionnement de votre foie.
- Un dosage d'œstrogènes (utilisé pendant la grossesse pour déterminer si le développement est normal).

ou votre pharmacien que vous obtiendrez les résultats de ces tests.

PPV : 55,00 DH
LOT : 621932
PER : 03/21

et AMOXIL :

• Si vous prenez, avez récemment pris ou allez prendre:

• Iloprinol (utilisé dans le traitement de la réaction cutanée allergique à la pénicilline) ou l'ibuprofène (utilisé dans le traitement de la douleur et de la fièvre). Il faut adapter votre dose d'AMOXIL.

- Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation (tels que la warfarine), vous pourriez avoir besoin d'anticoagulants supplémentaires.

الرجو الاتصال بالطبيب المعالج في أقرب وقت ممكن. أجهل
في حال تسببك تناول أموكسيل:

• في حال تسببك تناول جرعة ماء، تناولها حال تذكرك إياها.
• لا تتناول الجرعة التالية في وقت قريب جداً، انتظر حوالي 4
الجرعة الموقالية.

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها.
في حال توقفك عن تناول أموكسيل:
• لا يوجد أي موضوع.

إن كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، المرجع
الصيني قصد الحصول على المزيد من المعلومات.

4. ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟
كجميع الأدوية، يمكن أن ينجم عن هذا الدواء آثار غير محسوبة
بالضرورة أنها تصيب جميع المرضى.

توقف عن تناول أموكسيل واستشر الطبيب فوراً إذا واجهت
الشديدة المذكورة أدناه، لذلك قد تحتاج إلى علاج طبي عاجل.
الآثار الجانبية التالية نادرة جداً (يمكن أن تظهر لدى مريض و
مريض):

• مزدوج فعل حساسية يمكن أن تشمل الحكة أو الطفح الجلدي،
واللسان والجحش، أو صعوبة في التنفس. ويمكن لردود الأفعال
في بعض الأحيان.

طفح جلدي أو بقع حمراء على شكل رأس ثيوس تحت الجلد، و
التهاب جدار الأوعية التمoria بسبب رد الفعل التحسسي. يمكن
الام المفاصل (التهاب المفاصل) ومشاكل في الكلى.

يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي متاخر عادة خلال 7 إلى 12
وتشمل هذه العلامات الطفح الجلدي، والحمى والألم المفاصل و
خاصة في الإبطين.

رد فعل تحسسي على مستوى الجلد معروف باسم حمامي متعدد
خلال الأعراض التالية: بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد مصم
مستوى الراحتين وبابن القمعين، تقرحات متراكزة ومتقدمة، وح
والعينين والأغشية المخاطية التناسلية. قد يسبب رد الفعل هذا الح

يمكن أن تظهر رد فعل آخر أكثر شدة بالجلد مثل تغير لون
وظهور بثور، وتشقير الجلد، والاحمرار، والألم، والحكمة، والقثاء

الآعراض الحمى وصداع والألم في الجسم
حمى، قشعريرة، التهاب الحلق أو غيرها من علامات العدوى، و
هذه الآثار الجانبية دلائل على وجود متلازمة في خلايا الدم

• تفاعل باريش هيكسباير الذي يمكن أن يظهر أثناء العلاج با
وتشعيرية وصداع والألم في العضلات وطفح جلدي
التهاب الأمعاء الطيفية (القولون)، يفاقمه إسهال (في بعض الأ
الحمى).

قد تظهر آثار جانبية خطيرة بالرغم هذه الآعراض تظهر بشكل
الذين يخضعون للعلاج لفترة طويلة، لدى الرجال والمرضى من
استشارة الطبيب فوراً في الحالات التالية:

○ الإسهال الشديد مع وجود دم،
○ ظهور بثور واحمرار أو كدمات على الجلد،
○ بول داكن أو براز شاحب،

○ اصفرار الجلد والعينين (يرقان). انظر أيضاً المعلومات الوار
قد يؤدي إلى الإصابة باليرقان.

قد تحدث هذه التفاعلات عند تناول الدواء أو خلال عدة أسابيع
إذا ظهرت لديك أي من التفاعلات المذكورة أعلاه، توقف عن
الطبيب فوراً.

يمكن أن تكون ردود الفعل على مستوى الجلد أقل حدة أحياناً:
طفح جلدي (بعض ذاتية وردية أو حمراء) مصحوبة بحكة معتدلة
ومنتقدة على الساعدين والسبعين والراحتين والأخمصين. هذه ا
(يمكن أن تظهر لدى شخص واحد في كل 100 شخص).

إذا ظهرت لديك أي من هذه الآعراض، استشر طبيبك لأنك بحاجة
أموكسيل.

لذا إنما حقيقة ممكنة حدوث:
شخص واحد واحداً من أصل 10 أشخاص)

Amoxil

500mg et 1 g comprimés dispersibles,

Amoxil

125 mg, 250 mg et 500mg, poudre pour

flacon de 60 ml.

Amoxicilline

Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit à vous ou à votre conjoint ou à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AMOXIL et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?
3. Comment prendre AMOXIL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AMOXIL ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline, qui appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

Dans quels cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE SUR AMOXIL ?

Ne prenez jamais AMOXIL :

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un de ses composants contenus dans ce médicament (mentionnez-le au pharmacien).
 - Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à l'amoxicilline, y compris une éruption cutanée ou un gonflement du visage.
- Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL si vous:

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de tête, fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- N'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

- Des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour évaluer le fonctionnement de votre foie.
- Un dosage d'œstrogènes (utilisé pendant la grossesse pour déterminer si le développement est normal).

ou votre pharmacien que vous obtiendrez les résultats de ces tests.

PPV : 55,00 DH
LOT : 621932
PER : 03/21

et AMOXIL :

• si vous prenez, avez récemment pris ou

diopurinol (utilisé dans le traitement de la réaction cutanée allergique est l'obénécide (utilisé dans le traitement de l'acné). Il faut d'adapter votre dose d'AMOXIL.

- Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation (tels que la warfarine), vous pourriez avoir besoin d'anticoagulants supplémentaires.