

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

ND: 36389

Déclaration de Maladie : N° P19-0010372

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 10342 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Guaziz Gustapha Date de naissance :

Adresse : W.FAK 2 Rue 73 N° 3 ouffa cas

Tél. : 0667 03 48 14 Total des frais engagés : 732,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

EL HADIRI Hassan
Gynécologue - Obstétricien
Chirurgie
bd.Oued Draa GY Y Rue 33 N° 4
Oulfa Hay Hassani - Casablanca
Tel : 05 22 93 37 21

Date de consultation : 07/04/2020

Nom et prénom du malade : Guaziz Gustapha Age : 79 ans

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète sucré

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07 Nov 2020	CS		200.00	EL HADJ Hassan Gynécologue - Médecin Chirurgien bd. Oued Drâa 6e étage 33 N°: Oulfa Bay Hassan Casablanca Tél : 05 22 93 37 21
27				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE OUM AL KORA Wifak 4, Rue 109, N° 46 Oufa - Casablanca ICE : 00191916900034 Tel : 05 22 93 28 88	21/01/2020	5321,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553



[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr El Hadiri Hassan

Gynécologue Obstétricien

Chirurgie Gynécologique - Chirurgie des Seins

Chirurgie Endoscopique - Coelochirurgie

Stérilité - Echographie - Colposcopie - Hystéroskopie

Traitemet Laser - Médecine Foetale

Ancien Attaché au Service Gynécologie Obstétrique

C.H.U Ibn Rochd - Casablanca



المكتور الدكتور حسن

اختصاصي في أمراض النساء والتوليد

الجراحة النسائية - جراحة الثدي والعمق

الصور بالصدى (إيكوغرافيا)

البرأة - قت الكاميرا

العلاج باشعة الليزر - طب المجنين

طبيب ملحق سانيا بالمركز

الاستثنائي الجامعي ابن رشد

قسم أمراض النساء والولادة

الدار البيضاء

07 AOUT 2020

N° Oucuz Mustapha

60 kg 13

1/ Anorectal - Zulay N° 8

2/ Zyloric 300 mg 1 cap/f

3/ Augmentin 1g 1 cap/f

92 kg

5321 80

DR. EL HADIRI Hassan
Gynécologue
Chirurgien
N° 33 Rue 109, N° 46
Oued Draa Groupe Y
Oulfa Hay Hassan - Casablanca
Tel : 05 22 93 37 21

PHARMACIE OUM AL KOPA
Wakak 4, Rue 109, N° 46
Oulfa - Casablanca
ICE : 00191916900031
Tel : 05 22 93 28 88

شارع وادي درعة مجموعة (Y) زنقة 33 الرقم 4 الطابق الأول - أمام صيدلية البخاري وقرب مستشفى الحسني
Bd. Oued Draa Groupe (Y) Rue N° 33 N°4 1er Etage - en face de la Pharmacie Boukhari
et près de l'Hôpital Al Hassani - Tél : 05 22 93 37 21 - Urgence : 06 63 37 01 19



AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé

Amoxicilline/Acide clavulanique

Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à votre enfant). Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous présentez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS DUSQUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?
3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER AUGMENTIN ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS DUSQUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter définitivement l'infection. L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

Indications thérapeutiques

AUGMENTIN est utilisé pour traiter les infections dues aux germes sensibles et/ou après un traitement par ce même médicament administré par voie injectable, notamment dans certaines situations où les espèces bactériennes responsables de l'infection peuvent être multiples et/ou résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre(s), contactez-le avant de prendre ce médicament.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé : sans objet.

Ne prenez jamais AUGMENTIN :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans AUGMENTIN (dont la liste est fournie à la rubrique 6).
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

→ Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Faites attention avec AUGMENTIN :

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- avez pris régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent de AUGMENTIN ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière (ier) que vous prenez AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à

votre pharmacien. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance, et aussi les produits à base de plantes.

Si vous prenez de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster votre dose de AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

AUGMENTIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

AUGMENTIN peut influer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le rejet de greffe déorganisante).

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si l'il est possible que vous le soyiez, ou si vous allaitez, vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un quelconque médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

Informations importantes concernant certains composants de AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose :

- AUGMENTIN contient de l'Aspartam (E951), qui est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive chez les enfants nés avec une maladie appelée « phénylcétonurie ».
- AUGMENTIN contient de la mattoxitolane (glucose). Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre(s), contactez-le avant de prendre ce médicament.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé : sans objet

3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?

Instructions pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Adultes et enfants de 40 kg et plus

- Dose habituelle : 1 sachet 1 g/125 mg ou 2 comprimés 500 mg/62,5 mg trois fois par jour
- Dose Intérieure : 1 sachet 1 g/125 mg ou 2 comprimés 500 mg/62,5 mg deux fois par jour

Enfants pesant moins de 40 kg

Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent de préférence être traités avec AUGMENTIN en suspension buvable ou en sachet 500 mg/62,5 mg.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez donner des comprimés de AUGMENTIN à des enfants pesant moins de 40 kg.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

• En cas de problèmes rénaux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.

• En cas de problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de votre foie.

Comment prendre AUGMENTIN ?

- AUGMENTIN 1 g/125 mg Sachets : Juste avant la prise de AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un demi-verre d'eau.

Avez le mélange au début d'un repas ou un peu avant.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg adulte comprimés : Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau au début d'un repas ou un peu avant.

• Répartissez les prises de manière à ce qu'il y ait au moins 4 heures. Ne prenez pas :

- Ne conduisez pas et n'utilisez pas :

• Ne prenez pas AUGMENTIN pendant

consultez de nouveau un médecin.

Si vous avez pris plus de AUGMENTIN

La prise d'une quantité excessive de vomissements ou diarrhée) ou des crampes. Montrez la boîte de médicament au médecin.

Si vous oubliez de prendre AUGMENTIN

Si vous avez oublié une dose, prenez-la avant de prendre la dose suivante.

Si vous arrêtez de prendre AUGMENTIN

Vous devez continuer de prendre AUGMENTIN jusqu'à la fin du traitement, même si vous vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.

PPV: 222,00 DH
LOT: 632441
PER: 02/21

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, avertir immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- défaillance des fonctions du rein,
- de maladie du sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la mercaptopurine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul

Allaitement

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, l'allaitement est contre-indiqué.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

Liste des excipients à effet notable : lactose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Poseologie

La posologie usuelle varie de 100 à 300 mg par jour. Elle est fonction des résultats du taux sanguin et urinaire en DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé, contactez immédiatement votre médecin.

43,20



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, avertir immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- défaillance des fonctions du rein,
- de maladie du sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la mercaptopurine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul

Allaitement

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, l'allaitement est contre-indiqué.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

Liste des excipients à effet notable : lactose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Poseologie

La posologie usuelle varie de 100 à 300 mg par jour. Elle est fonction des résultats du taux sanguin et urinaire en DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé, contactez votre pharmacien.

43,20



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, avertir immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS DE :

- défaillance des fonctions du rein,
- de maladie du sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec la vidarabine (anti-viral), la didanosine, l'azathioprine ou la mercaptopurine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul

Allaitement

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, l'allaitement est contre-indiqué.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

Liste des excipients à effet notable : lactose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Poseologie

La posologie usuelle varie de 100 à 300 mg par jour. Elle est fonction des résultats du taux sanguin et urinaire en DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de ZYLORIC, comprimé, contactez votre pharmacien.

43,20



modification du régime alimentaire ;
ise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
ction rénale diminuée ;
maladie grave du foie ;
vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande
oïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrénales) ;
nsommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
se de certains autres médicaments (voir «Prise d'autres médicaments») ;
otre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou
vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.
signes de l'hypoglycémie incluent :
m intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence,
oles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution
vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la
ve, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs,
ges, sensation de faiblesse.
signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite,
té, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs
ses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines
ne de poitrine et troubles de rythme cardiaque).
tre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter : un
confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de
ne respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque,
erte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à
ttaque cérébrale.
ement de l'hypoglycémie :
la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement
l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé
Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par
e, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.
chez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace
cas de réapparition des symptômes.

de laboratoire

taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé
érement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang
vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.
d'autres médicaments
s prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un
ament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre
nien.
médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous
ez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter
d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.
d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être
né par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :
res médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine)
medicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone,
opazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
dicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamiques
ctériens à longue durée d'action) ;
dicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines,
amphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
dicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type
coumariniques tels que la warfarine) ;
dicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
dicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles
lines ;

- médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ;
 - médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrate) ;
 - médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) ;
 - médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfinpyrazone) ;
 - médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ;
 - médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ;
 - médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration intraveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ;
 - médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (tritoqualine) ;
 - médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostataques.
- L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être diminué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque d'hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) :
- médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ;
 - médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ;
 - médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la lévothyroxine) ;
 - médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ;
 - médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine) ;
 - médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ;
 - médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ;
 - médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ;
 - médicaments pour traiter l'épilepsie (phénhytoïne) ;
 - médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ;
 - médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ;
 - médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ;
 - médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ;
 - médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon).

des taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être
perturbés par les médicaments suivants :
nac (appelés anti-H2) ;
ielle ou l'insuffisance cardiaque
néthidine, la réserpine. Une
s prenez ces médicaments car ils
aient les effets des médicaments

**AMAREL 2MG
CP B30**

P.P.V : 60DH40



6 118000 060031

suivants :

- médicaments empêchant la coagulation coumariniques telle que la warfarine*.

Aliments et boissons

La prise d'alcool peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduisant l'action d'AMAREL, comprimé de manière imprévisible.

Grossesse et Allaitement

Grossesse

s prenez ces médicaments car ils
aient les effets des médicaments

modification du régime alimentaire ;
ise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
ction rénale diminuée ;
maladie grave du foie ;
vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande
oïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrénales) ;
nsommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
se de certains autres médicaments (voir «Prise d'autres médicaments») ;
otre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou
vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.
signes de l'hypoglycémie incluent :
m intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence,
oles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution
vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la
ve, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs,
ges, sensation de faiblesse.
signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite,
té, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs
ses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines
ne de poitrine et troubles de rythme cardiaque).
tre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter : un
confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de
ne respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque,
erte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à
ttaque cérébrale.
ement de l'hypoglycémie :
la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement
l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé
Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par
e, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.
chez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace
cas de réapparition des symptômes.

de laboratoire

taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé
érement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang
vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.
d'autres médicaments
s prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un
ament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre
nien.
médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous
ez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter
d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.
d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être
né par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :
res médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine)
medicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone,
opazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
dicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamiques
ctériens à longue durée d'action) ;
dicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines,
amphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
dicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type
coumariniques tels que la warfarine) ;
dicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
dicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles
lines ;

- médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ;
 - médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrate) ;
 - médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) ;
 - médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfinpyrazone) ;
 - médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ;
 - médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ;
 - médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration intraveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ;
 - médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (tritoqualine) ;
 - médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostataques.
- L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être diminué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque d'hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) :
- médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ;
 - médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ;
 - médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la lévothyroxine) ;
 - médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ;
 - médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine) ;
 - médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ;
 - médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ;
 - médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ;
 - médicaments pour traiter l'épilepsie (phénhytoïne) ;
 - médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ;
 - médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ;
 - médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ;
 - médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ;
 - médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon).

des taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être
perturbés par les médicaments suivants :
nac (appelés anti-H2) ;
ielle ou l'insuffisance cardiaque
néthidine, la réserpine. Une
s prenez ces médicaments car ils
aient les effets des médicaments

**AMAREL 2MG
CP B30**

P.P.V : 60DH40



6 118000 060031

suivants :

- médicaments empêchant la coagulation coumariniques telle que la warfarine*.

Aliments et boissons

La prise d'alcool peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduisant l'action d'AMAREL, comprimé de manière imprévisible.

Grossesse et Allaitement

Grossesse

s prenez ces médicaments car ils
aient les effets des médicaments

modification du régime alimentaire ;
ise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
ction rénale diminuée ;
maladie grave du foie ;
vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande
oïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrénales) ;
nsommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
se de certains autres médicaments (voir «Prise d'autres médicaments») ;
otre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment ou
vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.
signes de l'hypoglycémie incluent :
m intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence,
oles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution
vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la
ve, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs,
ges, sensation de faiblesse.
signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite,
té, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs
ses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines
ne de poitrine et troubles de rythme cardiaque).
tre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter : un
confusionnel important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de
ne respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque,
erte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à
ttaque cérébrale.
ement de l'hypoglycémie :
la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement
l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé
Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par
e, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.
chez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace
cas de réapparition des symptômes.

de laboratoire

taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé
érement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang
vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.
d'autres médicaments
s prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un
ament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre
nien.
médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous
ez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter
d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.
d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être
né par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :
res médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine)
medicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone,
opazone, oxyphenbutazone, aspirine) ;
dicaments pour traiter les infections urinaires (tels que certains sulfamiques
ctériens à longue durée d'action) ;
dicaments pour traiter les infections bactériennes et fongiques (tétracyclines,
amphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine) ;
dicaments pour empêcher la coagulation du sang (antivitamines K de type
coumariniques tels que la warfarine) ;
dicaments favorisant le développement musculaire (anabolisants) ;
dicaments utilisés pour la thérapie de substitution par hormones sexuelles
lines ;

- médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ;
 - médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrate) ;
 - médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) ;
 - médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfinpyrazone) ;
 - médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ;
 - médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ;
 - médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration intraveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ;
 - médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (tritoqualine) ;
 - médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostataques.
- L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être diminué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque d'hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) :
- médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ;
 - médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ;
 - médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la lévothyroxine) ;
 - médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ;
 - médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine) ;
 - médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ;
 - médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ;
 - médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ;
 - médicaments pour traiter l'épilepsie (phénhytoïne) ;
 - médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ;
 - médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ;
 - médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ;
 - médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ;
 - médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon).

des taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être
perturbés par les médicaments suivants :
nac (appelés anti-H2) ;
ielle ou l'insuffisance cardiaque
néthidine, la réserpine. Une
s prenez ces médicaments car ils
aient les effets des médicaments

**AMAREL 2MG
CP B30**

P.P.V : 60DH40



6 118000 060031

suivants :
• médicaments empêchant la coagulation coumariniques telle que la warfarine*.

Aliments et boissons

La prise d'alcool peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduisant l'action d'AMAREL, comprimé de manière imprévisible.

Grossesse et Allaitement

Grossesse

sang (antivitamine K de type dérivés