

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/07/2020	1	1	1150,-	Dr. EL HAFIANE Reda Médecine Générale Lot. Reda Trine Chtouka TAI : 001-28-03-39

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	30/07/2010	1774,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

		H
D		
25533412	214333552	
00000000	00000000	
00000000	00000000	
35533411	11433553	

(Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'E

Le : 30/07/2020

Dr. EL HAFIANE Mohamed
Medecine Generale
34; Lot. REJA 1... C.I. JUKA
INP: 11105.150
Tel : 06-61-28-68-69

Hanafi DIAWAT

ORDONNANCE

$$294,00 \times 4 = Mf 6,00$$



- Fosavanc n° 5

$$120,00 \times 2 = 240,00 \text{ mg/peau}$$

- Vepren 100 mg n° 2



$$15f,00 \times 2 = 314,00 \text{ mg/peau}$$

- Xalalan Collen. n° 2



$$22,40 \times 2 = 44,80 \text{ 1 pt / 1 }$$

- Askardil n° 2



Dr. EL HAFIANE Mohamed
Medecine Generale
34; Lot. REJA 1... C.I. JUKA
INP : 11105.150
Tel : 06-61-28-68-69

Distribué sous licence
-- LAPROPHAN S.A.--
21,rue des Oudaya
Casablanca -- Maroc
PPV : 127DH00

■ LAIANOPROST

Distribué sous licence
-- LAPROPHAN S.A.--
21,rue des Oudaya
Casablanca -- Maroc
PPV : 157DH00

Notice : information de l'utilisateur



mg/5 600 UI, comprimés Ironique/colécalciférol

Ne prenez pas ce médicament car elle contient des

Veuillez
info

- Gardez cette notice pour la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être néfaste si les signes de leur maladie sont plus importants.
aussi à tout autre malade qui n'est pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. Ceci s'applique
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3. Comment prendre FOSAVANCE avant de prendre ce médicament.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
3. Comment prendre FOSAVANCE
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver FOSAVANCE
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé ?

Notice : information de l'utilisateur



mg/5 600 UI, comprimés Ironique/colécalciférol

Ne prenez pas ce médicament car elle contient des

Veuillez
info

- Gardez cette notice pour la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être néfaste si les signes de leur maladie sont plus importants.
aussi à tout autre malade qui n'est pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. Ceci s'applique
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3. Comment prendre FOSAVANCE avant de prendre ce médicament.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
3. Comment prendre FOSAVANCE
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver FOSAVANCE
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé ?

Notice : information de l'utilisateur



mg/5 600 UI, comprimés Ironique/colécalciférol

Ne prenez pas ce médicament car elle contient des

Veuillez
info

- Gardez cette notice pour la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être néfaste si les signes de leur maladie sont plus importants.
aussi à tout autre malade qui n'est pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. Ceci s'applique
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3. Comment prendre FOSAVANCE avant de prendre ce médicament.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
3. Comment prendre FOSAVANCE
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver FOSAVANCE
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé ?

Notice : information de l'utilisateur



mg/5 600 UI, comprimés Ironique/colécalciférol

Ne prenez pas ce médicament car elle contient des

Veuillez
info

- Gardez cette notice pour la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être néfaste si les signes de leur maladie sont plus importants.
aussi à tout autre malade qui n'est pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. Ceci s'applique
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3. Comment prendre FOSAVANCE avant de prendre ce médicament.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
3. Comment prendre FOSAVANCE
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver FOSAVANCE
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé ?

Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés pelliculés sécables

Vepran® 150 mg



pelliculés sécables SOTHEMMA

Irbésartan

Veuillez lire attent

- Gard
- Si
- C
-

6 118000 022916

notice avant de prendre ce médicament.

mandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes

un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à

120,00

NS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

3. COMMENT PRENDRE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Vepran appartient à un groupe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes de récepteurs de l'angiotensine-II.

L'angiotensine-II est une substance formée par l'organisme qui se lie aux récepteurs des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne leur constriction. Il en résulte une élévation de la pression artérielle. Vepran empêche la liaison de l'angiotensine-II à ces récepteurs et provoque ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une baisse de la pression artérielle.

Vepran ralentit la dégradation du fonctionnement des reins chez les patients ayant une pression artérielle et un diabète de type 2.

Vepran est utilisé :

- pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (*élévation de la pression artérielle*).
- pour protéger les reins des patients ayant une élévation de la pression artérielle, un diabète de type 2 et ayant une preuve biologique d'altération de la fonction rénale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'irbesartan ou à l'un des autres composants contenus dans Vepran.
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Vepran en début de grossesse (*voir la rubrique grossesse*)).

Vepran ne doit pas être donné aux enfants et adolescents (de moins de 18 ans).

Faites attention avec Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés :

Prévenez votre médecin si une des situations suivantes se présentent :

- si vous souffrez de vomissements ou de diarrhée importante.
- si vous souffrez de problèmes rénaux.
- si vous souffrez de problèmes cardiaques.
- si vous recevez Vepran pour une atteinte rénale due au diabète. Dans ce cas votre médecin peut faire pratiquer des tests sanguins

Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés pelliculés sécables

Vepran® 150 mg



pelliculés sécables

SOTHEMMA

Irbésartan

Veuillez lire attent

- Gard
- Si
- C
-

6 118000 022916

notice avant de prendre ce médicament.

mandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes

un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à

120,00

NS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

3. COMMENT PRENDRE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Vepran appartient à un groupe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes de récepteurs de l'angiotensine-II.

L'angiotensine-II est une substance formée par l'organisme qui se lie aux récepteurs des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne leur constriction. Il en résulte une élévation de la pression artérielle. Vepran empêche la liaison de l'angiotensine-II à ces récepteurs et provoque ainsi un relâchement des vaisseaux sanguins et une baisse de la pression artérielle.

Vepran ralentit la dégradation du fonctionnement des reins chez les patients ayant une pression artérielle et un diabète de type 2.

Vepran est utilisé :

- pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (*élévation de la pression artérielle*).
- pour protéger les reins des patients ayant une élévation de la pression artérielle, un diabète de type 2 et ayant une preuve biologique d'altération de la fonction rénale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'irbésartan ou à l'un des autres composants contenus dans Vepran.
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre Vepran en début de grossesse (*voir la rubrique grossesse*)).

Vepran ne doit pas être donné aux enfants et adolescents (de moins de 18 ans).

Faites attention avec Vepran 150 mg et 300 mg, comprimés :

Prévenez votre médecin si une des situations suivantes se présentent :

- si vous souffrez de vomissements ou de diarrhée importante.
- si vous souffrez de problèmes rénaux.
- si vous souffrez de problèmes cardiaques.
- si vous recevez Vepran pour une atteinte rénale due au diabète. Dans ce cas votre médecin peut faire pratiquer des tests sanguins

ASKARDIL®

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

FORMES PHARMACEUTIQUES

- Comprimés dispersibles

- Comprimés dispersibles

COMPOSITION

Comprimés dispersibles

Acide acétylsalicylique

Excipient : qsp 1 g

Comprimés dispersibles

Acide acétylsalicylique

Excipient : qsp 1 g

CLASSE PHARMACEUTIQUE

Anestésique

DA

AS

seulement

La

CO

- Ce

- Allergique

- Ulcérant

- Métabolite

- Traumatique

fortes doses (supérieures à 1 g/j)

- Grossesse à partir du deuxième trimestre : surveillance spécialisée.

• Aspartame : est contre indiqué en cas de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance).

- Il ne sera généralement pas utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas de :

• Saignements gynécologiques anormaux ou règles.

• Goutte.

• Traitement concomitant par les anticoagulants oraux, ou par l'héparine, les uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires.

- L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Antécédents d'ulcère de l'estomac ou duodénal.

- Antécédents d'hémorragies digestives.

- Hypertension artérielle.

- Diabète.

- Port de stérilet.

- Médicament réservé à l'adulte.

- Prévenez votre médecin en cas de : asthme, hémorragie gastro intestinale, insuffisance rénale, de geste chirurgical même mineur car risque d'hémorragie secondaire à l'effet antiagrégant plaquettaire de l'aspirine.

- ASKARDIL® ne contenant pas de sodium, il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

- Maladie des reins.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS ET NOTAMMENT :

- Les anticoagulants oraux : majoration du risque hémorragique.

- Uricosuriques : diminution de l'effet uricosurique.

- Méthotréxate utilisé à des doses > 15 mg/semaine, augmentation de la toxicité surtout hématologique.

- Autres anti-inflammatoires : majoration du risque ulcérogène et hémorragique si l'aspirine est administrée à des doses > 3 g/j.

- Héparine.

SIGNEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A BASE D'ASPIRINE A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AFIN DE NE PAS DEPASSER LES DOSES MAXIMALES CONSEILLEES.

LOT 96002 4

EXP 08/2021

PPV 22DH40

75 mg

160 mg

exclue

maladies du cœur ou des vaisseaux

votre médecin.

ens.

raux si aspirine administrée à

ent limitées, et qui justifient une

ASKARDIL® 75 mg

30 comprimés dispersibles



6 118000 033189

