

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | adhession@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-524696

RD 36377

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input checked="" type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	13053	Société :	Royal Air Maroc
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	LAHFAYA Wafaa
Nom & Prénom :			
Date de naissance :			
Adresse :			
Tél. :	06 57 52 45 29	Total des frais engagés :	1198,55 DHS
Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation :	09/07/2020	TU AOUT 2020	
Nom et prénom du malade :	Lahfaya Wafaa		
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	Suivi Dentiste		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à : Casablanca
Signature de l'adhérent(e) : 10/08/2020

ACCUEIL
12 AOUT 2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09.07.2020	Dr KARIMA KHABTOU	50,00	598,96	INP : 645483860 Signature au guichet automatique

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
SAUDI PHARMACEUTICALS - TEL: 0322 0095 0096	09/07/20	598,96

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT


* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553



[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Karima KHABTOU

Spécialiste en Gynécologie Obstétrique

- Suivi de grossesse et accouchement
- Echographie - Doppler
- Chirurgie gynécologique
- Endoscopie gynécologique
- Maladie et Cancer du sein
- Infertilité du couple
- Ménopause



الدكتورة كريمة خبتو

ال اختصاصية أمراض النساء والتوليد

- مراقبة الحمل و التوليد
- الفحص بالصدى الصوتي
- جراحة أمراض النساء
- التشخيص و الجراحة بالمنظار
- أمراض وسرطان الثدي
- علاج عقم الزوجين
- سن البايس

Casablanca, le

Mme / Mlle

... 9 . 7 . 20

A H F A Y A

W. F. —

10 Reel x 2

12 Reel x 3

2

10865

3-

898.95

16.10.1985

PHARMAZIE OTTOLINI & HOUSSIN
Gesellschaft m.b.H.
Casablanca 16, 10352 Berlin-Mitte
Telefon 030/6320395

Bioman

Degra

10865

30 min

1

680

680

Dr. Karima KHABTOU
Spécialiste en Gynécologie obstétrique
40, 1^{er} Etage, Lotissement Mly Thami
Hh 24, Oulata - Casablanca

Tél. 05 22 91 43 48

karimakhbtou@yahoo.fr

40, Lotissement Mly Thami - 1er étage, rond point george - Oulfa - Casablanca

40، إقامة مولاي تهامي - الطابق الأول - مدار جورج - اللالفة، الدار البيضاء



Autoisolation sanitaire ONSSA N° : CAPV.59.217.19
Complément alimentaire, n'est pas un médicament.
Promotion médicale : HEALTH INNOVATION Casablanca MAROC
Fabriqué par HEALTH INNOVATION

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur
Ne pas laisser à la portée des enfants
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

CONSEQUENTS D'UTILISATION :

Au développement normal des tissus.

A réduire la **fatigue**.

Au fonctionnement normal du **système immunitaire**.

A la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

il contribue notamment :

Le fer est un oligo-élément nécessaire à notre organisme.

BIOMARIAL est un complément alimentaire à base de fer.

PROPRIÉTÉS :

Substance active : Fer micro-nisé
capsule végétale en HPMC (hydroxypropyl méthacrylate).

Substance active : Fer micro-nisé
amidon de maïs ; anti-agglomérant.

N° DA/2020/02312DMP/20UCA/N
LOT: 190906
EXP: 09/2021
H000, CUD

Gelule, Boîte de 30.

FORME ET PRÉSENTATION :

BIOMARIAL

UPDFER
micro-nisé

A horizontal row of seven small bottles of Vitabiotics dietary supplements. From left to right, they are labeled: Stages, Original, Sport, 50+, Probiotic, Immune, and Detoxify. Each bottle has a different color label and a unique design.

* **Probiotique Plus** Fournit une protection accrue plus importante grâce aux prébiotiques qui contribuent à un microbiote intestinal sain et équilibré.

COMPLÉMENT NUTRITIONNEL MÉTALLIGENT QUÉ POUR LES FEMMES

Vitabiotics® Wellwoman®
La progression en cardio-vascular

A horizontal banner featuring logos and names of various brands and products, likely from a catalog page.

La gamme de perte de poids pour la santé des articulations

WEIMAN® **vitabiotics®** **Ontage®**

Nous refléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Vitabiotics.com offre une gamme de produits destinés aux personnes qui ont des besoins particuliers en vitamines et minéraux.

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

PLACER DANS UN ENDROIT SEC, À TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À 25°C.
À L'ABRI DE LA PORTÉE OU LA VUE DES ENFANTS.

OZIL PLUS® 20 mg

Gélules

DCI : Oméprazole

OZIL PLUS® peut passer dans le lait maternel et peut nuire votre bébé. Vous et votre Médecin décideront si vous prenez OZIL PLUS® ou

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez une toute autre question, si vous avez un doute demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

NO 2/00

1. Qu'est-ce que OZIL PLUS®, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OZIL PLUS®, gélule ?
3. Comment prendre OZIL PLUS®, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OZIL PLUS®, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE OZIL PLUS®, GÉLULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

OZIL PLUS®, gélule contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans :

- Le traitement à court terme d'ulcère duodénal actif • Le traitement à court terme d'ulcère gastrique bénin actif • Le traitement du reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) • Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien • La réduction de risque majeur de saignement gastro-intestinal chez les patients gravement malades.

L'efficacité et l'innocuité d'OZIL PLUS® n'a pas été démontré chez les enfants de moins de 18 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE OZIL PLUS®, GÉLULE ?

Contre-indications :

Ne prenez jamais OZIL PLUS®, gélule :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans OZIL PLUS® • Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (IPP) médicamenteux.

Précautions d'emploi ; Mises en garde spéciales :

Avant de prendre OZIL PLUS®, gélule informer votre Médecin si :

- On vous a dit que vous avez un faible taux de magnésium, de calcium et de potassium dans le sang • Vous avez des problèmes hépatiques • Vous avez une insuffisance cardiaque • Vous avez le syndrome de Bartter (un trouble du rein rare) • Vous avez des allergies
- Vous avez d'autres conditions médicales • Vous êtes enceintes ou vous programmez de le devenir. On ne sait pas si OZIL PLUS® peut nuire à votre bébé à naître • Vous allaitez ou vous envisagez d'allaiter.

dans le
transfusio... * Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques) • Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire) • Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration d'OZIL PLUS® • Mofétilmycophénolate (MMF) • Médicaments anti-coagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K; une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration d'OZIL PLUS® • Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose) • Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) • Cyclosporine • Benzodiazépine • Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe) • Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée) • Disulfiram • Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) • Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus)) • Produit contenant du fer • Méthotrexate • Un antibiotique contenant ampicilline • Clarithromycine

Il est important que vous informiez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, dites-le à votre médecin avant de prendre OZIL PLUS®. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre OZIL PLUS® pendant cette période.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre OZIL PLUS® pendant l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE OZIL PLUS®, GÉLULE ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas

OZIL PLUS® 20 mg

Gélules

DCI : Oméprazole

OZIL PLUS® peut passer dans le lait maternel et peut nuire votre bébé. Vous et votre Médecin décideront si vous prenez OZIL PLUS® ou

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez une toute autre question, si vous avez un doute demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

NO 2/00

1. Qu'est-ce que OZIL PLUS®, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OZIL PLUS®, gélule ?
3. Comment prendre OZIL PLUS®, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OZIL PLUS®, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE OZIL PLUS®, GÉLULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

OZIL PLUS®, gélule contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans :

- Le traitement à court terme d'ulcère duodénal actif • Le traitement à court terme d'ulcère gastrique bénin actif • Le traitement du reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) • Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien • La réduction de risque majeur de saignement gastro-intestinal chez les patients gravement malades.

L'efficacité et l'innocuité d'OZIL PLUS® n'a pas été démontré chez les enfants de moins de 18 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE OZIL PLUS®, GÉLULE ?

Contre-indications :

Ne prenez jamais OZIL PLUS®, gélule :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans OZIL PLUS® • Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (IPP) médicamenteux.

Précautions d'emploi ; Mises en garde spéciales :

Avant de prendre OZIL PLUS®, gélule informer votre Médecin si :

- On vous a dit que vous avez un faible taux de magnésium, de calcium et de potassium dans le sang • Vous avez des problèmes hépatiques • Vous avez une insuffisance cardiaque • Vous avez le syndrome de Bartter (un trouble du rein rare) • Vous avez des allergies
- Vous avez d'autres conditions médicales • Vous êtes enceintes ou vous programmez de le devenir. On ne sait pas si OZIL PLUS® peut nuire à votre bébé à naître • Vous allaitez ou vous envisagez d'allaiter.

dans le
transfusio... * Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques) • Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire) • Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration d'OZIL PLUS® • Mofétilmycophénolate (MMF) • Médicaments anti-coagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K; une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration d'OZIL PLUS® • Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose) • Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) • Cyclosporine • Benzodiazépine • Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe) • Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée) • Disulfiram • Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) • Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus)) • Produit contenant du fer • Méthotrexate • Un antibiotique contenant ampicilline • Clarithromycine

Il est important que vous informiez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, dites-le à votre médecin avant de prendre OZIL PLUS®. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre OZIL PLUS® pendant cette période.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre OZIL PLUS® pendant l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE OZIL PLUS®, GÉLULE ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas

OZIL PLUS® 20 mg

Gélules

DCI : Oméprazole

OZIL PLUS® peut passer dans le lait maternel et peut nuire votre bébé. Vous et votre Médecin décideront si vous prenez OZIL PLUS® ou

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez une toute autre question, si vous avez un doute demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

NO 2/00

1. Qu'est-ce que OZIL PLUS®, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OZIL PLUS®, gélule ?
3. Comment prendre OZIL PLUS®, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OZIL PLUS®, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE OZIL PLUS®, GÉLULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

OZIL PLUS®, gélule contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans :

- Le traitement à court terme d'ulcère duodénal actif • Le traitement à court terme d'ulcère gastrique bénin actif • Le traitement du reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) • Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien • La réduction de risque majeur de saignement gastro-intestinal chez les patients gravement malades.

L'efficacité et l'innocuité d'OZIL PLUS® n'a pas été démontré chez les enfants de moins de 18 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE OZIL PLUS®, GÉLULE ?

Contre-indications :

Ne prenez jamais OZIL PLUS®, gélule :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans OZIL PLUS® • Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (IPP) médicamenteux.

Précautions d'emploi ; Mises en garde spéciales :

Avant de prendre OZIL PLUS®, gélule informer votre Médecin si :

- On vous a dit que vous avez un faible taux de magnésium, de calcium et de potassium dans le sang • Vous avez des problèmes hépatiques • Vous avez une insuffisance cardiaque • Vous avez le syndrome de Bartter (un trouble du rein rare) • Vous avez des allergies
- Vous avez d'autres conditions médicales • Vous êtes enceintes ou vous programmez de le devenir. On ne sait pas si OZIL PLUS® peut nuire à votre bébé à naître • Vous allaitez ou vous envisagez d'allaiter.

dans le
transfusio... * Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques) • Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire) • Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration d'OZIL PLUS® • Mofétilmycophénolate (MMF) • Médicaments anti-coagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K; une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration d'OZIL PLUS® • Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose) • Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) • Cyclosporine • Benzodiazépine • Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe) • Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée) • Disulfiram • Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) • Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus)) • Produit contenant du fer • Méthotrexate • Un antibiotique contenant ampicilline • Clarithromycine

Il est important que vous informiez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, dites-le à votre médecin avant de prendre OZIL PLUS®. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre OZIL PLUS® pendant cette période.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre OZIL PLUS® pendant l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE OZIL PLUS®, GÉLULE ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas



BIOMART H

Lip

FORME ET PRÉSENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION (par gélule) :

Fer micronisé et microencapsulé (Lipofer); anti-aglomérant: stéarate de magnésium végétal; Agent de charge : Amidon de maïs; capsu HPMC (Hypromélose).

PROPRIÉTÉS :

BIOMARTIAL est un complément alimentaire à base de fer.

Le fer est un oligoélément nécessaire à notre organisme. Il contribue notamment :

A la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène

Au fonctionnement normal du **système immunitaire**

A réduire la **fatigue**

Au développement normal des tissus

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Fabriqué par les Laboratoires Bioxpert Maroc.
Promotion Médicale Health Innovation Casablanca Maroc.
Complément alimentaire, n'est pas un médicament.

Autorisation du ministère de la santé n° : DA 20171704414DMP/20UCA/MAv2
Autorisation sanitaire ONSSA n° : EPSCP9.12.14